

# 2021 内科护理学期末考试试题及答案

姓名

分数

---

## 一、 单选题(每题 1 分,共 100 分)

1、肾性水肿的发病机制

- A. 血钠过多
- B. 饮水过多
- C. 肾小球滤过率下降
- D. 血肌酐过高
- E. 血尿素氮过高

答案: C

2、下列重型肝炎病人的护理措施哪项不妥

- A. 观察黄疸是否进行性加深
- B. 消化道症状是否改善
- C. 给予高脂、高蛋白饮食
- D. 病人绝对卧床休息
- E. 专人陪护

答案: C

3、诊断原发性肝癌最敏感的实验是:

- A.  $\gamma$ -GT
- B. AFP
- C. LPH
- D. ALT
- E. AST

答案: B

4、当幽门梗阻出现持续性呕吐时，可引起：

- A. 低钾性碱中毒
- B. 低氯高钾碱中毒
- C. 低氯低钾酸中毒
- D. 低氯高钠碱中毒
- E. 低氯低钾碱中毒

答案：E

5、某人因多渴、多吃、多尿及体重下降，而查尿糖(+)，进一步查空腹血糖 $<7.8\text{mmol/L}$ ，再进一步查餐后2h血糖 $<11.1\text{mmol/L}$ ，此时可诊为

- A. 一过性血糖高
- B. I型糖尿病
- C. II型糖尿病
- D. 糖耐量异常
- E. 非糖尿病

答案：D

6、与吸烟有密切关系，且是肺癌中恶性程度最高的一种，应是：

- A. 鳞状上皮癌
- B. 小细胞未分化癌
- C. 大细胞未分化癌
- D. 腺癌
- E. 细支气管肺泡细胞癌

答案：B

7、肾病综合征根据病因分为

- A. 单发性、多发性
- B. 原发性、继发性
- C. 先天性、后天性
- D. 遗传性、免疫性
- E. 以上都不是

答案：B

8、HIV 是

- A. 人体免疫缺陷病毒
- B. 狂犬病毒
- C. 汉坦病毒
- D. 伤寒杆菌
- E. 沙门氏菌

答案：A

9、能作流行性乙型脑炎早期诊断的实验室检查是

- A. 补体结合试验
- B. 血凝抑制试验
- C. 中和试验
- D. 特异性 IgM
- E. 病毒分离

答案：D

10、患者男性，70岁，长期吸烟，2个月来声音嘶哑，痰中带血，低热乏力，少量黏痰，血象正常，曾有结核病接触史，胸部x线检查左肺上野有一直径3cm密度较高的球形阴影，最可能的诊断是

- A. 结核瘤
- B. 炎性假瘤
- C. 原发型中心性肺癌
- D. 错构瘤
- E. 淋巴瘤

答案：C

11、降低乙脑病死率的关键是把好下述哪三关：

- A. 高热、昏迷、呼吸衰竭
- B. 高热、惊厥、循环衰竭
- C. 高热、惊厥、呼吸衰竭
- D. 高热、昏迷、惊厥
- E. 高热、呼吸衰竭、循环衰竭

答案：C

12、急性重型肝炎的主要病理变化是：

- A. 毛细胆管瘀积
- B. 肝细胞灶性坏死
- C. 汇管区结缔组织增生
- D. 肝细胞广泛性坏死
- E. 肝小叶及汇管区单核细胞浸润

答案：D

13、在传染病管理中，属强制管理的传染病为：

- A. 艾滋病
- B. 肾综合征出血热
- C. 黑热病
- D. 肺结核
- E. 霍乱

答案：E

14、预防华支睾吸虫病最有效的措施是

- A. 普查普治病人
- B. 对猫、狗等家畜不喂食生鱼
- C. 不使未经灭害化处理的粪便污染水源
- D. 杀灭中间宿主
- E. 不生食和不食未煮熟的淡水鱼虾

答案：E

15、有关 SLE 的临床表现错误的是：

- A. 肾脏损害最常见
- B. 可发生狼疮性肺炎
- C. 可发生黄疸
- D. 可有心肌炎
- E. 晚期可有多关节畸形

答案：E

16、心力衰竭的基本病因之一是

- A. 大量饮酒
- B. 长期吸烟

- C. 长期卧床休息
- D. 长期情绪紧张
- E. 心脏长期负荷过重

答案：E

17、萎缩性胃炎为何可致缺铁性贫血

- A. 缺叶酸
- B. 缺胃酸
- C. 缺维生素 B12
- D. 缺铁
- E. 缺钴

答案：B

18、慢性呼衰时给 O<sub>2</sub> 方法是

- A. 不必吸氧
- B. 间断吸氧
- C. 高浓度吸氧
- D. 间断低流量吸氧
- E. 持续低流量、低浓度吸氧

答案：E

19、霍乱病人的吐泻物呈米泔水样，是因为：

- A. 缺乏胆汁
- B. 缺乏胃酸
- C. 缺乏肠液
- D. 含大量炎性细胞
- E. 病情严重

答案：A

20、糖尿病患者体育锻炼时应注意：

- A. 运动量不宜过大
- B. 在胰岛素注射前进行
- C. 运动量不宜过小
- D. 每 1—2 个月一次

E. 持续时间要长

答案：A

21、幽门梗阻伴严重呕吐可造成

A. 低钾性酸中毒

B. 低钾低氯性酸中毒

C. 低氯高钾性碱中毒

D. 低氯高钠性碱中毒

E. 低钾低氯性碱中毒

答案：E

22、预防风心病加重的根本措施是：A. 积极治疗心衰

B. 积极锻炼身体

C. 清淡饮食

D. 预防和治疗链球菌感染

E. 以上均不是

答案：D

23、急性脊髓炎的常用护理诊断为

A. 低效型呼吸型态

B. 躯体移动障碍

C. 感知改变

D. 潜在并发症

E. 肺炎

答案：B

24、系统性红斑狼疮常见皮损是

A. 紫癜

B. 蝶形红斑

C. 玫瑰疹

D. 荨麻疹

E. 血肿

答案：B

25、<sup>131</sup>I 检查最有意义的是：

- A. 鉴别不同病因的甲亢
- B. 估计甲亢严重程度
- C. 观察药物治疗疗效
- D. 观察 <sup>131</sup>I 治疗疗效
- E. 确定是否为手术适应证

答案：A

26、SLE 最常见的皮肤损害部位是：

- A. 胸部
- B. 腹部
- C. 颈部
- D. 背部
- E. 暴露部位

答案：E

27、特发性血小板减少性紫癜最常见的出血部位为：

- A. 皮肤黏膜
- B. 消化道
- C. 泌尿道
- D. 生殖道
- E. 颅内

答案：A

28、低蛋白饮食对慢性肾炎有何好处

- A. 达到低糖
- B. 达到低磷
- C. 达到低脂
- D. 达到低热量
- E. 达到低钙

答案：B

29、心源性水肿的原因是

- A. 左心衰竭
- B. 心包炎

- C. 右心衰竭
- D. 心肌炎
- E. 心肌病

答案：A

30、最近认为慢性胃炎的发病可能与哪种细菌感染有关：

- A. 大肠埃希菌
- B. 沙门菌
- C. 幽门螺杆菌
- D. 空肠弯曲菌
- E. 嗜盐杆菌

答案：C

31、甲型肝炎的传播方式是

- A. 飞沫
- B. 粪一口
- C. 母一婴
- D. 血液传播为主
- E. 虫媒

答案：B

32、不符合短暂性脑缺血发作的临床特征是

- A. 突然起病
- B. 迅速出现局限性神经功能障碍
- C. 症状持续时间短，恢复快
- D. 不遗留后遗症
- E. 常反复发作但症状不同

答案：E

33、严重流行性出血热病人可出现高血容量综合征，主要发生在

- A. 发热期
- B. 低血压休克期
- C. 少尿期
- D. 多尿期



E. 恢复期

答案：C

34、以心电示波器持续监护心律失常病人，下列哪项表现为危急征兆

A. 心率增快达 126 次 / min

B. 房颤 QRS 波变为规则出现

C. 室上速转为窦性心律

D. 室性期前收缩次数明显增多

E. 室性期前收缩出现 RonT 现象

答案：E

35、急性糜烂性胃炎的主要临床表现是

A. 上消化道出血

B. 上腹部疼痛、烧灼感

C. 恶心、呕吐

D. 上腹饱胀、食欲不振、暖气等

E. 上腹部隐痛

答案：A

36、心绞痛发作时不出现下列哪项心电图改变：

A. ST 段降低  $>0.05\text{mV}$

B. T 波平坦、双相或倒置

C. ST 段降低，伴 T 波倒置

D. QRS 波群  $>0.12\text{s}$

E. ST 段降低，伴 T 波倒置

答案：D

37、缺铁性贫血的细胞形态学表现为

A. 小细胞正常色素性贫血

B. 小细胞低色素性贫血

C. 正常细胞正常色素性贫血

D. 低色素性贫血

E. 大细胞性贫血

答案：B

38、关于消化道隔离，下列哪项是错误的

- A. 最好同一病种病人收住同一病室
- B. 工作人员密切接触病人时应穿隔离衣、戴帽子及口罩、穿隔离鞋
- C. 病人的用品、食具、便器、排泄物、呕吐物均须消毒
- D. 病室应有防蝇及灭蝇设施
- E. 病人可交换使用物品

答案：E

39、缺铁性贫血哪项化验可确诊

- A. 骨髓细胞外铁消失
- B. 骨髓细胞内铁消失
- C. 血清铁减少
- D. 铁蛋白减少
- E. 总铁结合力减少

答案：A

40、每个糖尿病患者必需的治疗是：

- A. 胰岛素治疗
- B. 胰岛素+降糖药
- C. 饮食治疗
- D. 饮食疗法+降糖药
- E. 胰岛素+饮食治疗

答案：C

41、贫血按发病机理可分为

- A. 红细胞生成减少及造血功能不良
- B. 红细胞生成减少及红细胞破坏过多
- C. 红细胞生成减少及红细胞破坏过多及失血三类
- D. 红细胞生成减少、溶血及再障
- E. 缺铁性贫血

答案：C

42、幽门梗阻时呕吐特点

- A. 鲜血

- B. 咖啡样
- C. 喷射性
- D. 隔夜食物
- E. 食后即吐

答案：D

43、甲状腺功能亢进患者的饮食宜给予：

- A. 高热量、高蛋白、高维生素
- B. 高热量、高蛋白、低维生素
- C. 高热量、高蛋白、高盐
- D. 高热量、低蛋白、低盐
- E. 低热量、低蛋白、低盐

答案：A

44、突然寒战，高热达40%，伴有咳嗽、胸痛，2h前服阿司匹林，出大汗后热退，血压10.6/6.5kPa，脉搏102次/min，神志清，四肢暖，白细胞 $20 \times 10^9$ 次方/L，胸片为右上肺大片状阴影，呈段分布。诊断为

- A. 休克型肺炎
- B. 葡萄球菌性肺炎
- C. 克雷伯杆菌肺炎
- D. 肺脓肿
- E. 肺炎球菌性肺炎

答案：E

45、SLE病人长期应用糖皮质激素治疗者可发

- A. 股骨头无菌性坏死
- B. 体位性低血压
- C. 关节畸形、关节固定于屈位
- D. 面部表情丧失呈假面具样
- E. 雷诺氏现象

答案：A

46、慢性肾炎所引起的肾功不全代偿期血肌酐水平

- A.  $<100 \mu\text{mol} / \text{L}$

- B.  $<170\mu\text{mol} / \text{L}$
- C.  $=178\mu\text{mol} / \text{L}$
- D.  $<178\mu\text{mol} / \text{L}$
- E.  $>178\mu\text{mol} / \text{L}$

答案：D

47、下述药物中，哪一种引起的再生障碍性贫血最多见

- A. 异烟肼
- B. 消炎痛
- C. 他巴唑
- D. 氯霉素
- E. 链霉素

答案：D

48、血小板正常值是

- A.  $100 \times 10^9$  次方- $300 \times 10^9$  次方 / L
- B.  $100 \times 10^8$  次方- $300 \times 10^9$  次方 / L
- C.  $50 \times 10^9$  次方- $300 \times 10^9$  次方 / L
- D.  $100 \times 10^8$  次方- $300 \times 10^9$  次方 / / L
- E.  $50 \times 10^8$  次方- $300 \times 10^8$  次方 / L

答案：A

49、缺铁性贫血铁剂治疗后最先提示有效的指标是

- A. 头痛、头晕等症状
- C. 总铁结合力恢复正常
- B. 血清铁上升
- D. 血红蛋白和红细胞最增加
- E. 网织红细胞增多

答案：E

50、糖尿病出现多尿的病因是

- A. 量过多
- B. 尿渗透压增高
- C. 药物不良反应

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005224133114011104>