

（中层管理）护理专业主管护师基础知识模拟和答案

2020年5月

护理专业主管护师基础知识模拟和答案

A1 型

1. 对消化性溃疡病人做健康教育，下列哪项是错误的

- A、生活要有规律，注意休息
- B、避免刺激性食物及饮料
- C、抑酸药宜在空腹时服用
- D、胃粘膜保护剂宜在饭后服
- E、季节变换注意保暖

答案：D

?

2. 紫绀的原因是：

- A、血液还原血红蛋白增多
- B、红细胞大量破坏
- C、局部瘀血
- D、毛细血管通透性增加
- E、血红蛋白增多

答案：A

?

3. 尿毒症患者皮肤瘙痒，不妥的护理措施是：

- A、保持皮肤清洁
- B、勤用温水洗皮肤
- C、常用肥皂、酒精擦身
- D、勤换衣裤、床单
- E、被褥应平整、柔软

答案：C

?

4. 长期卧床的心力衰竭病人，形成下肢静脉血栓时，当下床活动，易栓塞哪项脏器

- A、心脏
- B、脑组织
- C、肺组织
- D、肾脏

E、脾脏

答案：C

？

5 . 发生左心衰竭的病人最常见症状是

- A、便秘
- B、体重下降
- C、呼吸困难
- D、肌肉酸痛
- E、腹胀

答案：C

?

6 . 心机的营养供应主要来自下列哪项血液供应

- A、颈动脉
- B、乳内动脉
- C、头臂干动脉
- D、冠状动脉
- E、肱动脉

答案：D

?

7 . 肺脓肿患者进行体位引流时护士最重要监护的问题是下列哪项：

- A、发生窒息
- B、体温
- C、血压
- D、心率
- E、肺部湿罗音

答案：A

?

8 . 慢性肺原性心脏病急性加重期的常见诱因：

- A、过劳
- B、大量利尿
- C、使用镇静剂
- D、呼吸道感染
- E、使用支气管扩张剂

答案：D

?

9. 如发现大咯血患者有窒息先兆, 应立即采取的抢救措施是

A、用导管吸除血块, 保持呼吸道通畅

-
- B、作气管插管
 - C、进行气管切开
 - D、加压吸氧
 - E、应用呼吸兴奋剂

答案：A

？

10. 肝性脑病的护理措施中，最重要的环节是：

- A、加强基础护理
- B、注意休息保暖
- C、消除诱发因素
- D、严密观察病情
- E、做好知识宣教

答案：C

？

11. 急性坏死型胰腺炎所发生的休克属于

- A、中毒性休克
- B、低血容量性休克
- C、过敏性休克
- D、心源性休克
- E、神经源性休克

答案：B

？

12. 慢性胃炎的发病与哪种细菌感染有关

- A、大肠杆菌
- B、沙门菌
- C、空肠弯曲菌
- D、幽门杆菌
- E、嗜盐杆菌

答案：D

？

13. 乙型病毒性肝炎最主要的传播途径是

-
- A、粪-口传播
 - B、血行传播
 - C、呼吸道传播

D、蚊虫叮咬

E、水源传播

答案：B

?

14. 瘫痪病人的护理措施中，下列哪项不妥

A、保持肢体功能位

B、翻身、拍背

C、调整饮食以防便秘发生

D、鼓励病人多饮水

E、由于瘫痪肢体不易移动可将静脉输液放在瘫痪肢体侧

答案：E

?

15. 一般认为心脏停搏后脑组织对缺氧的耐受时间大约是：

A、3分钟

B、4-6分钟

C、7分钟

D、8分钟

E、10分钟

答案：B

?

16. 甲状腺功能亢进患者出现下列哪项表现，护士应警惕甲亢危象发生

A、高热， $T > 39^{\circ}\text{C}$ ，心率增快 140-120 次/分

B、甲状腺弥漫性，对称性肿大

C、情绪不稳，多言好动

D、怕热，多汗，常有消瘦

E、食欲亢进，大便次数增多

答案：A

?

17. 军团菌肺炎首选抗菌药物

A、红霉素

B、青霉素

C、丁胺卡那霉素

D、四环素

E、头孢菌素

答案：A

?

18. 急性左心衰病人进行酒精湿化给氧的目的是：

- A、稀释痰液
- B、松弛支气管平滑肌
- C、使肺泡内泡沫破裂而改善通气
- D、加强心肌收缩力
- E、消毒氧气湿化瓶

答案：C

?

19. 心源性呼吸困难的主要原因是：

- A、肺循环瘀血
- B、体循环瘀血
- C、气道痉挛狭窄
- D、呼吸中枢兴奋
- E、极度紧张、恐慌

答案：A

?

20. 右心衰病人常有的食欲不振、恶心、呕吐、腹痛等症状，是由于：

- A、肺循环瘀血
- B、胃肠道瘀血
- C、交感神经反射增强
- D、迷走神经反射增强
- E、左心室扩大压迫膈肌

答案：B

?

21. 护理评估开始的时间是

- A、做完治疗后开始评估
- B、第一次抽血后开始评估
- C、为病人做完入院介绍后开始评估
- D、与病人第一次见面时开始评估
- E、参加医生查房后开始评估

答案: D

?

22. 下列需避光使用的药物是：

- A、速尿
- B、消心痛
- C、卡托普利
- D、硝普钠
- E、西地兰

答案：D

?

23. 1999年世界卫生组织规定的高血压标准是：

- A、??血压 \geq 140/90mmHg
- B、??血压 \geq 160/95mmHg
- C、??收缩压 $>$ 140mmHg
- D、??舒张压 $>$ 90mmHg
- E、??收缩压 \geq 160mmHg

答案：A

?

24. 无尿是指成人24小时尿量少于

- A、400ml
- B、200ml
- C、100ml
- D、50ml
- E、10ml

答案：C

?

25. 急性肾炎水肿部位最早多由下列哪项开始

- A、眼睑
- B、面部
- C、腰部
- D、胫前区
- E、踝部

答案：A

?

26 . 我国引起肝硬化最常见的原因是 :

A、病毒性肝炎

-
- B、营养不良
 - C、酒精中毒
 - D、循环障碍
 - E、遗传因素

答案：A

?

27. 慢性阻塞性肺气肿常见的病因是

- A、慢性支气管
- B、尘肺
- C、支气管扩张症
- D、支气管哮喘
- E、抗胰蛋白酶不足

答案：A

?

28. 会阴部手术患者手术时应取

- A、截石位
- B、侧卧位
- C、颈仰卧位
- D、平卧位
- E、半卧位

答案：A

?

29. 全胃肠外营养时，中断或减慢下列哪种液体，易引起低血糖

- A、10%脂肪乳剂
- B、等渗生理盐水
- C、3%氨基酸溶液
- D、5%葡萄糖液
- E、20%葡萄糖液

答案：E

?

30. 高钠血症的诊断标准为血清钠

A、 >150mmol/L

B、 >160mmol/L

C、 >165mmol/L

D、135mmol/L-145mmol/L

E、125mmol/L-135mmol/L

答案：A

？

31. 抗休克治疗首要而基本的措施是

A、改善心功能

B、补充血容量

C、纠正酸中毒

D、改善周围血管张力

E、防治急性肾衰

答案：B

？

32. 体表或浅在的肿瘤最早出现的局部症状是

A、肿块

B、疼痛

C、出血

D、功能性改变

E、转移部位出现的症状

答案：A

？

33. 破伤风最早累及的肌肉是

A、面肌

B、膈肌

C、咀嚼肌

D、四肢肌

E、颈项肌

答案：C

？

34. 诊断败血症最可靠的依据是

A、出现休克

B、皮下出现淤点

C、肝、脾肿大及黄疸

D、寒战、高热,呈稽留热

E、血培养阳性

答案：E

?

35. 气性坏疽病人用过的敷料最好的灭菌方法是

- A、高压蒸气灭菌
- B、焚毁
- C、煮沸消毒 1 小时
- D、3%碘酊浸泡
- E、3% H_2O_2 浸泡

答案：B

?

36. 心跳、呼吸骤停初期有效的抢救措施是

- A、内注射急救药
- B、开胸心脏按压
- C、口对口呼吸加胸外心脏按压
- D、电击除颤
- E、低温疗法

答案：C

?

37. 外伤急救时若安置止血带，放松止血带的间隔时间是

- A、每 5 小时一次
- B、每 4 小时一次
- C、每 3 小时一次
- D、每 2 小时一次
- E、每 1 小时一次

答案：E

?

38. 烧伤休克期的主要病理生理改变是

- A、大量红细胞丧失
- B、大量水分蒸发
- C、大量体液从血管渗出
- D、疼痛
- E、败血症

答案：C

？

39. 诊断恶性肿瘤最可靠的依据是

- A、实验室检查
- B、B 型超声波
- C、放射性核素检查
- D、病理检查
- E、血管造影

答案：D

?

40. 休克经处理后，好转的指标是

- A、神志恢复清楚
- B、皮肤颜色转红
- C、肢端温度上升
- D、血压回升
- E、尿量增多

答案：E

?

41. 全麻术后出现急性肺不张的常见原因是

- A、饱食后急诊手术
- B、病人术前有急性呼吸道感染
- C、术前进行肺功能锻炼
- D、术前应用抗生素
- E、病人紧张

答案：B

?

42. 纠正低血钾时，尿量达到多少以上时才能静脉补钾

- A、15ml/h
- B、40ml/h
- C、60ml/h
- D、10ml/h
- E、5ml/h

答案：B

?

43 . 为监测 ICU 病室的环境情况，作空气培养的间隔时间是

A、10天一次

-
- B、20 天一次
 - C、30 天一次
 - D、45 天一次
 - E、60 天一次

答案：C

?

44 . 输入贮存久的库存血时，易引起

- A、高钠血症
- B、低钙血症
- C、高钾血症
- D、低钾血症
- E、低钠血症

答案：C

?

45 . 骨盆的组成是由

- A、骶骨、尾骨及髌骨
- B、骶骨和尾骨
- C、髌骨、坐骨及耻骨
- D、髌骨、骶骨、尾骨
- E、耻骨、髌骨和尾骨

正确答案：A

?

46 . 外阴局部受伤易形成水肿的部位

- A、大阴唇
- B、小阴唇
- C、阴阜
- D、阴道前庭
- E、阴蒂

正确答案：A

?

47 . 月经周期 32 天，其排卵时间在月经

-
- A、第 16 天
 - B、第 18 天
 - C、第 20 天

D、第 22 天

E、第 24 天

正确答案：B

?

48. 女性内生殖器下述哪项正确

A、尿道

B、阴唇系带

C、处女膜

D、小阴唇

E、输卵管

答案：E

?

49. 卵巢功能最稳定生育最旺盛的时期为

A、幼年期

B、青春期

C、性成熟期

D、老年期

E、更年期

正确答案：C

?

50. 头先露中，最常见的是

A、枕先露

B、面先露

C、前凶先露

D、颞先露

E、复合先露

正确答案：A

?

51. 下列各项，不能推算胎龄的是

A、末次月经

B、胎动出现时间

C、木质听筒开始听到胎心

D、黄体酮试验

E、早孕反应出现时间

正确答案：D

？

52. 影响子宫复旧的因素是

- A、授乳
- B、妊娠高血压综合症
- C、子宫炎症
- D、胎盘功能不良
- E、以上都不是

正确答案：C

？

53. 异位妊娠时，受精卵最易着床的部位是

- A、宫颈
- B、卵巢
- C、输卵管
- D、腹腔
- E、以上都不是

正确答案：C

？

54. 足月胎儿脐带平均长度为

- A、30cm
- B、40cm
- C、50cm
- D、75cm
- E、80cm

正确答案；C

？

55. 目前我国采用的围产期定义是

- A、孕满 28 周至产后 7 天之内
- B、孕满 30 周至产后 7 天
- C、孕满 12 周至产后 7 天
- D、孕满 28 周至产后 30 天
- E、孕满 28 周至产后 3 天

正确答案：A

？

56 . 高危妊娠是指

- A、对胎儿有危害的妊娠
- B、对孕妇有危险的妊娠
- C、凡可能危害母儿或导致难产的妊娠
- D、对新生儿有高度危险性
- E、对母儿都有生命危险

正确答案：C

?

57 . 下列哪项是胎儿娩出的主要力量

- A、子宫收缩力
- B、腹肌收缩力
- C、膈肌收缩力
- D、肛提肌收缩力
- E、膈肌和腹肌的协同力量

正确答案：A

?

58 . 目前我国引起产妇死亡占首位的原因是

- A、妊娠合并心脏病
- B、产后出血
- C、妊高征
- D、产后感染
- E、羊水栓塞

正确答案：B

?

59 . 女性生殖器结核最常见的是

- A、输卵管结核
- B、子宫内膜结核
- C、子宫颈结核
- D、卵巢结核
- E、盆腔腹膜结核

正确答案：A

?

60 . 下述哪项不是儿科护士为患儿家长宣教的内容

A、帮助患儿适应医院

-
- B、教会家长为患儿作出护理诊断
 - C、帮助患儿接受各种治疗
 - D、指导家长如何观察患儿的病情
 - E、帮助家长掌握患儿出院后护理

答案：B

？

61 . 生长发育的顺序中，哪项提法是错误的

- A、生长发育遵循由上到下的顺序
- B、生长发育遵循由近到远的顺序
- C、生长发育遵循由细到粗的顺序
- D、生长发育由简单到复杂的顺序
- E、生长发育由低级到高级的顺序

答案：C

？

62 . 正常 1 岁 8 个月小儿乳牙应有

- A、8-10 个
- B、10-12 个
- C、14-16 个
- D、18-20 个
- E、20-22 个

答案：C

？

63 . 最晚到生后几岁仍不能自我控制排尿称遗尿

- A、2岁
- B、3岁
- C、4岁
- D、5岁
- E、6岁

答案：D

？

64 . 新生儿期应接种的疫苗是：

- A、麻疹减毒活疫苗
- B、破伤风抗毒素

C、乙脑疫苗

D、百、白、破疫苗

E、卡介苗、乙肝疫苗

答案：E

?

65. 母亲正常分娩后何时喂哺自己的婴儿

A、产后立即

B、产后 2 小时

C、产后 4 小时

D、产后 6 小时

E、产后 8 小时

答案：A

?

66. 2 个月以内婴儿，应添加的辅食是

A、维生素 AD、果水

B、米汤、蛋黄

C、粥、肝泥

D、米糊、鱼泥

E、菜泥、豆腐

答案：A

?

67. 体重 2000g 的早产儿，出生三天，暖箱设定的温度是

A、31°C

B、32°C

C、33°C

D、34°C

E、35°C

答案：C

?

68. 小儿腹泻静脉补钾治疗中，正确的浓度是

A、静脉推注 0.3%氯化钾液体

B、静脉滴注 0.3%氯化钾液体

C、静脉推注 3%氯化钾液体

D、静脉滴注 3%氯化钾液体

E、静脉滴注 0.03%氯化钾的液体

答案：B

?

69. 为监测 ICU 病室的环境情况，作空气培养的间隔时间是

- A、10天一次
- B、20天一次
- C、30天一次
- D、45天一次
- E、60天一次

答案：C

?

70. 亚性肿瘤病人化疗期间，白细胞下降到 $4 \times 10^9/L$ ，首先应

- A、服用利血生
- B、少量多次输血
- C、暂时停药
- D、加强营养
- E、中药治疗

答案：C

?

A2 题型

71. 患者男性，56岁，诊断为急性胰腺炎，经治疗后腹痛、呕吐基本消失，开始进食时应给

- A、无渣半流质
- B、低脂低蛋白流质
- C、高脂高蛋白流质
- D、高脂低蛋白流质
- E、低脂高蛋白流质

答案：B

?

72. 某青年患者，平素体健，现因受凉后出现咳嗽伴少量粘痰发热，下列哪项护理措施不妥

- A、应适当休息饮水
- B、咽痛可用淡盐水漱口

C、咳痰时给予吸痰

D、发热者可适量服退热剂

E、按医嘱给予抗生素

答案：C

?

73 . 患者女性 15 岁，确诊为 1 型糖尿病 1 年，一直坚持胰岛素治疗，近期出现显著乏力，口渴严重，尿量增加并伴有头痛，此时应警惕发生：

A、脑血管意外

B、糖尿病高渗性昏迷

C、乳酸性酸中毒

D、糖尿病酮症酸中毒

E、低血糖性昏迷

答案：D

?

74 . 5 个月小儿接种百、白、破混合疫苗，1 天后体温 37.1℃,局部出现红、肿、热、痛

A、接种后全身反应

B、接种后全身中等反应

C、接种过敏反应

D、接种后局部强反应

E、接种后局部弱反应

答案：E

?

75 . 6 个月婴儿，在儿科门诊检查，下列哪项情况认为是发育异常

A、前囟未闭

B、头围 44cm

C、乳牙未萌出

D、俯卧时不能抬胸

E、两手不会传递玩具

答案：D

?

76 . 8 个月早产儿，现 15 天。母乳喂养，为预防佝偻病首先应添加的是

A、米汤

B、菜汤

-
- C、鱼肝油
 - D、水果汁
 - E、蛋黄

答案：C

?

77. 女性, 60岁, 颈后局限性肿痛6天, 伴有畏寒、发热38.5°C, 来急诊时已用抗生素治疗3天, 体格检查见颈后发际下方肿胀, 皮肤红肿, 质地坚韧, 界限不清, 中央多个小脓头伴坏死组织, 白细胞数 $16 \times 10^9/L$, 中性粒细胞0.90(90%)。此时最恰当的治疗选择是

- A、继续抗生素静脉应用
- B、理疗
- C、做“+” “++” 或“+++”形切口引流
- D、外敷中药膏
- E、免疫治疗

答案：C

?

78. 一个三岁小儿跌倒在热粥锅里, 面、颈、发部及双上肢II°烫伤, 其烫伤面积为

- A、21%
- B、14%
- C、23%
- D、36%
- E、27%

答案：D

?

A3 题型

(79-80 共用题干)

某男性患者, 58岁, 有慢性支气管炎病史20年, 已并发肺气肿。今晨因用力大便后突感右胸口疼痛, 伴干咳、呼吸困难、并渐出现紫绀, 体检见气管明显向左移位

79. 此时患者最确切的医疗诊断是:

- A、合并气胸
- B、急性心肌梗死
- C、急性右心衰竭
- D、急性呼吸窘迫综合征
- E、合并胸腔积液

答案：A

80. 此患者病变部位的叩诊音为:

- A、清音

B、浊音

-
- C、鼓音
 - D、实音
 - E、浊、实音

答案：C

?

(81-83 共用题干)

某新生儿，生后 20 天，体检正常，护士到家中做健康指导

81. 居室温度应保持

- A、16°C - 18°C
- B、18°C - 20°C
- C、20°C - 21°C
- D、22°C - 24°C
- E、25°C - 28°C

答案：D

82. 预防意外事故的重点是

- A、坠床
- B、玩锐利器
- C、开水烫伤
- D、喂奶后窒息
- E、相互打闹

答案：D

83. 应使家属了解该儿已接种的疫苗是

- A、卡介苗、乙肝疫苗
- B、乙型脑炎疫苗
- C、麻疹减毒活疫苗
- D、百、白、破混合疫苗
- E、脊髓灰质炎减毒活疫苗

答案：A

?

(84-86 共用题干)

男性，18 岁，体重 60 公斤，反复呕吐 10 余天，主诉：乏力、头晕、视觉模糊。体检：血压 12.5/8.5kpa (94/64mmHg)，脉搏 90 次/分，呼吸 20 次/分，血清钠 132mmol/L，血清钾 3.5mmol/L，血 PH 值为 7.35。

84 . 该病人的水、电解质失衡属

-
- A、高渗性脱水
 - B、低渗性缺水
 - C、代谢性碱中毒
 - D、低钾血症
 - E、代谢性酸中毒

答案：B

85. 根据上题水、电解质失衡的诊断，此病人应补哪种液体

- A、等渗盐水
- B、3%-5%盐水
- C、5%的葡萄糖液
- D、2%NaHCO₃
- E、10%葡萄糖液

答案：A

86. 若病人因病情需要进行胃肠减压时应用下列哪种溶液冲洗胃管

- A、注射用水
- B、生理盐水
- C、凉开水
- D、10%氯化钠
- E、3-5%氯化钠

答案：B

?

?

B1 型

(87-88 共用题干)

- A、呼气性呼吸困难
- B、吸气性呼吸困难
- C、深大呼吸
- D、呼吸浅促
- E、呼吸节律异常

87. 支气管哮喘

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/008005101045007005>