

2023 年重症救治技能理论考核

一、选择题

1 中心静脉压监测，CVP<2-5cmH₂O 时，提示 [单选题] *

- A、右心房充盈欠佳 ✓
- B、右心功能不全
- C、血容量过多
- D、左心房充盈欠佳

2、以下可作为中心静脉导管短期维护的首选冲洗液的是 [单选题] *

- A、肝素盐水
- B、生理盐水 ✓
- C、5%葡萄糖注射液
- D、肝素钠+5%葡萄糖注射液

3、中心静脉压监测时，患者尽量处于平卧位，以（ ）为测压零点，防止认为误差。 [单选题] *

- A、腋中线第 4 肋间隙 ✓
- B、腋前线第 4 肋间隙
- C、腋中线第 5 肋间隙
- D、腋前线第 5 肋间隙

4、有创血压监测时，冲洗液使用加压袋加压至（ ），可保持保持管道通畅，防止血液凝固。 [单选题] *

- A、250mmHg
- B、300mmHg ✓

C、350mmHg

D、400mmHg

5、肺动脉压主要反映肺动脉血管张力，正常值 [单选题] *

A、10-15mmHg

B、15-20mmHg

C、20-25mmHg

D、10-20mmHg√

6、心电监测操作中，11 导联位置 [单选题] *

A、右锁骨中线第二类肋间隙

B、右锁骨中线第二类肋间隙

C、左锁骨中线剑突水平处 V

D、右锁骨中线剑突水平处

7、属于心脏电复律禁忌症的是 [单选题] *

A、具有潜在诱发更快速性心律失常风险者 V

B、房室颤动伴预激前传

C、治疗无效的室性心动过速

D、心房颤动

8、安装有起搏器患者除颤时，电极板至少与起搏器间隔 [单选题]

A、至少 8cm

B、至少 5cm

C、至少 10cm√

9、心脏电复律时，心底电极板应放置 [单选题] *

A、右锁骨正下方 ✓

B、左锁骨正下方

C、左乳头夕 H≡

D、左乳头外侧第五肋与腋中线交汇处

10、一般表示 Allen 试验阳性的时间是 [单选题] *

A、5~7 秒

B、>7 秒 7

C、<3 秒

D、>15 秒

11、动脉血气分析采血时，以穿刺点为中心，消毒范围是 [单选题] *

A、5cmX5cm

B、8cmX8cm ✓

C、6cmX6cm

D、7cmX7cm

12、采集动脉血气标本后，标本运送应在（）内完成 [单选题] *

A、60min

B、45min

C、30min ✓

D、90min

13、女性，55岁，为慢性阻塞性肺疾病（COPD）气肿型患者，近年来轻微活动即感气急，咳嗽轻、

咳痰少。血气分析： PaO_2 50mmHg, $PaCO_2$ 70mmHg。该 COPD 患者病情发展已出现 [单选题]

A、I型呼吸衰竭

B、II型呼吸衰竭 ✓

C、低氧血症

D、高碳酸血症

14、患者 PH 值为 7.58,PaCO₂ 为 20mmHg,PaO₂ 为 110mmHg,可判为 [单选题] *

A、呼酸+代碱

B、单纯性呼吸性碱中毒 ✓

C、单纯性呼吸性酸中毒

D、代谢性碱中毒

15、患者 PH 值为 7.25,PaCO₂ 为 35mmHg,PaO₂ 为 90mmHg,可判为 [单选题] *

A、原发性呼酸+代酸

B、单纯性呼吸性碱中毒

C、单纯性呼吸性酸中毒

D、代谢性酸中毒 ✓

16、气管插管患者气囊压力应维持在 [单选题] *

A、20-25cmH₂O

B、25-30cmH₂O ✓

C、30-35cmH₂O

D、5-40cmH₂O

17、肺梗患者用尿激酶或链激酶溶栓后，每（）小时测定 PT 和 APTT 一次。 [单选题] *

A、2

C、9-24

D、2-4√

18、呼吸机管路积水杯水满（）需及时倾倒 [单选题] *

A、1/4

B、1/3

C、2/3√

D、1/2

19、成人经口气管插管深度为（） [单选题] *

A.21+2cm√

B.18+2cm

C.24+2cm

D.26+2cm

E.28+2cm

20、下列关于气管插管单肺通气说法错误的是 [单选题] *

A、容易误入右支气管

B、听诊双肺呼吸音对称 V

C、双侧胸廓膨胀不一致

D、患者血氧饱和度差

E、潮气量低

21、使用成人使用简易呼吸球囊时，按压频率 [单选题] *

C、12-15 次/分 ✓

D、16-20 次/分

E、14-20"分

22、简易呼吸球囊，预防患者呼出气体逆流回球体的装置是 [单选题] *

A、呼气阀

B、进气阀

C、单向阀 ✓

D、安全阀

E、空气补充阀

23、W-ECMO 主要适应证包括（）等原因引起的严重急性呼吸衰竭。 [单选题] *

A、ARDS 患者

B、肺移植患者

C、支气管哮喘、肺栓塞、大气道阻塞

D、慢性阻塞性肺疾病

E、以上都是 ✓

24、俯卧 M 立通气的绝对禁忌症 [单选题] *

A、存在气道梗阻甚至窒息的风险

B、心源性肺水肿导致的呼吸衰竭

C、身体腹侧体表存在损伤或伤口而影响俯卧位实施

D、有颈椎、脊柱不稳定性骨折，需要固定

E、以上都是 ✓

25、严重酸中毒的患者选择哪一种模式最合适 [单选题] *

- A、CWH
- B、CWHD√
- C、CVVHDF
- D、SCUF

26、以下哪种情况说明血透导管性能好 [单选题] *

- A、5s 内抽出 10m1 血液
- B、8s 内抽出 10m1 血液
- C、6s 内抽出 20m1 血液√
- D、6s 内抽出 15m1 血液

27、某患者尿毒症患者三天前有消化道出血,拟今行血液净化治疗,查凝血 APTT35s,该患者适合哪一种

抗凝方式 [单选题] *

- A、无抗凝
- B、普通肝素钠
- C、枸橼酸三钠√
- D、低分子肝素钠

28、某患者诊断系统性红斑狼疮,拟行血浆置换,请问其原理是什么 [单选题] *

- A、超滤
- B、对流√
- C、吸附
- D、弥散

29、关于 CRRT 以下哪种说法正确 [单选题] *

- A、机器出现黄灯无需处理，直接静音即可
- B、金宝血透机关闭称时必须听到“咔嚓”声 ✓

C、预充开始后必须充分拍打滤器以便排气

D、血液净化中动脉压-40mmHg 说明血透导管血栓形成, 立即处理

30、对于重症无 EN 禁忌证的患者, 除以下哪些情况外应尽早启动 EN [单选题] *

A、MAP≥55mmHg

B、MAP≥65mmHg ✓

C、 $p_aO_2 < 40$ mmHg

D、血管活性药在减量或撤出过程中

31、以下哪项不是 AGI 分级标准 I 级临床表现 [单选题] *

A、恶心、呕吐

B、肠鸣音减弱

C、大便次数减少或不停大便

D、4 小时胃潴留超过 150ml ✓

E、肠鸣音消失

32、提高肠内营养耐受性的循证推荐开始肠内营养的速度应以（）为宜，同时监测腹部和胃肠道症状。

[单选题] *

A、5-10ml/h

B、10-15ml/h

C、10-20ml/h ✓

D、20-25ml/h

E、20-30ml/h

33、下列不属于盐酸肾上腺素的药理作用的是 [单选题] *

- A、加强心肌收缩力
- B、提升心率
- C、减少心肌耗氧量 ✓
- D、收缩皮肤及内脏小血管
- E、松弛支气管平滑肌，解除支气管痉挛

34、下列关于异丙肾上腺素描述错误的是 [单选题] *

- A、禁止与碱性药物合用
- B、使用时应注意心率变化
- C、可兴奋 α 及 β 受体 ✓
- D、可松弛支气管平滑肌，缓解支气管哮喘
- E、可加快心率

35、下列不属于去乙酰毛花苷中毒反应的是 [单选题] *

- A、恶性呕吐
- B、头痛
- C、心动过速 ✓
- D、黄视
- E、心动过缓

36、下列关于盐酸胺碘酮描述错误的是 [单选题] *

- A、降低心率
- B、治疗室速
- C、与 0.9%氯化钠稀释使用 ✓
- D、使用时注意心率变化

E、选择粗大血管, 预防外渗

37、下列不属于硝酸甘油作用的是 [单选题] *

A、增加心肌耗氧量, 缓解心绞痛,

B、扩张冠状动脉, 增加心肌供氧

C、扩张周围血管, 降低血压

D、松弛血管平滑肌

E、冠心病心绞痛的治疗及预防

38、抗休克药物使用注意事项 () [单选题] *

A、肾上腺素和去甲肾上腺素避光保存, 但无需避光使用。

B、血管活性药物外渗或者长期使用可能会引起局部组织的坏死, 建议使用粗大的静脉给药。

C、用药过程中要连续的监护心率、血压、尿量等。

D、血管活性药物均显酸性, 不可与碱性药物合用或者同时输注。

E、以上都是 ✓

39、以下不是体外心肺复苏的绝对禁忌证 [单选题] *

A、心脏骤停前意识状态严重受损

B、多脏器功能障碍

C、创伤性出血无法控制, 消化道大出血, 活动性颅内出血

D、左心室血栓

E、心脏骤停时间已超过 60min ✓

40、使用呼吸机注意事项 [单选题] *

A、不推荐周期性更换回路

B、回路以患者一用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/008134053054006034>