

2022 年江西省成考（专升本）大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、胸膜下界的体表投影在腋中线相交于()

- (A)第 8 肋
- (B)第 9 肋
- (C)第 10 肋
- (D)第 11 肋

2、增加冠脉血流量最主要的因素是（）

- (A)交感神经兴奋
- (B)迷走神经兴奋
- (C)血管紧张素 II 分泌增多
- (D)心肌代谢增强
- (E)血管升压素分泌增多

3、呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是（）

- (A)呼气末
- (B)呼气中期
- (C)吸气初
- (D)吸气中期
- (E)吸气末

4、关于外科感染，叙述不正确的是（）

- (A)疔是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
- (C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染

(D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

5、男，45岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延3小时就诊。查体：T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是（）

(A)急性胃穿孔

(B)急性胃肠炎

(C)急性肠梗阻

(D)急性胰腺炎

(E)急性胆管炎

6、舌前2/3味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是（）

(A)动眼神经

(B)面神经

(C)三叉神经

(D)上颌神经

(E)舌下神经

7、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

(A)静息电位大小

(B)阈强度大小

(C)动作电位幅度

(D)动作电位宽度

8、某心悸患者查体所见：脉率89次/分，心率113次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是（）

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

9、测量血压时舒张压的判定为 ()

(A)听到声音变短促前的压力

(B)听到柔和吹风样杂音时的压力

(C)听到响亮拍击音时的压力

(D)拍击音重新出现时的压力

(E)声音消失时的压力

10、某心悸患者查体所见：脉率 89 次/分，心率 113 次/分，心律绝对不齐。最可能的诊断是 ()

(A)房性期前收缩

(B)室上性心动过速

(C)心房颤动

(D)心室颤动

(E)室性期前收缩

11、呕血与咯血最重要的鉴别点是 ()

(A)是否为大出血

(B)是否伴有恶心

(C)是否伴有黑便

(D)是否伴有发热

(E)是否混有胃内容物

12、污染伤口是指（）

(A)有细菌存在，但尚未发生感染的伤口

(B)有细菌存在，并已发生感染的伤口

(C)局部红肿并有分泌物的伤口

(D)腹股沟疝手术切口

(E)已化脓的伤口

13、与组织液中含量基本相同的血浆成分是（）

(A)球蛋白

(B)纤维蛋白原

(C)清蛋白

(D)透明质酸

(E)电解质

14、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，

AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

(A)肾功能不全伴黄疸

(B)肝功能异常伴血脂异常

(C)肝功能衰竭伴黄疸

(D)糖尿病伴肾功能不全

(E)糖尿病伴血脂异常

15、二尖瓣关闭不全典型的体征是（）

(A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音

(B)胸骨左缘第2肋间闻及 GrahamStell 杂音

(C)心尖部闻及舒张中期杂音

(D)胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音

(E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

16、小儿头颈部烧伤所占体表面积的百分比是【】

(A) 9%

(B) $[9+(12-\text{年龄})]\%$

(C) 12%

(D) $9\%\times 2$

(E) $(9+\text{年龄})\%$

17、Brudzinski 征阳性的表现是 ()

(A)趾背伸四趾屈曲

(B)颈部抵抗增强

(C)股四头肌收缩

(D)伸膝受阻伴疼痛

(E)髌关节及膝关节屈曲

18、男，65 岁。间断咳喘 20 年，曾被确诊为“慢性阻塞性肺疾病”。因喘憋加重伴双下肢水肿半年就诊。引起水肿最可能的原因是【】

(A) 肝硬化失代偿

(B) 慢性右心衰竭

(C) 下肢静脉血栓

(D) 药物不良反应

(E) 营养不良

19、防止子宫脱垂的主要结构是()

(A)子宫圆韧带

(B)子宫主韧带

(C)子宫阔韧带

(D)子宫骶韧带

20、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

(A)双眼视野鼻侧半偏盲

(B)患侧视野鼻侧半偏盲

(C)双眼视野对侧半同向性偏盲

(D)双眼视野颞侧半偏盲

(E)患侧眼全盲

21、下列属于内耳结构的是【】

(A) 鼓室

(B) 鼓膜

(C) 乳突小房

(D) 咽鼓管

(E) 耳蜗

22、下列属于腺垂体激素的是【】

(A) 生长激素

(B) 甲状腺素

(C) 缩宫素

(D) 血管加压素

(E) 生长抑素

23、引起肝浊音界消失最常见的原因是【】

(A) 胃肠穿孔

- (B) 肺气肿
- (C) 间位结肠
- (D) 肠梗阻
- (E) 内脏转位

24、男，40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是

- ()
- (A) 主动脉夹层
 - (B) 原发性肝癌
 - (C) 缺血性肠病
 - (D) 门静脉血栓
 - (E) 肾动脉狭窄

25、呼吸过程中肺内压最低值出现的时期是 ()

- (A) 呼气末
- (B) 呼气中期
- (C) 吸气初
- (D) 吸气中期
- (E) 吸气末

26、脊髓前角 α 神经元兴奋，可引起变化是【】

- (A) 腱器官传入冲动减少
- (B) 梭内肌收缩
- (C) γ 传出冲动增加
- (D) 梭外肌收缩
- (E) 肌梭传入冲动增加

27、不属于中耳的结构是（）

(A)前庭

(B)乳突小房

(C)鼓室

(D)乳突窦

(E)咽鼓管

28、男，50岁。体重70kg。该患者体内的细胞外液量约为（）

(A)16000mL

(B)12000mL

(C)14000mL

(D)20000mL

(E)18000mL

29、关于外科感染，叙述不正确的是（）

(A)疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染

(C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染

(D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染

(E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

30、参与脂肪消化和吸收的主要胆汁成分是【】

(A)胆盐

(B)阴离子

(C)胆固醇

(D)胆色素

(E) 磷脂酰胆碱

31、不含消化酶的消化液是()

(A)胰液

(B)胃液

(C)胆汁

(D)肠液

32、幼年期生长激素分泌过多最终可患的病症是（）

(A)侏儒症

(B)呆小症

(C)肢端肥大症

(D)巨人症

(E)向心性肥胖

33、术前准备中，下列处理错误的是【】

(A)心力衰竭的患者需控制3~4周后才实行手术

(B)血浆白蛋白测定低于30g/L，则术前需肠内或肠外营养支持

(C)肝功能损害者经治疗好转后方可手术

(D)糖尿病患者手术前应将血糖控制到正常

(E)肾功能重度损害者在有效的透析后仍能耐受手术

34、腭扁桃体所在的位置是()

(A)鼻咽侧壁

(B)喉咽侧壁

(C)口咽侧壁

(D)喉前庭侧壁

35、肺门的所在部位是（）

- (A)肺的膈面
- (B)肺的纵隔面
- (C)肺的胸肋面
- (D)肺底
- (E)肺尖的内面

36、造成心室前负荷增大的因素是（）

- (A)心肌收缩力增强
- (B)静脉回流速度下降
- (C)心室充盈量增大
- (D)心率增快
- (E)心室顺应性减小

37、汇合形成上腔静脉的是()

- (A)颈内静脉与锁骨下静脉
- (B)左、右头臂静脉
- (C)颈内静脉与奇静脉
- (D)颈外静脉与锁骨下静脉

38、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（）

- (A)5-羟色胺
- (B)肾上腺素
- (C)P 物质
- (D)乙酰胆碱

(E)去甲肾上腺素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/018126000051006050>