

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

2022 护士资格证考试《专业实务》题库（含答案）

1. 产妇发生产褥感染时，应采取的最佳体位是

- A. 平卧位
- B. 半卧位
- C. 侧卧位
- D. 截石位
- E. 头低脚高位

答案： B

2. 患者女，停经 9 周，少量阴道流血 3 天，无腹痛， 子宫符合孕月，宫口未开，B 超检查：宫内妊娠， 见胎心搏动。入院后主要的治疗原则是

- A. 保胎治疗
- B. 尽快清宫
- C. 止血补血
- D. 间断吸氧
- E. 预防感染

答案： A

3. 初产妇，剖宫产术后 10 天，突然阴道大量流血数小时，入院时血压 80/85mmHg，心率 110 次/分， 红蛋白 60g/L，首要的处理原则是

- A. 加强宫缩
- B. 预防感染

- C. 抢救休克
- D. 静脉输入缩宫素
- E. 按摩子宫

答案： C

4. 经产妇，3 年前自然分娩一男婴，体重 3700g，无 难产史，现孕 40 周，2 小时前开始规律宫缩，检查：宫缩持续 40?50 秒，间歇期 2~3 分钟，胎心率 130 次/分，头先露，宫口开 4cm，此时最恰当的处理是

- A. 入待产室观察
- B. 温肥皂水灌肠
- C. 给予人工破膜
- D. 静脉滴注缩宫素
- E. 急送产房准备分娩

答案： E

5. 妊娠合并病毒性肝炎的辅助检查不包括

- A. 肝功检查
- B. 肝炎病毒检测
- C. 凝血功能检查
- D. 胎盘功能
- E. 血 hCG 检查

答案： E

6. 因子宫收缩乏力引起的产后出血，首选的止血措施为

- A. 按摩子宫
- B. 给予止血药
- C. 子宫次全切
- D. 结扎盆腔血管止血
- E. 无菌纱布条填塞宫腔

答案： A

7. 有关羊水栓塞的处理，错误的是

- A. 纠正呼吸循环衰竭
- B. 抗过敏
- C. 抗生素预防感染
- D. 防止凝血功能障碍
- E. 等待自然分娩

答案： E

8. 鼻饲喂养适用于

- A. 吞咽功能不良的早产儿
- B. 足月小婴儿
- C. 低出生体重儿
- D. 足月新生儿
- E. 早产儿

答案： A

9. 以下哪项是未成熟儿易出现低体温的主要原因

- A. 代谢率高，产热少

- B. 体表面积相对较大，散热快
- C. 棕色脂肪多，产热少
- D. 体温调节功能强，散热快
- E. 肌肉发育差，产热少

答案： B

10. 法洛四联症脑缺氧发作时，应采取的体位是

- A. 半卧位
- B. 俯卧位
- C. 平卧位
- D. 侧卧位
- E. 胸膝位

答案： E

11. 下列血气变化属于 I 型呼吸衰竭的是

- A. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- B. $\text{PaO}_2 > 60\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- C. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 < 50\text{mmHg}$
- D. $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$
- E. $\text{PaO}_2 = 60\text{mmHg}$ 、 $\text{PaCO}_2 = 50\text{mmHg}$

答案： C

12. 支气管哮喘的常见病因为

- A. 剧烈运动
- B. 精神压力

- C. 接触过敏源
- D. 左心衰竭
- E. 使用某些药物

答案： C

13. 支气管哮喘发作的常见原因为

- A. 花粉
- B. 感染
- C. 运动
- D. 受凉
- E. 过敏

答案： E

14. COPD 病人发生肺心病，呼吸衰竭等并发症的主要原因为

- A. 精神因素
- B. 过度劳累
- C. 呼吸道感染
- D. 输液过快
- E. 抵抗力低下

答案： C

15. 引起慢性肺源性心脏病最常见的病因是

- A. 慢性阻塞性肺疾病
- B. 支气管哮喘
- C. 支气管扩张

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/026134232221010144>