



# 糖尿病及甲亢的合 理用药课件





contents

# 目录

- 糖尿病及甲亢疾病概述
- 糖尿病合理用药
- 甲亢合理用药
- 糖尿病与甲亢联合用药
- 案例分析

CATALOGUE

# 糖尿病及甲亢疾病概述



# 糖尿病的定义、症状及成因

定义



症状



成因



# 甲亢的定义、症状及成因

## 定义

甲状腺功能亢进症（甲亢）是指甲状腺激素分泌过多导致的全身代谢亢进综合征。




## 成因

甲亢的成因主要包括弥漫性毒性甲状腺肿（Graves病）、结节性毒性甲状腺肿和甲状腺自主高功能腺瘤等。

## 症状

心慌、手抖、怕热、多汗、食欲亢进、消瘦、体重下降等为主要症状，同时可能伴有甲状腺肿大、突眼等症状。





# 糖尿病与甲亢的关联性

## 关联性

---

糖尿病和甲亢可以同时存在于同一个体内，互相关联，相互影响。糖尿病患者容易合并甲状腺功能亢进症，而甲状腺功能亢进症也可能导致糖尿病的发生或加重。

## 关联机制

---

糖尿病与甲亢的关联机制较为复杂，主要涉及到激素水平和代谢紊乱等方面的相互作用。例如，甲状腺激素可以促进肠道对葡萄糖的吸收，增加肝糖原分解和糖异生作用，从而导致血糖升高；而高血糖状态也可能影响甲状腺功能，导致甲亢症状的出现或加重。

CATALOGUE

# 糖尿病的合理用药



# 糖尿病常用药物种类

胰岛素

口服降糖药

胰高血糖素样肽-1受体激动剂

DPP-4抑制剂







# 糖尿病药物的选用原则



01

根据患者病情和医生的建议选择合适的药物。



02

初始治疗应从小剂量开始，根据血糖控制情况逐步调整剂量。



03

尽量选择副作用较小的药物，避免药物相互作用。



04

注意药物的禁忌症和注意事项，遵循医生的用药指导。



# 糖尿病药物的副作用及处理



## 低血糖

胰岛素和口服降糖药使用不当可能导致低血糖，应定期监测血糖并及时调整药物剂量。



## 胃肠道不适

部分降糖药可能导致胃肠道不适，如恶心、呕吐、腹泻等，应遵循医生的建议调整药物剂量或更换药物。



## 过敏反应

部分患者可能对某些降糖药过敏，出现皮疹、呼吸困难等症状，应立即停药并就医。



## 肝肾功能损害

长期使用某些降糖药可能对肝肾功能造成损害，应定期监测肝肾功能并及时调整治疗方案。

CATALOGUE

# 甲亢的合理用药

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/027116013023006115>