

骨科脊柱病区实习生出科考试

1.在病室设置中，病床之间的距离至少应为（ ） [单选题] *

A.0.8m

B.1m✓

C.1.2m

D.1.4m

E.1.5m

2.患者的活动义齿取下后，应浸泡在（ ） [单选题] *

A.清水✓

B.生理盐水

C.碘伏

D.热水

E.75% 乙醇

3.腰间盘突出最容易发生的部位是（ ） [单选题] *

A.腰 1-2

B.腰 2-3

C.腰 3-4

D.腰 4-5✓

E.骶 1-2

4.骨科手病人中易哪类病人最易发生下肢深静脉栓塞()

[单选题] *

A. 上肢关节手术

B. 骨盆手术 ✓

C. 手部手术

D. 下肢手术

E. 脊柱手术

5. 骨折首要的治疗原则是 () [单选题] *

A. 复位 ✓

B. 固定

C. 牵引

D. 外展架固定

E. 功能锻炼

6. 骨牵引时牵引针孔处应 () [单选题] *

A. 滴 2% 碘酊每 4 小时一次

B. 滴 70% 酒精每 4 小时一次

C. 滴 2% 碘酊 1~2 次 / 日

D. 滴 75% 酒精 2 次 / 日 ✓

E. 纱布覆盖

7. 关于骨牵引的护理, 不正确的是 () [单选题] *

A. 做好骨突部位皮肤护理

B. 不可随意增减牵引重量

C. 床尾或床头抬高 15~30cm

D. 去除牵引孔的血痂 ✓

E. 保持牵引针眼清洁、干燥

8.主动运动是（ ） [单选题] *

A. 瘫痪严重患者

B. 中期功能锻炼的重点

C. 依靠患者自身力量进行锻炼✓

D. 关节僵硬

E. 在起动时需要帮助

9.在石膏固定患者的护理中最重要的评估内容是（ ） [单选题] *

A. 心理社会反应

B. 固定是否确切

C. 肢体血运情况✓

D. 生活自理能力

E. 既往身体状况

10.颈椎前路手术患者术后出现深部血肿多见于术后当日（ ）小时内 [单选题] *

12✓

24

36

48

72

11.腰间盘突出症最主要的临床表现是（ ） [单选题] *

A. 腰痛伴坐骨神经痛✓

B. 坐骨神经痛、大小便功能障碍

C. 腰和大腿后侧痛

D. 腿部和臀部痛

E. 腰痛

12.腰椎间盘突出早期的基本治疗方法是（ ） [单选题] *

A. 推拿按摩

B. 硬膜外注射皮质激素

C. 理疗

D. 完全卧床休息✓

E. 持续牵引

13.骨折的早期并发症是（ ） [单选题] *

骨筋膜室综合征✓

关节僵硬

骨化性肌炎

创伤性关节炎

缺血性骨坏死

14.王女士，72岁，因心肌梗死入院，护士为患者调控医院物理环境。适宜的病室温度应为（ ） [单选题] *

A.16 ~ 18℃

B.18 ~ 22℃

C.20 ~ 22℃

D.22 ~ 24℃✓

E.24 ~ 26℃

15.口腔霉菌感染，漱口液应该选用（ ） [单选题] *

A.1%~3%过氧化乙酸

B.2%~3%硼酸

C.1%~4%碳酸氢钠✓

D.0.02%呋喃西林

E.0.1%醋酸

16.一次鼻饲灌注的液量是（ ） [单选题] *

A.至少 200ml

B.至少 100ml

C.不超过 100ml

D.不超过 200ml✓

E.不超过 300ml

17.证实胃管在胃内的指征是（ ） [单选题] *

A.注入 20ml 空气，同时听到左上腹有气过水声

B.注入 10ml 温开水，同时听右上腹有无气过水声

C.胃管末端放入水杯内有气体逸出

D.注射器抽吸出黄绿色液体✓

E.注入 20ml 空气，同时听到右上腹有气过水声

18.肝硬化腹水，并出现肝昏迷的前兆，应给予（ ） [单选题] *

A.低脂肪，高热量饮食

B.高蛋白，高热量饮食

C.高蛋白，低盐饮食

D.高纤维素饮食

E.低蛋白，低盐饮食✓

19.需低盐饮食的成人，每日食盐量应低于（ ） [单选题] *

A.2mg

B.1g

C.2g✓

D.6g

E.12g

20.人体主要的散热器官是（ ） [单选题] *

A.肝脏

B.心脏

C.肺脏

D.皮肤✓

E.肌肤

21.败血症患者发热的常见热型为（ ） [单选题] *

A.稽留热

B.弛张热✓

C.间歇热

D.不规则热

E.波状热

22.潮式呼吸的特点是（ ） [单选题] *

A.呼吸暂停，呼吸减弱，呼吸增强反复出现

- B.呼吸减弱，呼吸增强，呼吸暂停反复出现
- C.呼吸浅慢，逐渐加快加深再变浅慢，呼吸暂停后，周而复始✓
- D.呼吸深快，呼吸暂停，呼吸浅慢，三者交替出现
- E.呼吸深快，逐步浅慢，以至暂停，反复出现

23.代谢性酸中毒患者，呼吸表现为（ ） [单选题] *

- A.吸气呼吸困难
- B.呼气呼吸困难
- C.间断呼吸
- D.呼吸深大而规则✓
- E.呼吸浅表而不规则

24.可使血压测量值偏高的原因有（ ） [单选题] *

- A.肢体位置过高
- B.袖带过紧
- C.袖带过松✓
- D.袖带过宽
- E.放气太快

25.成人正常情况下，尿比重为（ ） [单选题] *

- A.1.000 ~ 1.010
- B.1.000 ~ 1.015
- C.1.015 ~ 1.020
- D.1.015 ~ 1.025✓
- E.1.020 ~ 1.030

26.少尿是指 24 小时尿量少于 () [单选题] *

A.200ml

B.250ml

C.300ml

D.350ml

E.400ml✓

27.破伤风抗毒素皮试液 0.1ml 内含破伤风抗毒素 () [单选题] *

A.1500 Iu

B.500 Iu

C.150 Iu

D.50 Iu

E.15 Iu✓

28.下列属于胶体溶液的是 () [单选题] *

A.5%葡萄糖溶液

B.浓缩白蛋白✓

C.4%碳酸氢钠溶液

D.25%山梨醇

E.20%甘露醇

29.代谢性酸中毒的原因是 () [单选题] *

A.肠梗阻✓

B.低血钾

C.呼吸道梗阻

D.换气过度

E.幽门梗阻

30.对严重脱水，低血容量性休克患者可采取（ ） [单选题] *

A.两条静脉通路快速输液

B.每分钟 10 ~ 15 ml 的速度补液

C.静脉切开输液

D.深静脉插管补液

E.以上都对✓

31.中心静脉压是指（ ） [单选题] *

A.左心房压力

B.右心房及上下腔静脉压力✓

C.右心房的压力

D.下腔静脉的压力

E.上腔静脉的压力

32.严重损伤，心跳已停止，急救时首先应考虑（ ） [单选题] *

A.复苏术✓

B.清创缝合

C.抢救休克

D.固定骨折

E.做全面的体格检查

33.心脏复苏时首选药物是（ ） [单选题] *

A.肾上腺素✓

B.异丙基肾上腺素

C.利多卡因

D.阿托品

E.氯化钙

34.烧伤休克补液量是否充足，简易而重要的指标是（ ） [单选题] *

A.脉搏

B.血压

C.尿量✓

D.精神状态

E.末梢循环

35.张力性气胸急救的首选措施是（ ） [单选题] *

A.胸膜腔闭式引流排气减压

B.粗针头于伤侧第二肋间锁骨中线刺入胸膜腔✓

C.尽早剖胸探查，修补裂口

D.使用足量抗生素防治感染

E.以上都不是

36.计算基础代谢率的公式是（ ） [单选题] *

A.收缩压 + 脉压 - 111

B.舒张压 + 脉压 - 111

C.脉率 - 脉压 - 111

D.脉率 + 脉压 - 111✓

E.收缩压 + 舒张压 - 111

37.腹外疝最易发生嵌顿的是() [单选题] *

A.腹股沟直疝

B.股疝✓

C.腹股沟斜疝

D.脐疝

E.滑动性疝

38.手术区皮肤的准备哪项是错误的() [单选题] *

A.颅脑手术：术前 2 小时剃头

B.上腹部手术备皮范围：自乳头到耻骨联合平面，两侧到腋后线

C.颈部手术备皮范围：自唇下至乳头连线，两侧到斜方肌前缘

D.面部手术剃除眉毛✓

E.小儿手术备皮不剃毛，清洗即可

39.关于低血钾的治疗，下列哪项是错误的() [单选题] *

A.术后禁食 2 天以上病人应补钾

B.尿量 30ml / 小时以上可方静脉补钾

C.静脉补钾浓度不超过 0.3%

D.静脉补钾速度不超过 60 滴 / 分钟

E.严重低血钾应用 10%氯化钾 20ml 静注✓

40.服用时应避免与牙齿接触的药物是() [单选题] *

A.止咳糖浆

B.棕色合剂

C.硫酸亚铁✓

D.碳酸氢钠

E.颠茄合剂

41.帮助留置导尿管病人锻炼膀胱反射功能,护理措施是() [单选题] *

A.每周更换导尿管

B.间隙性夹管✓

C.温水冲洗外阴 2 次/d

D.定时给病人翻身

E.鼓励病人多饮水

42 肥皂水灌肠溶液的浓度是() [单选题] *

A.0.5%~1%

B.0.1%~0.2%✓

C.1%~2%

D.0.3%~0.4%

E.3%~4%

43.行大量不保留灌肠时,成人每次液体用量为() [单选题] *

A.50~100ml

B.100~200ml

C.200~500ml

D.500~1000ml✓

E.1000~1500ml

44.下列哪类药物服用后应多饮水() [单选题] *

A.铁剂

B.止咳糖浆

C.助消化药

D.健胃药

E.磺胺类药✓

45.护士在护理服用洋地黄药物的病人时,下列哪项不妥() [单选题] *

A.询问病人不适主诉

B.给药前先数心率

C.观察洋地黄药物浓度

D.心率 < 60 次/min,不能给药

E.嘱病人如果一次漏服,下一次要加量补服✓

46.从上午 8:00 开始输液,要求 5 小时内输入 1000ml.液体,此时,每分钟滴数应调节为() [单选题] *

A.40 滴

B.50 滴✓

C.60 滴

D.70 滴

E.80 滴

47. 输液中发现溶液不滴经检查为针头阻塞,正确的处理方法是() [单选题] *

A.调整针头位置

B.静脉内推注等渗盐水冲开

C.用手挤压胶管

D.输液局部热敷

E.更换针头重新穿刺✓

48.腰椎间盘突出症典型的体征是 [单选题] *

腰椎侧突

腰部活动受限，以前屈受限最明显

病变椎体棘突压痛和叩击痛

肌力下降

直腿抬高试验及加强试验阳性✓

49.发生医院内尿路感染最常见的诱因是 () [单选题] *

A.长期卧床

B.留置导尿管✓

C.膀胱冲洗

D.膀胱内注药

E.膀胱镜检查

50.下列消毒剂中属于中效消毒剂的是 () [单选题] *

A.戊二醛

B.过氧乙酸

C.氯己定

D.臭氧

E.聚维酮碘✓

51.以 15%过氧乙酸原液配制 0.3%过氧乙酸 100ML，下列方法中正确的是 () [单选题] *

A.原液稀释 200 倍

B.原液 30ML 加水 70ML

C.原液 20ml 加水 80ml

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/035043042142011103>