

# 门诊理论知识专项考核试题

## 一、单选题

1.正常血糖值范围（）[单选题] \*

- A. 空腹 3.9-6.1mmol/L
- B. 餐后<7.8mmol/L
- C. 随机血糖< 11.1mmol/L
- D. 以上说法均正确 ✓

2. 无菌操作中发现手套破裂应（）[单选题] \*

- A. 用无菌纱布将破裂处包好
- B. 用胶布将破裂处粘好
- C. 立即更换 ✓
- D. 再加套一副手套

3.根据爆发、流行情况和危害程度,《传染病防治法》将法定传染病分为多少类,共计多少种。( ) [单选题] \*

- A. 两类, 39 种
- B. 两类, 40 种
- C. 三类, 39 种
- D. 三类, 40 种 ✓

4. 血糖危急值范围（）[单选题] \*

- A. < 2.8mmol/L, >27.8mmol/L ✓

B.  $< 3.3\text{mmol/L}, >27.8\text{mmol/L}$

C.  $< 2.9\text{mmol/L}, >33.3\text{mmol/L}$

D.  $< 2.8\text{mmol/L}, >33.3\text{mmol/L}$

5.若标有“批号 200915”，有效期 2 年的药，其有效期是（） [单选题] \*

A. 2020 年 9 月 15 日

B. 2022 年 9 月 15 日 ✓

C. 2020 年 9 月 1 日

D. 2022 年 9 月 1 日

6. 以下不属于四防措施的是（） [单选题] \*

A. 防压疮

B. 防坠床

C. 防跌倒

D. 防走失 ✓

7.以下关于仪器设备管理要求描述正确的是（） [单选题] \*

A. 呼吸机、除颤仪每周检查性能是否良好并记录

B. 电动吸痰器、简易呼吸器每周检查性能是否良好并记录

C. 血压计定期计量检测 ✓

D. 血糖仪每日计量检测

8. 单选题 （ 2.0 分 ）

关于抢救物品描述错误的是（） [单选题] \*

A. 做到定种类、定位放置、定量保管、定期消毒

B. 无过期、无变质、无失效

C. 及时检查、及时补充,专人管理

D. 遇特殊情况,抢救物品可以外借 ✓

9. 下列关于新冠肺炎说法错误的是 ( ) [单选题] \*

A. 传染源主要是新冠病毒感染的患者和无症状感染者

B. 潜伏期尚无传染性 ✓

C. 经呼吸道飞沫和密切接触传播

D. 70% 乙醇、含氯消毒剂可有效灭活病毒

10. 抢救车内药品、物品效期在几个月内应及时更换 ( ) [单选题] \*

A. 3个月

B. 4个月

C. 5个月

D. 6个月 ✓

11. 以下属于乙类传染病的是 ( ) [单选题] \*

A. 鼠疫

B. 霍乱

C. 艾滋病 ✓

D. 流行性腮腺炎

12. 心肺复苏时急救者在电击后应 ( ) [单选题] \*

A. 立即检查呼吸和脉搏

B. 先行胸外心脏按压, 在 5 组后 (或者约 2 分钟) 心肺复苏后再进行心跳检查 ✓

C. 立即进行心电图检查

D. 调节好除颤仪, 准备第二次除颤

13. 手法开通气道时患者体位是（）[单选题] \*

- A. 头高脚低位
- B. 头低脚高位
- C. 无枕水平仰卧位 ✓
- D. 侧卧位

14. 特殊、典型不良事件讨论时限要求（）[单选题] \*

- A. 立即
- B. 24小时内
- C. 三天内
- D. 一周内 ✓

15. 血糖仪质控液保存说法错误的是（）[单选题] \*

- A. 每一瓶质控液在首次开启后 90 天内用完，开瓶即标示日期，请勿使用过期质控液
- B. 每次使用前，将质控液瓶倒置几次并轻轻摇动，以确保质控液混合均匀，并弃去第一滴质控液
- C. 质控液在 30 摄氏度以下的条件下保存，勿冷冻或冷藏
- D. 每一瓶质控液在首次开启后 60 天内用完，开瓶即标示日期，请勿使用过期质控液 ✓

16. 对护理应急队成员要求错误的是（）[单选题] \*

- A. 采取本人自愿报名+ 科室推荐的方式选拔
- B. 要求从事临床一线护理工作 5 年及以上 ✓
- C. 成员应相对固定，最短任职期为 2 年
- D. 具备较好的身体素质，较强的适应能力和应变能力

17. 科室在短时间内发现多少例同种耐药菌感染的患者应及时报告医院感染管理科（）[单选题] \*

- A.  $\geq 2$

B.  $\geq 3$  ✓

C.  $\geq 4$

D.  $\geq 5$

18. 关于护理文件书写描述错误的是 ( ) [单选题] \*

A. 护理文件书写严格按照卫生部《病历书写规范》执行

B. 护理文件书写由具备独立执业资格的护理人员完成

C. 各种执行单不入病历保存, 由科室单独保管 2 年

D. 患者外出会诊或转院时, 可由患者自行携带病历 ✓

19. 以下对护理不良事件管理要求描述错误的是 ( ) [单选题] \*

A. 实行非惩罚性上报, 鼓励护理人员通过口头、书面或网络等多种方式主动报告护理不良事件

B. 发生护理不良事件后, 科室应在三天内上报《护理不良事件报告表》至护理部 ✓

C. 对主动上报不良事件科室及责任人, 根据对患者造成的后果予以减免处罚

D. 对不良事件首先提出建设性意见的科室或个人给予奖励

20. 以下关于患者护理分级描述不正确的是 (D) [单选题] \*

A. 患者入院后应根据患者病情严重程度确定病情等级 ✓

B. 根据患者 Barthel 指数总分, 确定自理能力的等级

C. 临床医护人员应根据患者的病情和自理能力的变化动态

21. 以下消毒隔离实施错误的是 ( ) [单选题] \*

A. 使用中的氧气湿化瓶每周更换, 每天更换无菌注射用水

B. 病人安置原则: 感染病人与非感染病人分开安置, 同类感染病人和特殊感染病人相对集中安置

C. 消毒液开启注明日期, 手消毒液有效期 1 月, 碘伏、酒精消毒液有效期 7 天, 使用中的消毒剂用后

立即盖好, 保持有效性 ✓

D. 患者被服一人一更换，保持清洁，住院时间长应每周更换

22. 开启的静脉输入无菌液体及启封抽吸的各种溶媒分别超过多长时间便不能使用（） [单选题] \*

A. 4小时、24 小时

B. 2小时、24 小时 ✓

C. 2小时、12 小时

D. 6小时、12 小时

23. 下列不属于新冠肺炎防控中“一级防护”所需的用品是（） [单选题] \*

A. 医用防护口罩 ✓

B. 工作服

C. 工作帽

D. 医用外科口罩

24. 下列关于医院感染的概念说法错误的是（） [单选题] \*

A. 住院病人在医院内获得的感染

B. 在医院内获得出院后发生的感染

C. 不包括入院时已处于潜伏期的感染

D. 无明确潜伏期的，入院 24 小时后发生的感染 ✓

25. 以下对毒麻药品的管理说法错误的是（） [单选题] \*

A. 保险柜存放

B. 专人管理药柜钥匙 ✓

C. 销毁双人签名

D. 废弃药液倒入医用垃圾桶弃去

26. 关于约束做法错误的是（） [单选题] \*

- A. 约束患者前，应告知患者或家属采取约束的目的、注意事项
- B. 需签署保护性约束知情告知同意书
- C. 每 2 小时轮流放松约束肢体 5-10 分钟
- D. 根据病情变化护士决定是否解除约束并记录 ✓

27. 以下对冰箱药品的管理说法错误的是（） [单选题] \*

- A. 患者开封的胰岛素笔，标注好床号、姓名后可存放于科室冰箱 ✓
- B. 冰箱冷藏室适宜温度范围为 2-8℃
- C. 每日应有冰箱温度监测记录
- D. 冰箱内药品应分区存放

28. 心肺复苏 A、B、C、治疗法中的 A 是指（） [单选题] \*

- A. 胸外心脏按压
- B. 开放呼吸道 ✓
- C. 人工呼吸
- D. 止血

29. 心肺复苏指南中胸外心脏按压与通气的比率为（） [单选题] \*

- A. 30:2 ✓
- B. 15:2
- C. 30:1
- D. 15:1

30. 心肺复苏指南中胸外心脏按压的频率为（） [单选题] \*

- A. 80-100 次/分
- B.  $\geq 100$ 次/分

C. 100-120 次/分 ✓

D. 60-80 次/分

多选题（每题 3 分） [填空题]

31. 为保证抢救工作顺利和有效，应做到以下哪些内容（） [多选题] \*

A. 抢救物品、药品、器械完好齐备，做到“四定”、“三无”、“二及时”、“一专” ✓

B. 保持各种器材和仪器的性能良好和无故障，以保证应急使用 ✓

C. 各级医护人员应熟练掌握抢救程序、常用抢救方法、徒手心肺复苏技术和各种抢救器材仪器的使用方法 ✓

D. 因抢救急危患者需要下达口头医嘱时，护士应当复诵一遍经医师确认后执行，并保留空安瓿备查 ✓

32. 我院根据护士的工作年限、学历、职称、个人能力和临床经验等因素，设立 N1、N2、N3、N4 共 4 个不同层级护理岗位，N2 级护士资质要求是（） [多选题] \*

A. 工作 5-10 年，本科及以上学历工作 5-9 年 ✓

B. 工作 10-15 年，本科及以上学历工作 9-12 年

C. 身心健康 ✓

D. 护师或主管护师职称 ✓

33. 关于危急值描述正确的是（） [多选题] \*

A. 遵循“谁报告（接收），谁记录”原则 ✓

B. 接听者将记录的内容大声复述一遍，对方确认复述正确，通话完毕 ✓

C. 接获危急值后书写护理记录，包括治疗处置、效果等 ✓

D. 接获危急值后及时报告经治医生或值班医生，并记录 ✓

34. 对不良事件报告描述正确的是（） [多选题] \*



- A. 实行非惩罚制度 ✓
- B. 发生重大、特殊安全（不良）事件要求科室及时（1周内）组织人员进行讨论并记录 ✓
- C. 一般不良事件每月组织集中讨论一次 ✓
- D. 对阻止医疗安全（不良）事件发生者给予奖励 ✓

35. 关于抢救药品的描述正确的是（） [多选题] \*

- A. 肾上腺素注射液 1mg ， 抗休克， 加快心率， 升高血压 ✓
- B. 利多卡因注射液 0.1g， 抗心率失常 ✓
- C. 多巴胺注射液 20mg ， 2-5ug/kg/min 改善肾功能， 10-15ug/kg/min 升血压 ✓
- D. 可拉明注射液 0.375g ， 兴奋呼吸中枢 ✓
- D. 可拉明注射液 0.375g ， 兴奋呼吸中枢 ✓

36. 下列关于医疗行为说法正确的是（） [多选题] \*

- A. 严格依法执业， 严禁超执业地点、 超执业范围执业， 如在外单位挂靠护士资格证书、 健康管理师证书、 执业药师证书等行为 ✓
- B. 高值医用耗材管理做到账实相符， 严格按医嘱规范使用， 严禁无指征使用、 过度使用、 以次充好冒用、 无中生有虚记用量等行为 ✓
- C. 规范、 合理收费， 严禁故意多记、 漏记、 无中生有虚记等行为 ✓
- D. 严禁在药品、 医用设备、 医用耗材等临床使用活动中， 为生产、 经营企业及其经销人员“统方”， 收受生产、 经营企业及其经销人员以各种名义给予财物、“回扣”或提成的行为 ✓

37. 下列关于医务人员文明用语正确的是（） [多选题] \*

- A. 医务人员禁用“不知道”“不清楚”“不归我管”之类的服务禁语 ✓
- B. 亲切迎， 主动问“患者走进时， 主动微笑迎接， 询问患者是否需要帮助， 指引患者就诊 ✓
- C. 态度和蔼、 礼貌待人， 使用文明用语“请！ 您好！ 谢谢！ 请稍等！”等 ✓

D. 各窗口科室要主动维持窗口秩序 ✓

38. OGTT 试验注意事项正确的是 ( ) [多选题] \*

A. 告知受试者检查前一日进食正常饮食，禁饮 6 小时

B. 护士准备好 8.25 支(165ml) 葡萄糖注射液 ✓

C. 试验当天，晨空腹抽血后，将葡萄糖注射液 8.25 支 (165ml ) 倒入杯中，可加温水至 300ml

D. 如患者发生呕吐，此实验应终止，另行安排时间 ✓

E. 实验过程中禁食、禁饮，不做输液治疗，不做剧烈运动，无需绝对卧床 ✓

39. 发生针刺伤时正确的处理措施包括 ( ) [多选题] \*

A. 从近心端向远心端挤压 ✓

B. 立即止血、包扎伤口

C. 在流动水下冲洗伤口 ✓

D. 用 0.5% 碘伏或 75% 乙醇消毒伤口并包扎 ✓

40. 下列哪些是戴医用防护口罩的注意事项 ( ) [多选题] \*

A. 不应一只手捏鼻夹 ✓

B. 医用防护口罩只能一次性使用 ✓

C. 口罩受到患者血液、体液污染后，应及时更换 ✓

D. 每次佩戴医用防护口罩进入工作区域之前，应进行密合性检查 ✓

判断题 (每题 1 分) [填空题]

---

41. 给药前查对医嘱与患者用药信息，检查药品、溶媒及输液用物的效期及质量。 ( ) [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

42. 设备保养本的填写，“设备状态:使用及备用情况，一级保养记录”应当天填写昨天的。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

43. 除颤仪在未使用情况下，每周充 1 次电，既有利于除颤仪处于备用状态，又有利于除颤仪电池保养。

（） [单选题] \*

A. 对

B. 错 ✓

44. 采集各类标本前需认真检查采集容器是否正确，有无破损、是否过期，抗凝剂是否完好（） [单选题]

\*

A. 对 ✓

B. 错

45. OGTT 试验正确的采血时间为:饮入葡萄糖注射液后 1、2、3 小时分别抽血送检。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

46. 有流行病学史的患者均引导至发热门诊就诊，排除新冠肺炎后方可收入普通病房。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

47. 发现患者发生输液反应时，应立即停止输液。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

48. 感染性隔离患者使用后的医疗废物需采用双层黄色医疗废物袋,分层封扎,做好标识,生活垃圾按照医

疗废物处理。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

49. 实施以“床单元”为单位的终末清洁与消毒应先清洁、后消毒。（） [单选题] \*

A. 对

B. 错 ✓

50. 心梗或严重心律失常的转科患者，应使用轮椅转运，避免步行出现意外。（） [单选题] \*

A. 对 ✓

B. 错

## B

1. 流感疫苗一般接种后多久产生具有保护水平的抗体（） [单选题] \*

A. 立即

B. 三天

C. 一周

D. 2-4周 ✓

2. 流感疫苗接种部位（） [单选题] \*

A. 臀大肌

B. 上臂外侧三角肌 ✓

C. 大腿外侧肌群

D. 随意肌群

3. 注射免疫球蛋白或减毒疫苗者应至少间隔（）接种流感疫苗,以免影响免疫效果; [单选题] \*

A. 1个月以上 ✓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/036231231112011002>