



**春蕾圈**

**降低PICC置管患者血栓发生率**

放疗病区

降低PICC置管患者血栓发生率

# 圈员介绍

- 辅导员：魏红霞
- 圈长：党珊
- 圈成员：刘燕，苏益芳，王吊霞，雒小佳，耿洁，陈干，史蒙蒙，曹旭欢



降低PICC置管患者血栓发生率

# 圈名：春蕾圈；

- 含义：
- 春蕾如同春天的花蕾，给人以希望和生命不息的力量，我们希望我们的这个“春蕾圈”能像春天的花蕾般绽放，把我们的方法经验传递给所有的同行，让更多的患者及家属感受到花蕾绽放的光彩和芬芳。



# 圈名及圈徽

- 圈名： 春蕾圈

- 圈徽：



- 圈徽含义：象征护士用辛勤的双手呵护患者的生命，让肿瘤患者远离疾病痛苦，生命之树常青

# 主题选定

- 主题选定：对临床护理工作中需要解决。由圈内的成员评分，就解决问题的可行性、迫切性、圈能力及上级政策支持4个方面进行打分
- 1、提高护士配置化疗药物正确率
- 2、减少骨髓抑患者感染发生率
- 3、提高出院患者导管维护依从性
- 4、减少住院患者压疮的发生率
- 5、提高护士配置靶向药物准确率
- 6、减少住院患者跌倒坠床发生率
- 7、降低picc置管患者血栓的发生率

# 选题理由

- 1、我科将Picc置管作为新技术开展,严重的并发症是深静脉血栓。
- 2、血栓死亡率高
- 3、血栓给患者带来痛苦极高
- 4、血栓会给患者带来更大的经济损失
- 5、有文献报道picc置管患者血栓是可以预防的



降低PICC置管患者血栓发生率

# 现状把握

- 1、picc置管患者血栓发生率为：2-26%
- 2、Picc相关上肢静脉血栓导致肺栓塞的发生率高达35%
- 3、有研究指出肿瘤分期与picc血栓的形成的关系为：
  - （1）肿瘤、I，II期发生率为0。IV期为8%。IIIV期为16%。
  - （2）深静脉血栓及肺栓塞史，糖尿病 年龄小于40岁发生率为9%，40-60岁为5%，大于60岁为15%

# 目标设定

- 现状值=现picc置管患者血栓发生率=取中间值为13%
- 目标值=现状值-改善值=现状值-
- ( 现状值×累计百分比×圈能力 ) =13%-  
( 13%×75%×80% ) =5.2%






# 拟定计划

what 项目	when 日期																				who 负责人	where 放疗科		
	2014-4				2014-5				2014-6				2014-7				2014-8						2014-9	
日期	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	负责人	放疗科
成立品管圈	...																						全体护士	放疗科
主题选定	...																						全体护士	放疗科
项目计划拟定		...																					圈成员	放疗科
把握现状			...																				魏红霞	放疗科
制定检查标准				.....																			魏红霞	放疗科
现状检查				.....																			王吊霞李	放疗科
整理资料				.....																			魏小佳崔	放疗科
数据统计分析																							党珊史蒙	放疗科
目标设定																							党珊史蒙	放疗科
原因分析																							圈成员	放疗科
对策拟定																							圈成员	放疗科
对策实施与检讨																							王吊霞	放疗科
效果确认																							党珊	放疗科
标准化																							魏红霞	放疗科
讨论与改进																							圈成员	放疗科
上报护理部																							魏红霞	放疗科

降低PICC置管患者血栓发生率

# 解析——鱼骨图



降低PICC置管患者血栓发生率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045203143240011203>