

2022 年江西省普通高校专科升本科大学医学综合预测试卷

一、单选题

1、男，70 岁。有慢性支气管炎病史 30 年。受凉后突发气促、烦躁 3 天。查体：口唇发绀，呼吸 36 次/分，脉率 100 次/分，双肺闻及哮鸣音。首选的辅助检查是()

(A)心电图

(B)血常规

(C)血气分析

(D)肺功能

2、通常情况下，术后胃肠减压拔管的指征是（）

(A)肛门排气后

(B)无肠鸣音

(C)肠鸣音存在

(D)术后 3 天

(E)患者要求拔除

3、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为（）

(A)创伤制动、保证呼吸道通畅

(B)及早建立静脉通路

(C)早期给予鼻导管或面罩吸氧

(D)采取平卧位

(E)注意保暖

4、下列关于皮质醇升高血糖机制的描述，正确的是（）

(A)减少细胞对葡萄糖的利用

(B)增加外周组织摄取葡萄糖

- (C)使肝糖异生酶的活性降低
- (D)增加葡萄糖转运体的活性
- (E)减少肝糖异生原料的供应

5、确诊心房颤动最简便可靠的方法是【】

- (A)系统地采集病史
- (B)准确的心脏听诊
- (C)心电图检查
- (D)血电解质检查
- (E)超声心动图检查

6、可做环转运动的关节是()

- (A)膝关节
- (B)踝关节
- (C)肘关节
- (D)桡腕关节

7、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

- (A)结核性腹膜炎
- (B)化脓性腹膜炎
- (C)肝硬化腹水
- (D)恶性腹水
- (E)自发性细菌性腹膜炎

8、造成心室前负荷增大的因素是（）

- (A)心肌收缩力增强

- (B) 静脉回流速度下降
- (C) 心室充盈量增大
- (D) 心率增快
- (E) 心室顺应性减小

9、男，40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是

()

- (A) 主动脉夹层
- (B) 原发性肝癌
- (C) 缺血性肠病
- (D) 门静脉血栓
- (E) 肾动脉狭窄

10、能够听到支气管肺泡呼吸音的部位有 ()

- (A) 肩胛下区
- (B) 胸骨左侧第2肋间
- (C) 背部第2胸椎附近
- (D) 肩胛间区第3胸椎水平
- (E) 肺尖前后部

11、大量胸腔积液患者不易出现的体征是 ()

- (A) 患侧闻及胸膜摩擦音
- (B) 气管向健侧移位
- (C) 患侧语音震颤减弱
- (D) 患侧胸廓扩张度减弱
- (E) 患侧肋间隙增宽

12、关于外科感染，叙述不正确的是（）

- (A)疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
- (C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
- (D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

13、男，2岁。玩耍中突发呼气性呼吸困难半小时急诊就诊。最可能出现的肺部体征是

【】

- (A)肺部局限性干啰音
- (B)双肺布满哨笛音
- (C)双肺粗大湿啰音
- (D)胸膜摩擦音
- (E)双肺底捻发音

14、男，23岁。因发热、呼吸困难2周就诊。查体：颈静脉怒张，心音遥远，心界向两侧扩大。最可能的诊断是【】

- (A)感染性心内膜炎
- (B)结核性心包炎
- (C)风湿性心脏瓣膜病
- (D)原发性高血压
- (E)肥厚型心肌病

15、Brudzinski征阳性的表现是（）

- (A)趾背伸四趾屈曲
- (B)颈部抵抗增强

- (C)股四头肌收缩
- (D)伸膝受阻伴疼痛
- (E)髌关节及膝关节屈曲

16、下列属于内耳结构的是【】

- (A) 鼓室
- (B) 鼓膜
- (C) 乳突小房
- (D) 咽鼓管
- (E) 耳蜗

17、某患者误输异型血后无尿 3 天。测血压正常。最有效的治疗是【】

- (A) 输注地塞米松
- (B) 输注碳酸氢钠
- (C) 输注甘露醇
- (D) 血液透析
- (E) 输注速尿

18、女，54 岁。查体：肝脏于剑突下 1.5cm 可触及，质地如触口唇，无触痛。最可能的情况是（）

- (A)肝左叶癌
- (B)慢性肝炎
- (C)正常肝脏
- (D)肝淤血
- (E)肝脓肿

19、属于升主动脉的分支是【】

- (A) 右锁骨下动脉
- (B) 左颈总动脉
- (C) 右颈总动脉
- (D) 左锁骨下动脉
- (E) 冠状动脉

20、不属于丹毒临床表现的是 ()

- (A) 多见于下肢
- (B) 畏寒、发热
- (C) 皮肤和淋巴结多见化脓破溃
- (D) 头痛、全身不适
- (E) 局部烧灼样疼痛

21、大量胸腔积液患者不易出现的体征是 ()

- (A) 患侧闻及胸膜摩擦音
- (B) 气管向健侧移位
- (C) 患侧语音震颤减弱
- (D) 患侧胸廓扩张度减弱
- (E) 患侧肋间隙增宽

22、视近物时眼的调节表现为【】

- (A) 瞳孔开大
- (B) 晶状体前后凸
- (C) 视轴倾斜
- (D) 晶状体左右凸
- (E) 复视

23、与肺尖相对应的壁胸膜是【】

- (A) 肋胸膜
- (B) 膈胸膜
- (C) 胸膜顶
- (D) 纵隔胸膜
- (E) 肋膈隐窝

24、参与应激反应的最主要激素是【】

- (A) 胰岛素
- (B) 催产素
- (C) 醛固酮
- (D) 皮质醇
- (E) 促黑激素

25、正常时肾小球不能滤过的物质是（）

- (A) 尿素
- (B) 氨基酸
- (C) 大分子蛋白质
- (D) 葡萄糖
- (E) 电解质

26、输血的目的不包括（）

- (A) 杀灭细菌，抗感染
- (B) 纠正贫血
- (C) 改善凝血功能
- (D) 对出血患者补充血容量

(E)提高血浆蛋白

27、自主神经节前纤维释放的递质是 ()

(A)多巴胺

(B)腺苷

(C)谷氨酸

(D)甘氨酸

(E)乙酰胆碱

28、呕血与咯血最重要的鉴别点是 ()

(A)是否为大出血

(B)是否伴有恶心

(C)是否伴有黑便

(D)是否伴有发热

(E)是否混有胃内容物

29、男性患者有尿道外括约肌环绕尿道的部位是 ()

(A)尿道内口

(B)尿道外口

(C)尿道前列腺部

(D)尿道球部

(E)尿道膜部

30、女，54岁。急性胰腺炎行胆囊造瘘、胰腺引流术后，仍禁食、胃肠减压、输液及抗感染治疗，并吸入高浓度氧。动脉血气分析为 $pH7.46$ ， $PaO_2 55\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 32\text{mmHg}$ 。

胸片示两肺有较广泛的点、片状阴影，心电图示窦性心动过速。最可能的诊断是【】

(A)急性心力衰竭

- (B) 慢性阻塞性肺病
- (C) 术后肺不张
- (D) 急性呼吸窘迫综合征
- (E) 肺部感染

31、下列最符合内环境稳态概念的描述是()

- (A)组织液理化性质相对稳定
- (B)血浆各成分保持恒定
- (C)细胞质渗透压稳定
- (D)细胞内液 pH 相对稳定

32、属于腹膜内位器官的是()

- (A)横结肠
- (B)直肠
- (C)降结肠
- (D)升结肠

33、大量胸腔积液的典型体征是【】

- (A) 病变侧呼吸动度加大
- (B) 病变侧叩诊实音
- (C) 气管偏向患侧
- (D) 病变部位可闻及啰音
- (E) 语音共振增强

34、有关测量血压的叙述，正确的选项是【】

- (A) 听诊器胸件置于袖袋下
- (B) 血压计置于肘关节水平

- (C) 袖袋充气至日常血压水平放气
- (D) 取两次测得血压的高值
- (E) 检查前需休息 5 分钟以上

35、关于外科感染，叙述不正确的是（）

- (A) 疔是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (B) 急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
- (C) 脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
- (D) 痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (E) 甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

36、最可能的诊断是【】

- (A) 左侧大叶性肺炎
- (B) 左侧胸腔积液
- (C) 右侧气胸
- (D) 左侧肺不张
- (E) 急性肺水肿

37、男，48岁。近期健康体检报告示：血 BUN6.0mmol/L，总胆红素 12.7 μ mol/L，AST71U/L，空腹血糖 6.0mmol/L，总胆固醇 7.5mmol/L。临床的诊断是（）

- (A) 肾功能不全伴黄疸
- (B) 肝功能异常伴血脂异常
- (C) 肝功能衰竭伴黄疸
- (D) 糖尿病伴肾功能不全
- (E) 糖尿病伴血脂异常

38、两侧同时收缩，使脊柱后伸的肌是（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/045321022131011130>