

病理学(医学高级)《诊断学基础考试答案》模拟考试卷

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题: 正常人昼尿量与夜尿量之比为 ()。A. (2~3) : 1
B. (3~4) : 1
C. (4~5) : 1
D. (5~6) : 1
E. (6~7) : 1
- 单项选择题: 符合淋巴细胞型类白血病反应特点的是 ()。A. 血片中主要是幼稚淋巴细胞
B. 常伴有嗜酸性和嗜碱性粒细胞增多
C. 早期病例常有贫血
D. 血片中可见异形淋巴细胞
E. 以急性化脓菌感染最常见
- 单项选择题: 患者, 女, 28 岁, 阵发性右侧头痛近 10 年, 头痛在呕吐后可减轻, 头痛发作常与月经周期有关, 神经系统检查未见异常, 且应用麦角胺后头痛可获缓解。最常见的诊断为 ()。A. 三叉神经痛
B. 偏头痛
C. 脑血管畸形
D. 肌紧张性头痛
E. 青光眼
- 单项选择题: 医生检查患者腹部, 用示指和中指的指腹贴于剑突下部的肝脏表面的方法, 来区别肝脏的搏动是由于右心室肥厚还是腹主动脉搏动的传导所致。下列哪一项描述正确 ()。A. 搏动在深呼气时明显为右心室肥厚
B. 搏动在深吸气时明显为右心室肥厚
C. 搏动在呼气和吸气均明显为右心室肥厚
D. 搏动在深压时明显为主动脉搏动
E. 搏动在浅表触诊时明显为右心室肥厚
- 单项选择题: 急性心肌梗死时, 可不出现病理性 Q 波的情况是 ()。A. 心肌梗死发生在基底部
B. 心肌梗死发生在前壁
C. 心肌梗死发生在下壁
D. 梗死的心肌直径 20~30mm
E. 梗死的心肌厚度 5mm
- 单项选择题: PAgT 增高, 见于 ()。A. 血小板无力症
B. 巨血小板综合征

- C. 肝硬化
 - D. 维生素 B12 缺乏症
 - E. 糖尿病
- 7、多项选择题：属于浅反射的是（ ）。A. 趾反射
- B. 提睾反射
 - C. 肛门反射
 - D. 角膜反射
 - E. 腹壁反射
- 8、单项选择题：低血钾的典型心电图表现为（ ）。A. QT 间期延长
- B. QRS 波增宽
 - C. u 波倒置
 - D. ST 段压低，T 波低平及 u 波增高
 - E. T 波倒置
- 9、单项选择题：脑膜刺激征应该包括（ ）。A. 颈强直、Kernig 征和 Babinski 征阳性
- B. 颈强直、Kernig 征和 Brudzinski 征阳性
 - C. Kernig 征、Gordon 征和 Brudzinski 征阳性
 - D. Gordon 征、Babinski 征和 Oppenheim 征阳性
 - E. 颈强直、Babinski 征和 Oppenheim 征阳性
- 10、单项选择题：咳嗽性晕厥的特点（ ）。A. 常伴有血钙降低
- B. 常伴有贫血
 - C. 常伴有低血糖
 - D. 见于有慢性肺部疾病者剧烈咳嗽后发生
 - E. 常伴有血压升高
- 11、单项选择题：直肠指诊时应注意的异常改变不包括（ ）。A. 有无剧烈触痛
- B. 是否有黏膜血管扩张
 - C. 是否触及柔软光滑而有弹性的包块
 - D. 是否触及坚硬凹凸不平的包块
 - E. 指诊后指套表面是否带有黏液、脓液或血液
- 12、单项选择题：糖尿病患者，男 59 岁，应用胰岛素治疗 2 年，平均每天 40U，3 天前饭后突然出现腹泻、嗜睡、大汗淋漓，急诊入院。查体：脱水貌，BP140/80mmHg，心率 120 次 / 分。对诊断最有价值的检查是（ ）。A. 大便常规
- B. 血常规
 - C. 血糖，酮体
 - D. ECG
 - E. 头颅 CT
- 13、单项选择题：女，25 岁，2 周前感咽痛、发热，经抗感染治疗后症状消失，但渐感双下肢水肿，查尿蛋白++++，定量 6.5g/24h，血胆固醇 10.3mmol/L，三酰甘油 6.5mmol/L，血清白蛋白 250g/L，总蛋白 56g/L，经补充白蛋白、利尿及皮质激素治疗后，右下肢水肿渐消，但左下肢水肿明显，压之凹陷，皮肤无发红及灼热，非对称性水肿，可能的原因是（ ）。A. 蛋白尿未控制
- B. 白蛋白补充不够
 - C. 利尿剂量不足
 - D. 股静脉血栓形成

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/048120117003006066>