

2022年江西省专升本考试大学医学综合测试卷

一、单选题

1、抗利尿激素促进水重吸收的部位是【】

- (A) 肾小球
- (B) 近曲小管和髓袢粗段
- (C) 远曲小管和集合管
- (D) 髓袢细段升降支
- (E) 肾小囊

2、突触前抑制时，与突触活动有关的变化是【】

- (A) 突触前膜超极化
- (B) 兴奋性突触后电位减小
- (C) 突触前膜不释放神经递质
- (D) 抑制性突触后电位增大
- (E) 到达轴突末梢的兴奋减少

3、水冲脉的特点是【】

- (A) 脉搏骤起骤落
- (B) 脉搏强弱不等
- (C) 呼气时脉搏明显减弱
- (D) 脉搏迅速上升缓慢下降
- (E) 脉搏节律不整

4、触及左锁骨上窝硬而无痛的肿大淋巴结时，首先考虑的病因是【】

- (A) 鼻咽癌
- (B) 甲状腺乳头状癌

- (C) 原发性肝癌
- (D) 贲门黏液细胞癌
- (E) 右侧小细胞肺癌

5、第 2~4 手指不能内收与外展，可能损伤的神经是 ()

- (A) 肌皮神经
- (B) 正中神经
- (C) 尺神经
- (D) 桡神经
- (E) 腋神经

6、女，32 岁。低热、盗汗、腹胀 2 个月。腹水检查结果：比重 1.018，蛋白 27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是 ()

- (A) 结核性腹膜炎
- (B) 化脓性腹膜炎
- (C) 肝硬化腹水
- (D) 恶性腹水
- (E) 自发性细菌性腹膜炎

7、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为 ()

- (A) 创伤制动、保证呼吸道通畅
- (B) 及早建立静脉通路
- (C) 早期给予鼻导管或面罩吸氧
- (D) 采取平卧位
- (E) 注意保暖

8、不属于肝门静脉属支的是 ()

- (A)肝静脉
- (B)肠系膜上静脉
- (C)胆囊静脉
- (D)脾静脉
- (E)附脐静脉

9、可使氧解离曲线左移的情况是()

- (A)血 pH 降低
- (B)组织温度升高
- (C)血二氧化碳分压降低
- (D)2, 3-二磷酸甘油酸浓度升高

10、纯净胃液的 pH 为 ()

- (A)3.9~4.5
- (B)4.9~5.5
- (C)0.9~1.5
- (D)2.9~3.5
- (E)1.9~2.5

11、原发性甲状腺功能亢进患者颈部检查的体征是【】

- (A)触及甲状腺区震颤
- (B)触诊甲状腺橡皮感
- (C)触及甲状腺结节
- (D)触及颈部淋巴结肿大
- (E)甲状腺明显触痛

12、清创术的目的是【】

- (A) 冲洗伤腔
- (B) 清除伤口内异物
- (C) 修剪伤口边缘
- (D) 清除血肿
- (E) 将污染伤口变为清洁伤口

13、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

- (A) 双眼视野鼻侧半偏盲
- (B) 患侧视野鼻侧半偏盲
- (C) 双眼视野对侧半同向性偏盲
- (D) 双眼视野颞侧半偏盲
- (E) 患侧眼全盲

14、属于腹膜内位器官的是()

- (A) 横结肠
- (B) 直肠
- (C) 降结肠
- (D) 升结肠

15、用已知 ABO 血型的血清可以鉴定的红细胞膜上的成分是（）

- (A) A 抗原和 B 抗体
- (B) A 抗原和 B 抗原
- (C) B 抗原和 A 抗体
- (D) A 抗原和 H 抗原
- (E) B 抗原和 H 抗原

16、光期引起视杆细胞膜发生的变化是（）

- (A)超极化
- (B)极化
- (C)反极化
- (D)去极化
- (E)复极化

17、舌前 2/3 味觉障碍伴泪腺分泌障碍，可能损伤的神经是 ()

- (A)动眼神经
- (B)面神经
- (C)三叉神经
- (D)上颌神经
- (E)舌下神经

18、二尖瓣关闭不全典型的体征是 ()

- (A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音
- (B)胸骨左缘第 2 肋间闻及 GrahamStell 杂音
- (C)心尖部闻及舒张中期杂音
- (D)胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音
- (E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

19、动作电位到达神经末梢，引起的与末梢膜释放递质有关的离子流是 【】

- (A) K^+ 内流
- (B) Cl^- 内流
- (C) Na^+ 内流
- (D) Ca^{2+} 内流
- (E) Mg^{2+} 外流

20、包被于肾实质表面的结构是【】

- (A) 肾筋膜
- (B) 肾纤维囊
- (C) 肾脂肪囊
- (D) 肾周围脂肪
- (E) 脏腹膜

21、关于外科感染，叙述不正确的是（）

- (A)疖是指一个毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (B)急性蜂窝织炎是皮下、筋膜下蜂窝组织的化脓性感染
- (C)脓性指头炎是指手指末节掌面皮下组织的化脓性感染
- (D)痈是指多个不同部位散在的毛囊及其皮脂腺的化脓性感染
- (E)甲沟炎是指甲沟及其周围组织的急性感染

22、男，65岁。间断咳喘20年，曾被确诊为“慢性阻塞性肺疾病”。因喘憋加重伴双下肢水肿半年就诊。引起水肿最可能的原因是【】

- (A) 肝硬化失代偿
- (B) 慢性右心衰竭
- (C) 下肢静脉血栓
- (D) 药物不良反应
- (E) 营养不良

23、静脉补钾速度一般每小时不宜超过()

- (A)70mmol
- (B)60mmol
- (C)50mmol

(D)20mmol

24、属于男性输精管道的是()

(A)睾丸

(B)尿道球腺

(C)精囊腺

(D)附睾

25、女，54岁。查体：肝脏于剑突下1.5cm可触及，质地如触口唇，无触痛。最可能的情况是（）

(A)肝左叶癌

(B)慢性肝炎

(C)正常肝脏

(D)肝淤血

(E)肝脓肿

26、男，31岁。既往无心脏病史，上班途中突发心悸、胸闷。心电图示QRS波形态与时限均正常，P波为逆行性，频率220次/分。该患者的诊断为（）

(A)室上性心动过速

(B)窦性心动过速

(C)快速心房颤动

(D)室性心动过速

(E)快速心房扑动

27、注入乳糜池的淋巴干是（）

(A)左颈干

(B)右锁骨下干

(C)左锁骨下干

(D)右颈干

(E)肠干

28、迷走神经背核属于【】

(A)一般内脏运动柱

(B)一般躯体运动柱

(C)特殊内脏运动柱

(D)一般躯体感觉柱

(E)特殊躯体感觉柱

29、术前准备中，下列处理错误的是【】

(A)心力衰竭的患者需控制3~4周后才实行手术

(B)血浆白蛋白测定低于30g/L，则术前需肠内或肠外营养支持

(C)肝功能损害者经治疗好转后方可手术

(D)糖尿病患者手术前应将血糖控制到正常

(E)肾功能重度损害者在有效的透析后仍能耐受手术

30、与阴道后穹后方相邻的腹膜间隙是（）

(A)卵巢窝

(B)膀胱上窝

(C)膀胱子宫陷凹

(D)直肠膀胱陷凹

(E)直肠子宫陷凹

31、支配小腿后群肌的神经是【】

(A)胫神经

- (B) 股神经
- (C) 腓浅神经
- (D) 闭孔神经
- (E) 腓深神经

32、脊髓前角 α 神经元兴奋，可引起变化是【】

- (A) 腱器官传入冲动减少
- (B) 梭内肌收缩
- (C) γ 传出冲动增加
- (D) 梭外肌收缩
- (E) 肌梭传入冲动增加

33、可做向前和向后运动的关节是（）

- (A) 踝关节
- (B) 肘关节
- (C) 桡腕关节
- (D) 肩关节
- (E) 颞下颌关节

34、污染伤口是指（）

- (A) 有细菌存在，但尚未发生感染的伤口
- (B) 有细菌存在，并已发生感染的伤口
- (C) 局部红肿并有分泌物的伤口
- (D) 腹股沟疝手术切口
- (E) 已化脓的伤口

35、交感缩血管神经节后纤维释放的神经递质是（）

- (A)5-羟色胺
- (B)肾上腺素
- (C)P 物质
- (D)乙酰胆碱
- (E)去甲肾上腺素

36、下列属于脑高级功能活动的是【】

- (A) 非条件反射
- (B) 视听觉
- (C) 饥渴觉
- (D) 平衡觉
- (E) 短时记忆

37、既是症状，也是体征的选项是【】

- (A) 腹痛
- (B) 心悸
- (C) 头晕
- (D) 黄疸
- (E) 胸闷

38、无尿的定义是（）

- (A)24 小时尿量少于 100mL
- (B)12 小时尿量少于 200mL
- (C)24 小时尿量少于 500mL
- (D)每小时尿量少于 50mL

(E)每小时尿量少于 17mL

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/058126024051006050>