



中华人民共和国国家标准

GB/T 8302—2013
代替 GB/T 8302—2002

茶 取 样

Tea—Sampling

(ISO 1839:1980, Tea sampling, NEQ)

2013-12-31 发布

2014-06-22 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
茶 取 样

GB/T 8302—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 400-168-0010

010-68522006

2014年4月第一版

*

书号: 155066·1-48880

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 8302—2002《茶 取样》。本标准与 GB/T 8302—2002 相比,主要技术性差异如下:

- 增加了取样人员的要求;
- 修改了取样工具和器具;
- 增加了随机取样的方法。

本标准使用重新起草法非等效采用 ISO 1839:1980《茶 取样》。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由全国茶叶标准化技术委员会(SAC/TC 339)归口。

本标准起草单位:中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、国家茶叶质量监督检验中心、厦门华祥苑茶业股份有限公司。

本标准主要起草人:高海燕、肖文华、许凌、王海斌、周卫龙。

GB/T 8302 的历次版本发布情况为:

- GB/T 8302—1987;
- GB/T 8302—2002。

茶 取 样

1 范围

本标准规定了茶叶取样的基本要求、取样条件、取样人员、取样工具和器具、取样方法、样品的包装和标签、样品运送、取样报告单等内容。

本标准适用于各类茶叶的取样。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

批 lot; batch

品质一致并在同一地点,同一期间内加工包装的有相同的茶类、花色、等级、茶号、包装规格和定量包装净含量的茶叶。

2.2

原始样品 primary sample

从一批产品的单个容器内取出的样品。

2.3

混合样品 bulk sample

全部原始样品的集合。

2.4

平均样品 average sample

将混合样品充分混合并逐次缩分至规定数量的样品。

注:平均样品的品质代表该批茶叶的品质。

2.5

试验样品 laboratory sample

按各检验项目的规定,从平均样品中分取一定数量作为分析、试验用的样品。

3 基本要求

应用统一的方法和步骤,抽取能充分代表整批茶叶品质的样品。

4 取样条件

4.1 取样工作环境应满足食品卫生的有关规定,防止外来杂质混入样品。

4.2 取样用具和盛器(包装袋)应符合食品卫生的有关规定,即清洁、干燥、无锈、无异味;盛器(包装袋)应能防尘、防潮、避光。

5 取样人员

应由有经验的取样人员或经培训合格的取样人员负责取样,或交由专门的取样机构负责取样。