

主治医师考试口腔正畸(习题卷29)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]关于体外受精，下列表述正确的是()

- A) 体外受精必须和胚胎移植技术结合使用
- B) 体外受精适用于男性性功能异常不能正常性交者
- C) 体外受精现已发展到第二代试管婴儿，技术上更加完善，因此应大力推广，并淘汰对第一代和第二代试管婴儿技术的使用
- D) 体外受精主要适用于男性精液中轻度少精、弱精或其他轻度男性不育者

2. [单选题]患者，女性，11岁，替牙

𪙇

。磨牙近中关系，前牙反

𪙇

伴有深覆

𪙇

反覆盖，上牙列Ⅰ度拥挤。采用上颌骨前牵引矫形治疗解决上颌骨发育不足的问题，如果要求上颌骨和上牙弓平动而无转动，下列哪一项是正确的

- A) 牵引线需同时经过上颌骨和上牙弓阻抗中心
- B) 牵引线斜向下-37° 牵引
- C) 牵引线斜向上-37° 牵引
- D) 牵引线需经过上颌骨和上牙弓阻抗中心的同侧
- E) 牵引线需经过上颌骨和上牙弓阻抗中心之间

3. [单选题]患者，男性，30岁，主诉：右下后牙牙龈反复肿痛3月余。临床检查：右下5缺失，右下6近中倾斜，右下6与右下7间牙龈肿胀，探诊出血，无自发性出血现象。则牙龈反复肿胀最可能的原因是()

- A) 口呼吸
- B) 龈瘤
- C) 血液性疾病
- D) 食物嵌塞
- E) 增生性龈炎

4. [单选题]乳牙根尖周炎易出现瘘管的原因是()

- A) 乳牙根分叉大，髓室底薄
- B) 牙龈血液供应丰富
- C) 病变进展快，且牙槽骨疏松
- D) 乳牙患龋率高
- E) 患儿治疗时不合作，常导致意外露髓

5. [单选题]光滑面菌斑属于

- A) 龈上菌斑

- B) 龈下菌斑
- C) 附着菌斑
- D) 非附着菌斑
- E) 获得性菌斑

6. [单选题]下列哪项不是颌面部中1/3的表面形态标志 ()

- A) 鼻根
- B) 耳屏
- C) 鼻唇沟
- D) 唇珠
- E) 颏唇沟

7. [单选题]患者男性，26岁，因车祸造成面部外伤，耳、鼻出血。检查见面部两侧不对称，右侧下睑肿胀、淤血，右侧后牙早接触，并有脑脊液耳漏。以下哪项X线检查对诊断帮助最大 ()

- A) 许勒位片
- B) 上颌前部片
- C) 上颌正位体层片
- D) 上颌体腔片
- E) 华特位片

8. [单选题]最易发生区域性淋巴结转移的恶性肿瘤是 ()

- A) 鳞状细胞癌
- B) 腺上皮癌
- C) 淋巴上皮癌
- D) 未分化癌
- E) 基底细胞癌

9. [单选题]外伤根尖1/3处折断的患牙处理为 ()

- A) 牙髓治疗
- B) 复位固定并定期观察
- C) 不治疗
- D) 调

拾

- E) 根尖切除术

10. [单选题]急性多发性龈脓肿与牙周脓肿的不同之处在于 ()

- A) 可探及深牙周袋
- B) 全口多个牙泛发
- C) 脓肿一般接近根尖
- D) 皆发生于牙周炎患者
- E) 治愈后牙龈不能完全恢复正常

11. [单选题]内分泌因素与牙周病的关系，正确的是 ()

- A) 内分泌的变化改变了牙周组织对病原刺激因素的反应
- B) 青春期龈炎与菌斑无关
- C) 性激素可引起牙周病
- D) 妊娠期龈炎在分娩以后可自行消退
- E) 牙龈不是性激素的靶器官

12. [单选题]关于牙源性腺样瘤的描述，不正确的是

- A) 为良性病损，但摘除后易复发
- B) 肿瘤内可见发育不良的牙本质、釉基质及牙骨质样物质
- C) 腺管样结构中可见嗜伊红物质和细胞碎屑
- D) 肿瘤小，包膜完整
- E) 肿瘤的小结节内细胞间可以见到细胞间桥、钙化团块及淀粉样物质沉着

13. [单选题] 上颌骨骨折向下后方移位其影响因素不正确者为 ()

- A) 重力
- B) 翼外肌
- C) 外力的方向
- D) 翼内肌
- E) 外力的大小

14. [单选题] 放置干髓剂时，应注意的问题不包括

- A) 水门汀垫底
- B) 隔湿止血
- C) 应放于根管口处
- D) 覆盖根分歧部
- E) 包括以上各项


15. [单选题] 确定慢性增殖型念珠菌病有无异常增生的最有价值的诊断技术为 ()

- A) 唾液培养
- B) 念珠菌抗体的检测
- C) 涂片镜检
- D) 血CEA测定
- E) 活体组织检查

16. [单选题] 某研究者为了验证氯霉素对伤寒的疗效，在408例伤寒患者中进行对照实验，其中251例用氯霉素治疗，其余157例不用。结果使用组251人中死亡20人，病死率7.07%；未用组157人中死亡36人，病死率22.8%。在人体实验中使用对照组、安慰剂和双盲法 ()

- A) 是违背人道主义原则的
- B) 是医学科研中经过考验的正确方法，可以在人体实验中广泛应用
- C) 是违背知情同意原则的
- D) 以征服疾病为目的，为发展医学，在严格控制并不损害患者利益的范围之内使用这一方法，是合乎医学道德的
- E) 是对病人的一种欺骗

17. [单选题] “牙中牙”是指 ()



- A) X线片显示相邻二牙重叠

- B) 双生牙
- C) 发育过程中两牙胚融合在一起
- D) 舌窝卷入牙冠过深
- E) 多见于上颌中切牙


18. [单选题]没有咬合关系的颌位是

- A) 下颌后退接触位
- B) 姿势位
- C) 肌位
- D) 下颌侧方接触位
- E) 牙尖交错位

19. [单选题]局部麻醉时以下哪种情况不会出现血肿 ()

- A) 注射时刺破眶下动脉
- B) 注射时刺破小血管
- C) 注射针头刺破眶下静脉
- D) 注射时针头刺入骨膜下
- E) 注射针头刺破翼静脉丛

20. [单选题]女，32岁，右下后牙龈向外膨隆，后牙渐松动3个月。X线片(如图)示右下颌磨牙区颌骨呈蜂房样改变，病变区牙根呈锯齿状吸收。该病人最可能的诊断是 ()



- A) 右下颌骨骨肉瘤
- B) 右下颌骨角化囊肿
- C) 右下颌骨成釉细胞瘤
- D) 右下颌骨骨巨细胞瘤
- E) 右下颌骨中央性颌骨癌

21. [单选题]面突联合异常发生于胚胎

- A) 第1周和第2周
- B) 第3周和第4周
- C) 第6周和第7周
- D) 第8周和第9周
- E) 第10周和第11周

22. [单选题]腮腺区发生的良性肿瘤中，最常见的是 ()

- A) 肌上皮瘤
- B) 基底细胞腺瘤

- C) 嗜酸细胞腺瘤
- D) 多形性腺瘤
- E) 腺淋巴瘤

23. [单选题]有体位移动实验阳性的肿瘤是

- A) 海绵状血管瘤
- B) 结核性冷脓肿
- C) 鳃裂囊肿
- D) 大涎腺囊肿
- E) 囊性淋巴管瘤

24. [单选题]颌面部牙源性感染反复发作的根本原因是 ()

- A) 病人全身抵抗力差
- B) 未及时拔除病灶牙
- C) 抗生素用量不足
- D) 感染细菌耐药性强
- E) 引流不畅

25. [单选题]下列哪项不是唇红缘的结构 ()

- A) 唇珠
- B) 唇峰
- C) 人中点
- D) 唇弓
- E) 唇缘

26. [单选题]据报道，现在有些医院已采取了一些隔离措施，使体格检查置于一个相对封闭的环境中，以免受检患者曝光于众人面前。更确切地说这些措施反映了医院和医生哪一种医德意识 ()

- A) 服务意识
- B) 热爱医学事业意识
- C) 管理意识
- D) 保护患者隐私意识
- E) 有利于患者的意识

27. [单选题]年轻恒牙龋的修复要点，以下说法错误的是

- A) 一旦发现年轻恒牙龋应及时治疗
- B) 年轻恒牙急性龋多见，去龋和备洞时要选用合适的器械，小心操作，减少牙质裂纹的发生
- C) 制备洞形时，应保护牙髓，避免不必要的露髓
- D) 深龋近髓时应常规选用有利于牙髓修复的氢氧化钙护髓
- E) 应恢复牙齿间良好的邻接关系

28. [单选题]牵张成骨术中结束牵张后，在矫正位固定期为

- A) 9~12周
- B) 2~3周
- C) 4~5周
- D) 6~8周
- E) 半年

29. [单选题]下牙槽神经入

- A) 卵圆孔
- B) 下颌孔
- C) 颞孔

- D) 圆孔
- E) 眶下孔

30. [单选题]关于口腔颌面部损伤，正确的说法是

- A) 血运丰富，出血多，组织水肿发生快而重，组织抗感染能力弱
- B) 牙列移位和咬合错乱是诊断颌骨骨折的主要特征
- C) 髁突骨折易伴发颅底骨折
- D) 上颌骨折易伴发颈部损伤
- E) 创伤后窒息均由气道阻塞引起

31. [单选题]与牙槽骨快速破坏有关的菌斑是

- A) 窝沟处的菌斑
- B) 以革兰阳性需氧菌为主的菌斑
- C) 龈上菌斑
- D) 非附着性龈下菌斑
- E) 附着性龈下菌斑

32. [单选题]牙颈部脱敏最好用 ()

- A) 碘酚法
- B) 碘化银法
- C) 氨硝酸银法
- D) 氟化钠法
- E) 离子导入法

33. [单选题]诊断深部脓肿不确切的检查方法是

- A) 波动试验
- B) 穿刺法
- C) B超
- D) CT
- E) MRI

34. [单选题]甲状腺上动脉发出的部位在颈外动脉

- A) 平舌骨大角稍上方处
- B) 平舌骨体部
- C) 平甲状软骨上缘处
- D) 平舌骨大角尖处
- E) 平舌骨大角稍下方处

35. [单选题]位于上颌骨的是


- A) 锥突
- B) 翼突
- C) 喙突
- D) 额突
- E) 颞突

36. [单选题]在第二次世界大战期间，德国纳粹和日本军国主义者强行用战俘、妇女、儿童和犹太人做医学试验。这一行为正确的伦理判断是()

- A) 该行为虽然偏离了医学科研的正确方向，但也为医学研究积累了一定的经验
- B) 该研究是为了增进医学对人体的了解
- C) 参加试验的医学工作者也是迫于无奈，不得已而为之
- D) 该行为违背了医学科研的根本目的

E) 该研究是当时战争时期的特殊需要

37. [单选题]急性溃疡性坏死性龈炎的主要致病菌为 ()



- A) 白色念珠菌
- B) 变形链球菌
- C) 金黄色葡萄球菌
- D) 梭形菌及螺旋体
- E) 溶血性链球菌

38. [单选题]面颈部静脉缺乏静脉瓣，临床上对哪种疾病有特殊意义

- A) 颌骨骨髓炎
- B) 嚼肌间隙感染
- C) 面部疔肿
- D) 翼颌间隙感染
- E) 咽旁间隙感染

39. [单选题]Ante主张决定基牙数量应

- A) 以
𪗇
力比值
- B) 以缺牙数量
- C) 以牙周膜面积
- D) 以缺牙部位
- E) 以年龄

40. [单选题]患者女，9岁半，下颌发育差，唇略前突，能正常闭合，面下1/3高度偏小，鼻唇角正常，与其母面型相似。覆盖7mm，磨牙颊尖对颊尖关系，前牙Ⅲ度深覆

𪗇
，ANB5°，上前牙略前突有少量间隙，牙列无拥挤若采用矫形治疗何种矫治器最佳

- A) 固定矫治器
- B) 功能调节器Ⅱ型
- C) 肌激动器
- D) 牙合垫矫治器
- E) 肌激动器加高位头帽牵引

41. [单选题]以下属于牙源性上皮性肿瘤的为

- A) 牙源性钙化上皮瘤、造釉细胞瘤、牙源性透明细胞瘤
- B) 牙源性鳞状细胞瘤、牙源性腺样瘤、牙源性纤维瘤
- C) 牙源性钙化上皮瘤、牙源性腺样瘤、牙源性纤维瘤
- D) 牙源性钙化上皮瘤、造釉细胞瘤、牙源性纤维瘤
- E) 牙瘤、造釉细胞瘤、牙源性透明细胞瘤

42. [单选题]

牙台

翼片对下列哪项检查较适宜

- A) 观察窝沟部深龋是否达到髓腔
- B) 观察多发性早期邻面龋
- C) 观察牙周间隙的大小
- D) 观察咬合创伤的程度
- E) 以上皆适宜

43. [单选题]颌面部间隙感染最常见病因是 ()

- A) 腺源性
- B) 外伤性
- C) 牙源性
- D) 血源性
- E) 医源性

44. [单选题]孙思邈不仅认真学习，而且在碰到疑难病无法治疗时，也从不畏缩，而是勤于思考，深入研究，尽力找出治疗的办法。有一次，一个病人得了尿闭症(尿潴留)不能小便，急忙找来孙思邈治疗。孙思邈看他的小肚子涨得那么厉害，心想，吃药怕来不及了，便想找一根管子插进尿道试验。想到葱管又空而且又软又细，不妨用它来试试，便要了一根细葱，在葱叶的一头切去少许，细心地慢慢地插进了病人的尿道，再用劲一吹，不一会儿，尿果然沿着葱管流了出来，病人胀大的小肚子慢慢地瘪了下去，病人尿闭症的痛苦顿时消失。孙思邈是最早使用导尿术治疗尿潴留的人。这体现了孙思邈哪方面的医德品格()

- A) 勇于创新
- B) 赤诚济世
- C) 舍己救人
- D) 淡泊名利
- E) 不怕艰苦

45. [单选题]通常颌面部随意瓣的长度比例为

- A) 1: 1
- B) 4~5: 1
- C) 1. 5: 1
- D) 2~3: 1
- E) 6: 1

46. [单选题]医学道德评价的方式有

- A) 社会舆论、同行评价和自我评价
- B) 患者评价、同行评价和自我评价
- C) 社会舆论、传统习俗和内心信念
- D) 传统习俗、患者评价和自我反省
- E) 患者评价、同行评价和内心信念

47. [单选题]无牙颌颌骨只保留有稳定的

- A) 息止

𪗇

关系

B) 侧向

𪗇

关系

C) 正中

𪗇

关系

D) 上下垂直关系

E) 前伸

𪗇

关系

48. [单选题] IV度根分叉区病变，最不需作哪项治疗 ()



A) 洁治术

B) 刮治术

C) 牙周翻瓣手术

D) 牙髓切除术

E) 根面平整术

49. [单选题] 与镍铬合金相比，铸造金-铂-钯合金的特点是

A) 生物相容性好

B) 铸造温度高

C) 密度低

D) 硬度高

E) 弹性模量高

50. [单选题] 按Black窝洞分类法第III类洞为 ()

A) 开始于窝沟的洞

B) 前牙邻面洞不包括切角

C) 后牙邻面洞

D) 前牙邻面洞包括切角

E) 牙齿唇、颊或舌面颈三分之一的洞

51. [单选题] 某患者夜间突发急腹症被送到某医院看急诊，初诊为急性胆囊炎。负责医生因自己年轻，怕担风险，未做任何处理，即让家属把患者送到20里外的中心医院就诊，延误了治疗时间，致使病人胆囊穿孔，中毒性休克。后虽经抢救挽救了生命，但医药费用去2万多元。对该医生的正确伦理评价是 ()

A) 没有什么问题，当时情况可以转诊

B) 没有什么问题，不想接诊的患者就可以让他转诊

- C) 错误，没有把这件事报告给院长，擅自决定转诊
- D) 错误，违反首诊负责制要求，给患者造成严重伤害
- E) 没有什么问题，风险太大时首先要保护好自己

52. [单选题] 充填后嵌塞的原因之一是

- A) 外展隙足够
- B) 充填体悬突
- C) 邻牙无龋坏
- D) 恢复接触点
- E) 用了成形片

53. [单选题] 被称为面侧深区钥匙的是 ()

- A) 下颌神经
- B) 颌内动脉
- C) 面深淋巴结
- D) 翼外肌
- E) 翼丛

54. [单选题] 大面积龋损修复时，固位钉在修复体与牙本质中长度一般应为

- A) 1~1.5mm
- B) 2mm
- C) 小于2mm
- D) 1mm
- E) 大于2mm

55. [单选题] 关于根分叉病变的叙述，下列何者正确 ()

- A) I度：牙周袋已达多根牙根分叉区，但分叉内无牙槽骨破坏，X线片上看不到骨质吸收
- B) IV度：根间骨骼完全破坏，牙龈退缩使根分叉区完全开放
- C) II度：分叉区骨吸收仅限于颊侧或舌侧，尚未相通，X线片见牙周膜增宽
- D) III度：根间牙槽骨全部吸收，探针可通过根分叉区，X线片见该区骨质小时呈透射区
- E) 以上都对

56. [单选题] 理想正常

𪗇

是

- A) 对于生理功能无大妨碍者，都可列入理想正常

𪗇

B) 反

𪗇

C) 深覆

𪗇

D) 个别正常

𪗇

- E) 保存全副牙齿，牙齿在上下牙弓上排列得很整齐，上下牙的尖窝关系完全正确，上下牙弓的

𪗇

关系非常理想

57. [单选题]患者，女，38岁。主诉：右半侧牙遇冷热疼3周。病历记载：1个月前右上后牙在外院已做牙髓治疗，治疗后原症状略缓解，遇热仍疼，且偶有自发疼。检查：右上4近中咬合面银汞充填完好，叩(+)，冷测反应均迟钝，热水可引起痛，持续数分钟。右上5冠完整，仅见颊面釉质有一纵行隐裂纹，涂碘酊染色不明显，叩：(+)，在裂纹处冷热测均较对照牙略敏感，其余未见异常。右上6残根，叩诊(-)，周围牙龈略红，探之易出血。引起主诉症状患牙最可能是 ()

- A) 右上45
- B) 右上5
- C) 右上456
- D) 右上4
- E) 右上6

58. [单选题]成人口腔颌面部感染最常见来源于 ()

- A) 牙源性
- B) 医源性
- C) 腺源性
- D) 损伤性
- E) 血源性


59. [单选题]局部麻醉时出现注射区疼痛和水肿的最常见原因是 ()

- A) 注射过程中刺破血管
- B) 注射针折断
- C) 注射时刺伤面神经
- D) 局部麻醉药物注入腮腺内
- E) 局部麻醉药物变质、有杂质或溶液不等渗


60. [单选题]牙齿外伤时最易发生折断的部位是 ()

- A) 尖牙区
- B) 磨牙区
- C) 各区都易发生牙折
- D) 前磨牙区
- E) 前牙区

61. [单选题]不属于舌神经阻滞麻醉范围的是 ()



- A) 同侧的舌侧骨膜
- B) 同侧的颊粘膜



- C) 同侧的舌侧牙龈
- D) 同侧的舌前2/3粘膜
- E) 同侧的口底粘膜

62. [单选题] 口腔黑斑的特点是

- A) 病损高于黏膜表面
- B) 上皮基底层及固有层上方黑色素细胞增多
- C) 好发于口底黏膜
- D) 固有层深部出现大量含黑色素细胞
- E) 固有层有大量淋巴细胞浸润

63. [单选题] 某男，2岁，左侧完全性腭裂拟行腭裂修复术。腭裂术中凿断翼钩的目的是

- A) 松弛咽上缩肌的张力
- B) 松弛腭帆提肌的张力
- C) 松弛腭咽肌的张力
- D) 松弛腭帆张肌的张力
- E) 松弛腭舌肌的张力

64. [单选题] 影响牙周炎患牙松动度的主要因素是 ()

- A) 牙根的形态
- B) 牙根的数目
- C) 创伤
- D) 牙槽骨吸收的程度
- E) 邻牙存留情况

65. [单选题] 干髓术的原理主要是要保留什么样的牙髓 ()

- A) 分解的根髓
- B) 成形的根髓

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077105104111006112>