

神经系统疾病患者的护理考核

一、A1 型题（以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案）

1. 成人颅内压增高是指脑脊液压持续超过[单选题] *

A.40mmH₂O

B.80mmH₂O

C.180mmH₂O

D.200mmH₂O ✓

E.250mmH₂O

2. 出现小脑幕切迹疝时，有定位意义的瞳孔变化是[单选题] *

A.患侧瞳孔逐渐缩小

B.患侧瞳孔逐渐散大 ✓

C.双侧瞳孔缩小

D.双侧瞳孔散大

E.双侧瞳孔大小不变

3. 在颅内压的生理调节机制中起主要作用的是[单选题] *

A.颅内静脉血

B.血液中 PaCO₂

C.脑组织中含水量

D.脑脊液量 ✓

E.血液中 PaO₂

4. 颅内压增高最严重的后果是[单选题] *

- A.头痛
- B.血压升高
- C.意识障碍
- D.脑疝✓
- E.视盘水肿

5. 急性硬脑膜外血肿患者中间清醒期的长短主要取决于[单选题] *

- A.原发性脑损伤的程度
- B.出血的来源
- C.血肿的部位
- D.血肿的大小
- E.血肿形成的速度✓

6. 颅内动静脉畸形最常见的首发症状[单选题] *

- A.运动障碍
- B.癫痫
- C.头痛
- D.出血✓
- E.视力障碍

7. 关于 GCS 计分法的概述，下列错误的是[单选题] *

- A.总分最高 15 分，最低 3 分
- B.总分越低表明意识障碍越重
- C.总分越高则表明预后越好
- D.总分在 8 分以上表示已有昏迷✓

E.总分由低分向高分转化说明病情在好转中

8 . 小脑幕切迹疝的疝内容物为[单选题] *

A.扣带回

B.海马回、钩回✓

C.小脑扁桃体

D.延髓

E.大脑脚

9 . 动眼神经损伤没有以下哪项表现[单选题] *

A.瞳孔散大

B.眼睑下垂

C.眼球向下活动受限

D.眼球向外活动受限✓

E.眼球向上活动受限

10 . 颅内压增高患者出现便秘，下列措施不妥的是[单选题] *

A.鼓励患者多吃蔬菜、水果

B.应用缓泻剂

C.戴手套掏出干硬粪块

D.高压灌肠✓

E.开塞露塞肛

11 . 判断成人颅内压增高较可靠的依据是[单选题] *

A.头痛

B.呕吐

C.昏迷

D.视盘水肿✓

E.脑中线移位

12 . 颅内压增高最常见的症状是[单选题] *

A.视盘水肿

B.复视

C.意识障碍

D.头痛✓

E.呕吐

13 . 颅脑损伤行冬眠低温疗法的患者，护士应注意使其肛温保持在[单选题] *

A.33~37°C

B.31~34°C✓

C.20~30°C

D.10~20°C

E.0~4°C

14 . 下列哪项不是脑震荡的表现[单选题] *

A.头痛、头晕

B.逆行性健忘

C.眩晕、呕吐

D.脑脊液检查正常

E.颅内压轻度增高✓

15 . 颅脑损伤患者抬高床头 15° ~ 30°的目的是[单选题] *

A.减轻脑水肿✓

B.有利于伤口愈合

C.有利于呼吸道通畅

D.病人舒适

E.防止误吸

16 . 脑血栓形成最常见的原因是[单选题] *

A.高血压

B.糖尿病

C.高脂血症

D.脑动脉粥样硬化✓

E.真性红细胞增多症

17 . 供应内囊血液的中央动脉来自[单选题] *

A.椎动脉

B.大脑前动脉

C.大脑后动脉

D.大脑中动脉✓

E.基底动脉

18 . 以下哪项不符合脑疝的先兆表现[单选题] *

A.喷射性呕吐

B.意识障碍加剧

C.头痛

D.瞳孔不等大

E.血压下降✓

19. 脑卒中患者神经功能康复最适宜的时间为[单选题] *

A. 发病 3 周后开始

B. 恢复期开始

C. 发病后 1 周开始

D. 只要生命体征平稳, 应尽早开始✓

E. 发病 1 个月后开始

20. 一侧面瘫及对侧上、下肢瘫痪称为[单选题] *

A. 偏瘫

B. 交叉性瘫痪✓

C. 四肢瘫

D. 单瘫

E. 截瘫

21. 脑梗死发病常在[单选题] *

A. 用力排便时

B. 剧烈运动时

C. 情绪激动时

D. 安静睡眠时✓

E. 大量进食后

22. 急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病患者脑脊液蛋白-细胞分离现象何时最明显[单选题] *

A. 起病 24 小时内

B. 起病后第 1 周

C . 起病后第 2 ~ 4 周✓

D . 起病后第 5 ~ 6 周

E . 起病 1 个月后

23 . 帕金森病患者最具特征的步态是[单选题] *

A.慌张步态✓

B.鸭状步态

C.跨阈步态

D.蹒跚步态

E.剪刀步态

24 . 蛛网膜下腔出血最常见的病因是[单选题] *

A.高血压

B.血液病

C.先天性颅内动脉瘤✓

D.风湿性心脏病

动脉粥样硬化

25 . 判断癫痫持续状态的关键是[单选题] *

A . 癫痫持续发作超过 24 小时

B.发作间歇期仍有意识障碍✓

C.癫痫发作伴呼吸衰竭

D.意识丧失伴抽搐

E.全身肌肉张弛交替阵挛

26 . 脑血管病的预防中最关键的一环是指[单选题] *

A.发病前的预防✓

B.早期诊断

C.早期治疗

D.脑卒中发生后积极治疗

E.预防复发

27、最常见的中枢神经系统感染性疾病是[单选题] *

A.脑室膜炎

B.病毒性脑膜炎

C.结核性脑膜炎

D.化脓性脑膜炎✓

E.真菌性脑膜炎

28．新生儿化脓性脑膜炎最常见的病原菌是[单选题] *

A.流感杆菌

B.大肠埃希菌✓

C.肺炎双球菌

D.脑膜炎双球菌

E.乙型溶血性链球菌

29．处理惊厥发作的患儿，下列做法不正确的是[单选题] *

A.保持安静，减少刺激

B.立即针刺人中穴

C.松解衣服和扣子

D.清除咽喉分泌物

E.立即将患儿抱到抢救室✓

30 . 热性惊厥的好发年龄是[单选题] *

A.新生儿

B . 1~6 个月

C . 6 个月到 3 岁✓

D . 4~7 岁

E . 8~14 岁

31 . 惊厥持续状态是指惊厥持续超过[单选题] *

A . 1 分钟

B . 5 分钟

C . 10 分钟

D . 20 分钟✓

E . 30 分钟

32 . 以下哪项提示婴儿病毒性脑炎并发了脑疝[单选题] *

A.瞳孔不等大✓

B.颈强直

C.发热

D.头痛

E.呕吐

33 . 金黄色葡萄球菌脑膜炎静脉滴注抗生素的时间应大于[单选题] *

A . 7 天

B . 14 天

C . 21 天✓

D . 10 天

E . 28 天

二、A2 型题（以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案）

1、患者，男，16 岁。与同伴打闹时从高处坠地。体检：一侧瞳孔散大，对侧肢体瘫痪，护士可据此判

断该患者可能出现了[单选题] *

A.小脑幕切迹疝✓

B.枕骨大孔疝

C、动眼神经损伤

D.脑干损伤

E.延髓损伤

2 . 患者，男，45 岁。因颅内肿瘤入院，有明显颅内压增高，最直接、有效的治疗措施是[单选题] *

A.冬眠低温治疗

B.颅内肿瘤切除术✓

C.脑脊液外引流术

D.脱水疗法

E.激素治疗

3 . 患者，男，42 岁。头部撞伤 3 小时，剧烈头痛，频繁呕吐，脉搏缓慢，呼吸深而慢，收缩压较高。

护士此时应遵医嘱应用[单选题] *

A.抗生素

B.镇痛剂

C.糖皮质激素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/077145103141006032>