

2022 年主治医师之消化内科主治 306 精选试题及答案二

单选题（共 50 题）

1、关于结核菌素试验的结果，下列哪项不正确

- A. 阴性结果可排除结核病
- B. 年龄越小，阳性反应的意义越大
- C. 机体免疫反应受抑制时，可表现为假阴性
- D. 强阳性反应表示体内有活动性结核病
- E. 儿童呈阳性反应并不代表体内有活动性结核病灶

【答案】 A

2、患者男，36 岁。查体脾脏肋下 3cm，该患者的诊断可能是

- A. 粟粒型肺结核
- B. 黑热病
- C. 骨髓纤维化
- D. 肝硬化
- E. 感染性心内膜炎

【答案】 D

3、下列有关胃食管反流病胃灼热的描述，错误的是

- A. 胃灼热是指胸骨后或剑突下烧灼感
- B. 常在餐后半小时出现
- C. 腹压增高时可加重
- D. 弯腰时可加重

E. 卧位时可加重

【答案】 B

4、心脏后负荷是指

A. 心脏收缩、舒张时的心腔容积

B. 心脏舒张时所承受的阻抗负荷

C. 心脏收缩时所承受的阻抗负荷

D. 心脏舒张时所承受的容量负荷

E. 心脏收缩时所承受的容量负荷

【答案】 C

5、男性，67岁，饮酒后上腹痛12小时，伴腹胀，恶心、呕吐。查体：上腹正中压痛(+)，无反跳痛。既往有胆囊结石病史

A. 胃肠减压

B. 肌肉注射吗啡止痛

C. 禁食，补液

D. 监测生命体征

E. 静脉滴注抗生素

【答案】 B

6、男性，51岁。乙肝病史19年，大量饮酒史30年，1年来出现乏力，腹胀，尿量减少，偶有牙出血和鼻出血。1天前，劳累后突然出现恶心，呕新鲜血含有血块，共约1000ml。查体：BP85/40mmHg，P130次/分，神志淡漠。

A. 预防心力衰竭

B. 预防感染

- C. 预防肝性脑病
- D. 预防出血量进一步增大
- E. 预防肾脏衰竭

【答案】 C

7、男性，68岁。于夜间睡眠时突发呼吸困难，呈进行性加重，伴咳嗽，口唇发绀。既往有高血压病史20年，血压控制不佳。该患者呼吸困难的原因是

- A. 支气管哮喘
- B. 肺栓塞
- C. 左心衰竭
- D. 右心衰竭
- E. 慢性支气管炎急性发作

【答案】 C

8、男性，58岁。肝硬化病史20年，2日前进肉食后出现烦躁，胡言乱语，昼夜颠倒。查体：肌张力增高，腱反射亢进，双侧Babinski征阳性

- A. 脑血管意外
- B. 肺性脑病
- C. 尿毒症
- D. 肝性脑病
- E. 中枢神经系统感染

【答案】 D

9、下列不是幽门管溃疡特点的是

- A. 早期可出现呕吐

- B. 餐后很快发生疼痛，制酸剂难控制
- C. 部分患者需手术治疗
- D. 好发在 20~40 岁
- E. 易并发幽门梗阻、出血及穿孔

【答案】 B

10、下述哪项不是结核性腹膜炎病人的发热特点

- A. 高热伴明显毒血症者见于渗出型
- B. 大多为弛张热
- C. 热型以低热与中等热为多见
- D. 高热伴明显毒血症者见于伴有粟粒型结核者
- E. 高热伴明显毒血症者见于干酪型

【答案】 B

11、女性，40 岁，反复右下腹痛、糊状便 5 年，无脓血，有时伴低热。查体：腹平软，右下腹可触及包块。

- A. 结肠镜检查
- B. X 线钡剂灌肠
- C. 粪便潜血
- D. 结核菌素试验
- E. 血沉

【答案】 A

12、如果一名患者呕吐物有发酵、腐败气味提示

- A. 急性肠炎
- B. 低位小肠梗阻
- C. 胃潴留
- D. 贲门狭窄
- E. 胃泌素瘤

【答案】 C

13、肝癌腹水常见

- A. 漏出液
- B. 乳糜液
- C. 血性液
- D. ADA 活性升高
- E. 腹水胆固醇升高

【答案】 C

14、食管癌最可靠的诊断方法是

- A. 黏膜脱落细胞
- B. 内镜
- C. CT 扫描
- D. 超声
- E. X 线吞钡

【答案】 B

15、不符合 Crohn 病的描述是

- A. 只累及回肠
- B. 呈节段性分布
- C. 常呈慢性经过
- D. 肠黏膜呈鹅卵石状外观
- E. 形成裂隙及匍行性溃疡

【答案】 A

16、溃疡性结肠炎表现为

- A. X线可见跳跃征
- B. CEA显著升高
- C. 血浆VIP水平升高
- D. 抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
- E. 低钙血症

【答案】 D

17、男性，56岁，餐后出现上腹剧烈疼痛，伴呕吐，查体：T39℃，血压：80/50mmHg，剑突下压痛，无反跳痛，Murphy征阳性，WBC $16.0 \times 10^9/L$

- A. B超
- B. ERCP
- C. 超声内镜检查
- D. X线钡剂检查
- E. CT

【答案】 A

18、男性，45岁，间断上腹不适3年，胃镜检查提示重度萎缩性胃炎伴肠化生，W-S染色阳性。

- A. 当时
- B. 1个月
- C. 3个月
- D. 6个月
- E. 1年

【答案】 B

19、男，40岁。恶心、呕吐、尿色变深2天。既往无肝炎病史。查体：巩膜黄染，肝肋下2cm。实验室检查：ALT800U/l，TBil60 μ mol/l，抗HAVIgM(-)。HBsAg(+)，抗HBs(-)，抗HBcIgM(+)。该患者最可能的诊断是

- A. 急性甲型肝炎
- B. 急性乙型肝炎
- C. 乙型肝炎恢复期
- D. 甲型肝炎恢复期
- E. 急性肝炎，HBsAg携带者

【答案】 B

20、属于支气管扩张特异性的临床表现为()

- A. 慢性咳嗽，咳白色泡沫痰
- B. 慢性咳嗽，咳白色黏痰，痰中带血
- C. 心慌、气短、咳粉红色泡沫痰
- D. X线胸片显示左下肺纹理紊乱，多个不规则环状透光区伴卷发状阴影
- E. 多于中年后发病

【答案】 D

21、右下腹部疼痛多为

- A. 急性胰腺炎
- B. 胆囊炎
- C. 急性阑尾炎
- D. 肾结石
- E. 结肠炎

【答案】 C

22、肝细胞对结合胆红素及其他有机阴离子毛细胆管排泄障碍多见于

- A. Gilbert 综合征
- B. Dubin-Johnson 综合征
- C. Crigler-Najjar
- D. Rotor 综合征
- E. 无效造血

【答案】 B

23、尿红细胞形态学检查可判断()

- A. 肾源性与非肾源性血尿
- B. 感染与非感染性血尿
- C. 原发与继发性肾小球疾病
- D. 肾炎与肾病性血尿
- E. 泌尿系畸形与肿瘤性血尿

【答案】 A

24、慢性乙型病毒性肝炎的抗病毒治疗的常用药物哪种不妥

- A. 阿地福韦
- B. 利巴韦林
- C. 拉米夫定
- D. 干扰素
- E. 泛昔洛韦

【答案】 B

25、对于胃癌的发生部位，正确的是

- A. 幽门区最多
- B. 贲门部位最多
- C. 胃窦区最多
- D. 胃底最多
- E. 幽门区少发

【答案】 C

26、依据 WHO 标准可诊为 Crohn 病的是

- A. 非连续性肠道病变，伴纵行溃疡
- B. 区域性肠道病变，黏膜呈铺路石样改变
- C. 节段性肠道病变，纵行溃疡
- D. 非连续性肠道病变，全层性炎及非干酪性肉芽肿
- E. 全层性炎症性肠道病变伴肿块及狭窄

【答案】 D

27、不是导致慢性肺心病的疾病是()

- A. 反复发生的肺小动脉栓塞
- B. 肺脓肿
- C. 慢性阻塞性肺病
- D. 先天性肺囊肿
- E. 支气管扩张

【答案】 B

28、肝硬化早期诊断最可靠的方法是

- A. 肝功能试验
- B. 腹腔镜直视下活检
- C. B超
- D. 肝脏 CT
- E. 食管钡透

【答案】 B

29、二尖瓣区收缩期器质性杂音的听诊特点不包括

- A. 高调
- B. 性质粗糙
- C. 吸气时增强
- D. 向左腋下传导
- E. 吹风样

【答案】 C

30、患者男，23岁。呼吸困难，听诊主动脉瓣听诊区可闻及舒张期叹气样杂音，患者查体不可能出现

- A. Kussmaul 征
- B. 水冲脉
- C. 枪击音
- D. Duroziez 双重杂音
- E. 颈动脉搏动

【答案】 A

31、患者，女，28岁。间断上腹痛5年，饥饿痛，餐后缓解。近1天来上腹胀痛，呕吐，呕吐物量大，为宿食。查体：上腹部有振水音，转动体位，症状不能缓解。最可能的诊断是

- A. 肠系膜上动脉综合征
- B. 胃下垂
- C. 胃粘膜脱垂
- D. 消化性溃疡合并幽门梗阻
- E. 胃癌

【答案】 D

32、患者，男，45岁。5年前因克罗恩病行回肠部分切除术。近2个月腹痛、腹泻症状经强的松、SASP治疗后仍不缓解。体检：消瘦，血压135 / 75mmHg，右中腹部压痛(+)，未触及包块。血沉43mm / h，血Hb76g / L。应采取的治疗措施是

- A. 手术切除

- B. 丁胺卡那素
- C. 6-巯基嘌呤
- D. 灭滴灵
- E. 肾上腺糖皮质激素静滴

【答案】 C

33、女性，25岁，因交通事故右侧肢体广泛挤压伤，尿色应为

- A. 深茶色样尿
- B. 均一红细胞尿
- C. 红色尿
- D. 变形红细胞尿
- E. 紫色尿

【答案】 A

34、适碘地区甲减最常见的病因是

- A. 桥本病
- B. 亚急性甲状腺炎
- C. 无痛性甲状腺炎
- D. 单纯甲状腺肿
- E. 结节性甲状腺肿

【答案】 A

35、女性，65岁。突发头痛及喷射性呕吐。查体：BP170/100mmHg，P77次/分。该患者的诊断可能是

- A. 霍乱
- B. 胃潴留
- C. 急性胰腺炎
- D. 脑栓塞
- E. 幽门梗阻

【答案】 D

36、男性，25岁，既往健康，大量饮酒后出现剧烈恶心、呕吐，继而呕血约500ml，鲜红色

- A. 食管静脉曲张破裂出血
- B. 食管贲门黏膜撕裂综合征
- C. 出血糜烂性胃炎出血
- D. 反流性食管炎出血
- E. 十二指肠溃疡出血

【答案】 B

37、关于食管下括约肌的叙述，下列哪项是错误的

- A. 促胃液素可刺激其收缩
- B. 该部位平滑肌增厚
- C. 正常人休息时食管下括约肌压力为10~30mmHg
- D. 可防止胃内容物逆流入食管
- E. 食管下括约肌长约2~4cm

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078102066121006035>