

重症医学科考试试题及答案

1、有关洗手指征错误的是（）

- A、接触传染病患者前后
- B、进行无菌操作后
- C、接触患者的血液、体液、分泌物后
- D、脱手套前
- E、进入和离开 ICU

答案：D

2、微创脊柱外科技术分为哪几类？

- A、经皮穿刺技术
- B、内镜技术
- C、内镜辅助下的小切口技术
- D、以上都是
- E、以上都不是

答案：D

3、手外伤骨折术后拆除石膏的时间（）

- A、1-2周
- B、2-3周
- C、3-4周
- D、4-5周
- E、6-8周

答案：E

4、紧急处理心跳呼吸骤停时，应最先采用

- A、电除颤
- B、人工呼吸和胸外心脏按压
- C、动脉输血
- D、心内注射三联针
- E、以上均可

答案：B

5、局麻药中毒原因需除外的是（）

- A、一次用药超过最大安全剂量
- B、局部药物误注入血管
- C、注射部位血管丰富或有炎性反应
- D、将酯类药物与酰胺类药物混合使用可增强其毒性
- E、局麻药中未加肾上腺素局麻药吸收迅速

答案：D

6、抗休克纠正组织低灌注和缺氧的关键是（）

- A、积极治疗原发病
- B、纠正酸中毒
- C、补充血容量
- D、应用血管扩张剂改善微循环
- E、抗凝治疗解除微细血栓

答案：C

7、治疗呼吸衰竭时，为建立通畅的气道，不应采取以下哪项措施

- A、止咳，给予可待因
- B、促进排痰，给予祛痰药
- C、给予支气管解痉药
- D、必要时做气管插管吸痰
- E、必要时采用器官切开的方式吸痰

答案：A

8、振动排痰机的振动频率为（）

- A、5~10 次/s
- B、10~20 次/s
- C、20~30 次/s
- D、30~40 次/s
- E、40~50 次/s

答案：C

9、下肢骨折后包扎过紧，肿胀内压力增高易引起骨折并发症（）？

- A、感染
- B、骨筋膜室综合征
- C、关节僵硬
- D、缺血性坏死
- E、肌肉坏死

答案：B

10、患者，女性，60岁。有房颤史，清晨起床自行上厕所时摔倒，家人发现其口角歪斜，自诉左侧肢体麻木，送医院检查：意识清楚，左侧偏瘫，CT示：低密度影。最可能的诊断是（）

- A、脑出血
- B、脑挫伤
- C、脑震荡

D、蛛网膜下腔出血

E、脑梗死

答案：E

11、截瘫病 长期卧床，在足部放一护架作用是（）。

A、用于足部运动

B、避免发生褥疮

C、用于观察血运

D、避免长期受压，形成足下垂

E、用于足底保护

答案：D

12、患者确诊为心肌梗死收入监护室，监测中发现出现室颤，护士应首先采取的是

A、心内注射利多卡因

B、气管插管

C、高压吸痰

D、非同步电除颤

E、胸外按压

答案：D

13、某1型糖尿病患者，16岁，消瘦，“三多一少”症状明显，其饮食总热量应（）

A、按实际体重计算再酌增

B、按实际体重计算再酌减

C、按标准体重计算再酌增

D、按标准体重计算再酌减

E、按标准体重减少10%

答案：C

14、对于急性血源性骨髓炎病人，为巩固疗效待体温下降后再连续使用抗生素至少（）

A、1周

B、2周

C、3周

D、4周

E、5周

答案：C

15、开颅术后并发血肿的观察内容不包括

- A、头痛、呕吐
- B、意识、瞳孔
- C、生命体征
- D、肢体活动
- E、尿量增多

答案：E

16、呼吸机给氧氧浓度调节范围是（）

- A、21%~50%
- B、21%~60%
- C、21%~70%
- D、21%~80%
- E、21%~100%

答案：E

17、患者，男性，20岁，活动后心悸气急2月。检查发现肝大、质地中等，表面平滑、有压痛，腹部移动性浊音阳性，下肢压陷性水肿。最可能的诊断是（）？

- A、肝硬化腹水
- B、肝癌伴腹水
- C、肺结核伴结核性腹膜炎
- D、肾病综合征伴腹水
- E、右心衰竭、肝淤血伴腹水

答案：E

18、骨关节结核中发病率最高的是（）

- A、肘关节结核
- B、腕关节结核
- C、脊柱关节结核
- D、髋关节结核
- E、膝关节结核

答案：C

19、患者男性，36岁。头部外伤15小时，当时有昏迷20分钟，3小时前开始神志渐差。查体：刺痛可以睁眼，语言含糊不清，双瞳孔等大、等圆，光反应(+)，刺痛可以定位但左肢体力弱，左侧病理征(+)。下列措施不可取的是（）

- A、快速静点甘露醇
- B、小壶加速尿

- C、吸氧
- D、腰穿
- E、保持呼吸通畅

答案：D

20、吸引后用水冲洗吸引管，黏附在管壁上的分泌物不容易冲洗去除提示

()

- A、湿化不足
- B、湿化尚可
- C、湿化过度
- D、上述说法都正确
- E、上述说法都不正确

答案：A

21、对诊断尚未明确的急腹症患者，可以采取的措施是：

- A、用吗啡止痛
- B、用阿托品解痉
- C、给患者灌肠
- D、使用腹泻药
- E、用热水袋热敷

答案：B

22、患者，女性，25岁。右胫骨上方有一圆形肿块并发进行性疼痛加重 2 月余，关节活动轻度受限，就诊查 X 线示骨端偏心溶骨性破坏而无骨膜反应，可见“肥皂泡”样变。该肿瘤最常见的部位为()

- A、股骨近端
- B、胫骨近端
- C、桡骨近端
- D、腓骨近端
- E、尺骨近端

答案：B

23、甲状腺功能亢进症患者多饮水能 ()

- A、补充出汗等丢失的水分
- B、防止尿酸性肾病
- C、减少出血性膀胱炎并发症
- D、加速细菌、毒素及炎性分泌物排出
- E、促进痰液稀释而容易排出

答案：A

24、骨盆骨折并发症中，较少见的是（ ）

- A、直肠损伤
- B、膀胱损伤
- C、尿道损伤
- D、神经损伤
- E、腹膜后血肿

答案：A

25、预防牵引针眼感染的措施正确的是（ ）

- A、针眼处的分泌物不必处理
- B、针眼处每日滴生理盐水 2 次
- C、骨牵引针两端套上木塞或小瓶
- D、发现牵引针偏移时应立即矫正
- E、感染者应引流后，保持钢针原位牵引

答案：C

26、成人骨折的临床愈合发生在伤后（ ）

- A、2~3 周
- B、4~8 周
- C、8~12 周
- D、6 个月
- E、2~4 年

答案：B

27、腰椎间盘突出症患者，腰背肌锻炼需在术后（ ）开始。

- A、7 天
- B、2 天
- C、5 天
- D、3 天
- E、1 天

答案：A

28、下列不是下肢浅静脉曲张并发症的是（ ）

- A、血栓性浅静脉炎
- B、溃疡形成
- C、破裂出血
- D、酸胀乏力
- E、足靴区皮肤营养障碍性疾病

答案：D

29、胆囊三角（Calot 三角）的构成是（ ）

- A、胆囊管、肝总管和肝门构成的三角区
- B、胆总管、肝总管和胰管构成的三角区
- C、胆囊管、肝总管和肝下缘构成的三角区
- D、胆总管、肝门和十二指肠乳头处构成的三角区
- E、胆囊、肝脏和胰腺构成的三角区

答案：C

30、判断吸痰时采用非定时吸痰，以下说法错误的是（ ）

- A、患者要求吸痰
- B、咳嗽、血氧饱和度下降
- C、呼吸机吸气峰压增高，出现峰压报警
- D、雾化治疗前
- E、体位引流前

答案：A

31、1 期压疮可选择的敷料哪项不正确（ ）

- A、溃疡贴
- B、透明贴
- C、皮肤保护膜
- D、减压贴
- E、银离子敷料

答案：E

32、心排血量是指（ ）？

- A、一次心搏由两侧心室输出的血量
- B、每分钟由两侧心室输出的血量
- C、每分钟排血量=心率 X 每搏量
- D、女性比同体重男性的心排血量大
- E、麻醉情况下心排血量增加

答案：C

33、PD 病的特点是：

- A、起病缓慢，逐渐加重
- B、起病急，逐渐加重
- C、起病急，逐渐减轻
- D、起病缓慢，逐渐减轻
- E、以上都不是

答案：A

34、下列局麻药中，酯类局麻药是（ ）

- A、利多卡因
- B、丁卡因
- C、布比卡因
- D、依替卡因
- E、罗哌卡因

答案：B

35、多重耐药菌是指对临床使用的（ ）抗菌药物同时呈现耐药的细菌。

- A、三类或三类以上
- B、二类或二类以上
- C、四类或四类以上
- D、一类或一类以上
- E、五种

答案：A

36、感觉性失语，病变部位在优势半球的：

- A、额下回后部
- B、颞上回后部
- C、角回
- D、顶上小叶
- E、枕叶

答案：B

37、蛛网膜下腔阻滞（腰麻）常见并发症（ ）

- A、全脊麻
- B、高血压
- C、低血压
- D、肺不张
- E、心律失常

答案：C

38、为清除肝硬化病人肠内积血，灌肠首选哪种液体

- A、温开水
- B、生理盐水
- C、稀醋溶液
- D、碳酸氢钠溶液
- E、肥皂水

答案：C

39、腹部手术后 3~4 日最常见的并发症有 ()

- A、切口感染
- B、切口裂开
- C、肺不张
- D、急性胃扩张
- E、下肢深静脉血栓形成

答案：A

40、机体调节酸碱平衡最迅速的途径是

- A、肺脏
- B、肾脏
- C、血液缓冲系统
- D、细胞内外离子交换
- E、神经-内分泌系统

答案：C

41、医院感染管理工作的基础是 ()

- A、抗生素使用监测
- B、消毒灭菌制度监测
- C、隔离制度监测
- D、医院感染高危人群监测
- E、全面综合性监测

答案：E

42、气管异物的临床表现应除外

- A、咳嗽. 憋气. 窒息
- B、声门下拍击声
- C、呼吸频率下降
- D、哮喘音
- E、双肺呼吸音不一致

答案：C

43、患者男性，35 岁。饱餐后出现突发的上腹部持续性刀割样剧痛，很快扩散至全腹，伴恶心、呕吐，面色苍白，出冷汗，四肢湿冷。此时病人应采取的最佳体位是 ()

- A、半卧位
- B、俯卧位
- C、平卧位
- D、头低足高位

E、头高足低位

答案：C

44、关于机械通气的目的，最准确的叙述是

A、提供呼吸支持，保证肺泡足够通气

B、减少呼吸功，直到呼吸衰竭的原因得到纠正

C、动脉血气分析恢复正常值

D、避免机械通气相关并发症

E、以上均正确

答案：E

45、患者男性，40岁。外伤所致左侧胫腓骨骨折，复位后给予小腿管型石膏外固定，患者主诉石膏内有持续性局部疼痛。请判断患者可能出现的问题是（）

A、石膏综合征

B、化脓性皮炎

C、骨筋膜室综合征

D、伤口感染

E、石膏压疮

答案：E

46、糖化血红蛋白测定反映取血前（）个月的血糖水平。

A、1-2

B、2-3

C、3-4

D、4-5

E、5-6

答案：B

47、导致肺水肿最直接的原因是（）？

A、肺动脉压升高

B、右心室压升高

C、肺静脉压升高

D、左心室舒张末压升高

E、右心房压升高

答案：C

48、破伤风的初发症状是（）

A、苦笑

B、颈项强直

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/078126047126006036>