

2022 年江西省专升本考试大学医学综合模拟试卷

一、单选题

1、男，36 岁。间断性上腹痛 3 年，近 1 周上腹胀满、反复呕吐，呕吐后症状可缓解。查体：振水音阳性。最可能的诊断是【】

- (A) 胃穿孔
- (B) 幽门梗阻
- (C) 慢性胃炎
- (D) 慢性胆囊炎
- (E) 急性胰腺炎

2、造成心室前负荷增大的因素是（）

- (A) 心肌收缩力增强
- (B) 静脉回流速度下降
- (C) 心室充盈量增大
- (D) 心率增快
- (E) 心室顺应性减小

3、凝血酶的主要作用是【】

- (A) 加速因子 VIII 复合物的形成
- (B) 使纤维蛋白原转变为纤维蛋白
- (C) 加速凝血酶原复合物的形成
- (D) 激活因子 III 和 XII
- (E) 激活血小板第 3 因子

4、有助于鉴别肾前性和肾后性急性肾衰竭的检查是（）

- (A) 肾穿刺活检

(B)血常规

(C)血尿素氮和肌酐

(D)磁共振水成像

(E)每小时尿量

5、大量胸腔积液患者不易出现的体征是（）

(A)患侧闻及胸膜摩擦音

(B)气管向健侧移位

(C)患侧语音震颤减弱

(D)患侧胸廓扩张度减弱

(E)患侧肋间隙增宽

6、引起肝浊音界消失最常见的原因是【】

(A)胃肠穿孔

(B)肺气肿

(C)间位结肠

(D)肠梗阻

(E)内脏转位

7、需长期肠外营养支持者，首选的穿刺血管是()

(A)颈外静脉

(B)大隐静脉

(C)颈内静脉

(D)腓静脉

8、视近物时，形态改变最显著的眼结构是()

(A)巩膜

(B)角膜

(C)玻璃体

(D)晶状体

9、纯净胃液的 pH 为 ( )

(A)3.9~4.5

(B)4.9~5.5

(C)0.9~1.5

(D)2.9~3.5

(E)1.9~2.5

10、二尖瓣关闭不全典型的体征是 ( )

(A)心尖部闻及收缩期吹风样高调杂音

(B)胸骨左缘第 2 肋间闻及 GrahamStell 杂音

(C)心尖部闻及舒张中期杂音

(D)胸骨左缘第 3 肋间闻及收缩期粗糙杂音

(E)胸骨左缘第 2 肋间闻及连续性杂音

11、与组织液中含量基本相同的血浆成分是 ( )

(A)球蛋白

(B)纤维蛋白原

(C)清蛋白

(D)透明质酸

(E)电解质

12、男，45 岁。因突发上腹痛并迅速向全腹蔓延 3 小时就诊。查体：T38.8℃。全腹压痛及反跳痛阳性，肝浊音界消失。最可能的诊断是 ( )

- (A)急性胃穿孔
- (B)急性胃肠炎
- (C)急性肠梗阻
- (D)急性胰腺炎
- (E)急性胆管炎

13、肾窦内含有的结构有（）

- (A)肾静脉的属支
- (B)肾大盏
- (C)肾小盏
- (D)肾动脉的分支
- (E)肾盂

14、突触前抑制时，与突触活动有关的变化是【】

- (A)突触前膜超极化
- (B)兴奋性突触后电位减小
- (C)突触前膜不释放神经递质
- (D)抑制性突触后电位增大
- (E)到达轴突末梢的兴奋减少

15、下列属于腺垂体激素的是【】

- (A)生长激素
- (B)甲状腺素
- (C)缩宫素
- (D)血管升压素
- (E)生长抑素

16、女，32岁。低热、盗汗、腹胀2个月。腹水检查结果：比重1.018，蛋白27g/L，WBC $600 \times 10^6/L$ ，L0.55。普通细菌培养阴性。最可能的诊断是（）

- (A) 结核性腹膜炎
- (B) 化脓性腹膜炎
- (C) 肝硬化腹水
- (D) 恶性腹水
- (E) 自发性细菌性腹膜炎

17、男，65岁。间断咳喘20年，曾被确诊为“慢性阻塞性肺疾病”。因喘憋加重伴双下肢水肿半年就诊。引起水肿最可能的原因是【】

- (A) 肝硬化失代偿
- (B) 慢性右心衰竭
- (C) 下肢静脉血栓
- (D) 药物不良反应
- (E) 营养不良

18、衡量细胞兴奋性大小的常用指标是()

- (A) 静息电位大小
- (B) 阈强度大小
- (C) 动作电位幅度
- (D) 动作电位宽度

19、预激综合征的心电图表现是（）

- (A) PR间期正常，QRS增宽，肢体导联QRS呈S型
- (B) PR间期缩短，QRS增宽，QRS起始部delta波
- (C) PR间期正常，QRS增宽，V5R增宽、顶峰粗钝

(D)PR 间期正常，QRS 增宽，VV2 导联 QRS 呈 M 型

(E)P 与 QRS 无关，QRS 增宽，房与室保持各自节律

20、纯净胃液的 pH 为 ( )

(A)3.9~4.5

(B)4.9~5.5

(C)0.9~1.5

(D)2.9~3.5

(E)1.9~2.5

21、不受动眼神经支配的眼肌是 ( )

(A)下直肌

(B)上睑提肌

(C)上直肌

(D)内直肌

(E)外直肌

22、某患者腹壁曲张静脉分布于腹壁两侧，脐上和脐下静脉血流方向均向上。最可能的原因是【】

(A) 肝静脉血栓

(B) 胃底静脉开放

(C) 脾肾静脉分流

(D) 下腔静脉阻塞

(E) 门静脉癌栓

23、下列关于皮质醇升高血糖机制的描述，正确的是 ( )

(A)减少细胞对葡萄糖的利用

- (B)增加外周组织摄取葡萄糖
- (C)使肝糖异生酶的活性降低
- (D)增加葡萄糖转运体的活性
- (E)减少肝糖异生原料的供应

24、关于休克的一般紧急治疗，不正确的选项为（）

- (A)创伤制动、保证呼吸道通畅
- (B)及早建立静脉通路
- (C)早期给予鼻导管或面罩吸氧
- (D)采取平卧位
- (E)注意保暖

25、一侧视交叉外侧部的不交叉纤维损伤时，引起的视野缺损是（）

- (A)双眼视野鼻侧半偏盲
- (B)患侧视野鼻侧半偏盲
- (C)双眼视野对侧半同向性偏盲
- (D)双眼视野颞侧半偏盲
- (E)患侧眼全盲

26、男，40岁。发现高血压半年。查体时于脐部偏右上闻及血管杂音。最可能的诊断是

- （）
- (A)主动脉夹层
  - (B)原发性肝癌
  - (C)缺血性肠病
  - (D)门静脉血栓
  - (E)肾动脉狭窄

27、手术中识别输卵管的标志是（）

- (A) 输卵管漏斗
- (B) 输卵管峡
- (C) 输卵管伞
- (D) 输卵管壶腹
- (E) 输卵管腹腔口

28、女，30岁。寒战、发热4天。查体：右侧肋脊点、肋腰点压痛阳性。首选的辅助检查是（）

- (A) 肾功能
- (B) 腹部B超
- (C) 粪便常规
- (D) 尿常规
- (E) 结肠镜

29、男，23岁。因发热、呼吸困难2周就诊。查体：颈静脉怒张，心音遥远，心界向两侧扩大。最可能的诊断是【】

- (A) 感染性心内膜炎
- (B) 结核性心包炎
- (C) 风湿性心脏瓣膜病
- (D) 原发性高血压
- (E) 肥厚型心肌病

30、肺气肿患者可能出现的体征是（）

- (A) 双侧肋间隙变窄
- (B) 肝上界下移

- (C)心界向两侧扩大
- (D)双肺语音震颤增强
- (E)肺部叩诊呈鼓音

31、心脏内兴奋传导最慢的组织是()

- (A)窦房结
- (B)浦肯野纤维
- (C)房室结
- (D)心室肌

32、具有结肠带和肠脂垂的肠管是（）

- (A)肛管
- (B)直肠
- (C)阑尾
- (D)盲肠
- (E)回肠

33、污染伤口是指（）

- (A)有细菌存在，但尚未发生感染的伤口
- (B)有细菌存在，并已发生感染的伤口
- (C)局部红肿并有分泌物的伤口
- (D)腹股沟疝手术切口
- (E)已化脓的伤口

34、下列属于肠系膜下动脉分支的是【】

- (A)回结肠动脉
- (B)右结肠动脉

- (C) 左结肠动脉
- (D) 中结肠动脉
- (E) 空肠动脉

35、大脑优势半球的额下回后部代表的中枢是 ( )

- (A) 书写中枢
- (B) 听中枢
- (C) 感觉性语言中枢
- (D) 视觉性语言中枢
- (E) 运动性语言中枢

36、代谢性碱中毒常同时存在的电解质紊乱是()

- (A) 高钾血症
- (B) 低钠血症
- (C) 高钠血症
- (D) 低钾血症

37、既是症状，也是体征的选项是【】

- (A) 腹痛
- (B) 心悸
- (C) 头晕
- (D) 黄疸
- (E) 胸闷

38、下列属于脑高级功能活动的是【】

- (A) 非条件反射

(B) 视听觉

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/085321100131011130>