

# 学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

## 骨科医师出科理论考核

1.患者，52 岁，一月来，左肘部疼痛，向前臂外侧放射，肘关节活动正常，肱骨外上髁部局限性压痛，最好的治疗方法是（ ） [单选题] \*

- A.手术
- B.理疗
- C.痛点注射醋酸氢化泼尼松\*
- D.按摩
- E.石膏固定

2.30 岁男性，摔伤后即感左肘疼痛、肿胀，不能活动，查体左肘关节固定于半伸直位，尺骨鹰嘴突出于肘后，肘部三点关系改变，最可能的诊断是（ ） [单选题] \*

- A.肱骨髁上骨折
- B.尺骨鹰嘴骨折
- C.肘关节后脱位\*
- D.肱骨髁间骨折
- E.肱骨内上髁骨折

3.患儿，5 岁，右小腿肿痛，伴高热 39-40°C 近一周，局部略红肿，具深压痛，经大剂量抗生素治疗 3 天不能控制，中毒症状严重，此时最正确的治疗是（ ） [单选题] \*

- A.加用激素治疗
- B.输血
- C.局部制动
- D.切开引流\*

E.病灶清除

4.骨关节结核早期 X 线片表现（ ） [单选题] \*

A.骨空洞形成

B.层状骨膜增生

C.边缘不齐的小死骨

D.骨质缺损

E.骨小梁模糊，呈磨砂玻璃状\*

5.男性青年工人 25 岁，骤然抬起重物时腰剧痛，继而右下肢麻痛，咳嗽时疼痛由臀部串到左足跟。检查：腰部有肌痉挛，活动受限并有侧弯现象，L4-5 间隙有明显按痛和叩痛，临床诊断最可能是（ ） [单选题] \*

A.腰椎骨折

B.腰椎脱位

C.蛛网膜下腔出血

D.腰椎间盘突出症\*

E.腰扭伤

6.女性 34 岁，滑跌，右小腿出现疼痛，肿胀，稍有外旋畸形，足背感觉麻木，足趾不能背伸，但趾屈活动尚存在，X 线片示右胫骨下 1/3，腓骨颈骨折，出现的并发症最可能出现的是（ ） [单选题] \*

A.坐骨神经损伤

B.神经损伤

C.胫后神经损伤

D.腓总神经损伤\*

## E.腓浅神经损伤

7.男性 54 岁，车祸，右胫腓骨中 1/3 粉碎骨折，复位后夹板固定，因右小腿肿胀足趾剧烈疼痛伤后 36 小时转诊，检查：右足趾明显肿胀，青紫，感觉麻木，足趾活动差，毛细血管充盈尚存在，取除夹板见右小腿肿胀甚，皮温较高且皮肤有水泡出现，考虑并发最可能为（ ） [单选题] \*

A.腓总神经损伤

B.胫前动脉损伤

C.胫后动脉损伤

D.胫动脉损伤

E.骨筋膜室综合征\*

8.嵌插骨折的主要诊断依据是（ ） [单选题] \*

A.骨折部的压痛和轴向叩击痛\*

B.骨折部的反常活动和骨擦感

C.骨折部软组织肿胀

D.骨折部畸形

E.骨折部软组织淤斑

9.石膏或夹板固定后，最应注意的是（ ） [单选题] \*

A.松脱

B.骨折再移位

C.压迫性溃疡

D.血循环受阻\*

E.石膏变形

10.化脓性膝关节炎的早期诊断中，最有价值的方法是（ ） [单选题] \*

A.关节肿胀与压痛

B.浮髌试验阳性

C.X 线摄片检查

D.关节液检查\*

E.CT 检查

11.肱骨髁上骨折伸直型骨折的最严重并发症是（ ） [单选题] \*

A.正中神经损伤

B.畸形愈合形成肘内翻

C.前臂肌肉缺血性挛缩\*

D.骨化性肌炎

E.关节僵硬

12. 疲劳骨折多发生于（ ） [单选题] \*

A.第二、三跖骨\*

B.腓骨上 1/3 骨干

C.尺骨

D.桡骨

E.肱骨上 1/3

13.女性，69 岁，不慎摔倒，自觉左髌、左膝关节疼痛，不能站立、行走。查体：左下肢外旋 45°；髌部无肿胀及瘀血；有纵轴叩击痛；膝关节无肿胀、压痛。最应考虑诊断（ ） [单选题]

\*

A.粗隆间骨折

B.髌关节后脱位

C.股骨颈骨折\*

D.髌骨骨折

E.股骨干骨折

14.血源性化脓性骨髓炎的最好发部位是（ ） [单选题] \*

A.肱骨

B.股骨下端及胫骨上端\*

C.脊柱椎体

D.桡骨

E.骨盆

15.骨及关节急性化脓感染的诊断最有力的依据是（ ） [单选题] \*

A.急性发作高烧，局部疼痛

B.白血球高，局部疼痛

C.全身不适，食欲差，局部痛，活动受限

D.局部穿刺有脓性物\*

E.高烧，局部肿胀

16.慢性骨髓炎的手术适应症是（ ） [单选题] \*

A.反复有发烧及局部疼痛

B.局部有红、肿

C.局部压痛

D.病变骨质变粗、密度增高

E.有死骨且骨包壳充分形成\*

17.急性化脓性髋关节炎小儿，突然发生髋关节剧痛，呈屈曲内收、内旋位，弹性固定，除应用抗菌素外最宜选用何种治疗？（ ） [单选题] \*

- A.手法整复与石膏固定
- B.手法整复与小夹板固定
- C.切开复位引流+持续皮肤牵引\*
- D.持续骨牵引
- E.切开引流加皮牵引

18.一位患者因车祸，造成耻骨骨折并刺破膀胱，检查所见，耻骨联合处已塌陷，骨折分类应属（ ） [单选题] \*

- A.闭合性骨折
- B.开放性骨折\*
- C.裂缝骨折
- D.压缩性骨折
- E.骨骺分离

19.诊断急性血源性骨髓炎，最有价值的检查是（ ） [单选题] \*

- A.查血中白细胞计数及分类
- B.B 型超声
- C.拍 X 线片
- D.CT 检查
- E.局部分层穿刺\*

20.塌方将一煤矿工人的骨盆部砸伤。3 小时后方被救出。查体：神智清，面色苍白，血压测不清。以下哪项检查是最必要的？（ ） [单选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/086205131221010144>