

眼科基础知识题库含参考答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、患者男性，5 岁，家长发现其喜视近。国际标准视力表检查双眼远视力为 0.5，近视力检查为 J3(总共 J1 小-J7 大)，眼部未见明显器质性病变。。患者最不可能的诊断是()

- A、近
- B、弱视
- C、单纯远视散光
- D、远视
- E、混合性散光

正确答案：A

2、对酸或碱性烧伤急救而言，最重要的是()

- A、散大瞳孔
- B、结膜下注射维生素 C
- C、彻底冲洗眼部
- D、滴入碱性或酸性药物
- E、滴入消炎眼药水

正确答案：C

3、视功能的检查不包括()

- A、裂隙灯检查
- B、视力检查
- C、视觉电生理检查
- D、视野检查
- E、色觉检查

正确答案：A

4、一名远视患者，远视力为 0.8，先作主观验光，用+2.5DS 的镜片后，远视力提高到 1.5，再慢慢增加镜片的度数至+5.5DS 时远视力仍然保持 1.5，再增加镜片的度数远视力下降，用阿托品麻痹使睫状肌调节放松后检影结果为+6.5DS 该患者的绝对远视度数为()

- A、+1D
- B、+5.5D
- C、+6.5D
- D、+3D
- E、+2.5D

正确答案：E

5、急性卡他性结膜炎的常见致病菌不包括()

- A、肺炎双球菌
- B、Koch-weeks 杆菌
- C、脑膜炎双球菌
- D、葡萄球菌
- E、淋球菌

正确答案：E

6、不明性质的化学物质溅入眼内应()

- A、等查明化学物质性质后再作处理
- B、包扎
- C、滴入消炎眼药水
- D、立即散瞳
- E、立即用清水冲洗眼部

正确答案：E

7、棘阿米巴感染角膜多见于何种情况()

- A、有结核病史
- B、有发热史
- C、有配戴角膜接触镜病史
- D、有紫外线接触史
- E、有外伤史

正确答案：C

8、患者男性，66岁，因双眼视力骤降半天就诊。检查：左眼视力 0.02，右眼 0.03，结膜无充血，角膜透明，角膜后沉着物阴性，房水闪辉阴性，瞳孔对光反射对称、迟钝、晶状体轻度混浊，玻璃体无混浊；视乳头充血水肿。请问首先需行哪种检查()

- A、眼底荧光造影
- B、CT
- C、验光
- D、VEP
- E、视野检查

正确答案：E

9、闭角型青光眼急性期临床表现不正确的是()

- A、前房极浅，周边部前房消失

- B、瞳孔缩小
- C、眼睑水肿，混合性充血
- D、剧烈头痛，眼痛、畏光、流泪、视力下降、眼压升高
- E、角膜上皮水肿，角膜后色素沉着

正确答案：B

10、在治疗视网膜中央动脉阻塞时，吸入氧气的浓度为()

- A、80%氧气+20%二氧化碳
- B、100%氧气
- C、90%氧气+10%二氧化碳
- D、95%氧气+5%二氧化碳
- E、85%氧气+15%二氧化碳

正确答案：D

11、急性泪囊炎的临床表现()

- A、可形成脓肿
- B、泪囊区皮肤红肿、压痛
- C、以上全是
- D、疼痛可向颈部放射
- E、结膜充血且有大量分泌物

正确答案：C

12、患者男,64岁,左眼白内障手术后1年发生后囊膜混浊(PCO),以下哪项与PCO发生无关()

- A、术后虹膜睫状体炎症反应强
- B、人工晶体一半位于囊袋内,一半位于睫状沟
- C、人工晶体材料为硅凝胶
- D、白内障核过硬
- E、术中皮质残留

正确答案：D

13、某女,23岁,右眼视力下降一个月。无早产、吸氧史,其父亲因双眼视网膜脱离已经失明多年。查体:视力右0.1,左0.5,矫正不提高,视网膜周边部纤维血管增生伴牵拉性视网膜脱离。最可能的诊断为()

- A、缺血性视神经病变
- B、家族性渗出性玻璃体视网膜病变
- C、中心性渗出性视网膜脉络膜病变
- D、早产儿视网膜病变

E、孔源性视网膜脱离

正确答案：B

14、睁眼时上睑遮盖角膜上方不超过()

A、2.5mm

B、2mm

C、1mm

D、3mm

E、1.5mm

正确答案：B

15、通常中等量的玻璃体积血可在多长时间自行吸收()

A、1年以上

B、3~6个月

C、9~12个月

D、2年

E、6~9个月

正确答案：B

16、早期诊断真菌性角膜炎的方法()

A、角膜刮片染色

B、免疫荧光染色

C、PAS染色

D、角膜组织活检

E、B超

正确答案：A

17、急性闭角型青光眼发作期的治疗原则是()

A、药物降眼压和手术治疗同时进行

B、立即抗青光眼手术治疗

C、药物降低眼压后再手术治疗

D、出现视乳头病理性凹陷后手术治疗

E、只用药物治疗

正确答案：C

18、上睑下垂晨轻夜重，且在注射新斯的明后明显减轻，最可能的诊断为()

A、动眼神经麻痹

B、提上睑肌损伤

- C、副交感神经损害
- D、交感神经损害
- E、重症肌无力

正确答案：E

19、葡萄膜炎可引起下列哪种类型的白内障()

- A、糖尿病性白内障.
- B、半乳糖性白内障
- C、手足搐搦性白内
- D、并发性白内障
- E、中毒性白内障

正确答案：D

20、女性，32岁，双眼上睑下垂1个月，半月前出现复视，以上症状晨起较轻，劳累或傍晚加重，神经系统检查未能发现异常。可能性最大的诊断是()

- A、先天性上睑下垂
- B、重症肌无力
- C、交感神经麻痹
- D、动眼神经麻痹
- E、内眦赘皮

正确答案：B

21、患者女性，65岁。明确感到眼前突然出现漂浮物，视力无明显下降，无全身病史。可能的原因是()

- A、老年性黄斑变性
- B、特发性黄斑裂孔
- C、星样玻璃体病变
- D、视网膜静脉阻塞
- E、玻璃体后脱离

正确答案：E

22、假性近视是由于()

- A、眼轴较长
- B、睫状肌松弛
- C、调节不足
- D、晶状体密度高
- E、睫状肌痉挛

正确答案：E

23、患儿，1岁半，慢性腹泻3个月，身体消瘦呈营养不良，精神萎靡，皮肤干燥，双眼结膜污暗，角膜基质软化溶解。你认为由于缺乏哪种维生素()

- A、维生素B
- B、维生素E
- C、维生素D
- D、维生素A
- E、维生素C

正确答案：B

24、患者女，60岁，主因右眼流泪且伴有视物不清15年，近半年加重。查：视力：右眼手动，右眼泪囊区挤压可见黏脓性分泌物。右眼晶体白色混浊，眼底窥不进。对于本病例诊断()

- A、右眼老年性白内障，右眼慢性泪囊炎
- B、干眼症
- C、右眼细菌性结膜炎
- D、右眼老年性白内障
- E、右眼慢性泪囊炎

正确答案：A

25、蚕蚀性角膜溃疡的治疗()

- A、以上均对
- B、2%半胱氨酸溶液点眼
- C、全身应用免疫抑制剂
- D、局部应用皮质类固醇药物
- E、可行带板层巩膜环的板层角膜移植术

正确答案：A

26、正常视网膜的动、静脉管径的比例是()

- A、1:2
- B、5:6
- C、3:4
- D、4:5
- E、2:3

正确答案：E

27、某患者左眼被一次性注射针头扎伤，检查发现角膜有水肿，前房积

脓，玻璃体混浊呈黄色反光，下列诊断最可能的是()

- A、玻璃体积血
- B、角膜溃疡
- C、视网膜脱离
- D、眼内炎
- E、虹膜睫状体炎

正确答案：D

28、滴眼药水正确的部位为()

- A、上穹窿部
- B、下穹窿部
- C、内眦部
- D、外眦部
- E、角膜

正确答案：B

29、慢性泪囊炎常见于()

- A、婴幼儿
- B、中老年男性
- C、中老年女性
- D、青少年
- E、青壮年男性

正确答案：C

30、视网膜静脉阻塞的病因不包括()

- A、视网膜动脉硬化
- B、栓子脱落阻塞
- C、高血压
- D、颈动脉供血不足
- E、静脉血流淤滞

正确答案：B

31、与近视的临床表现无关的是()

- A、外隐斜或外斜视
- B、视疲
- C、近视力降低
- D、飞蚊症
- E、远视力降低

正确答案：C

32、属于白内障囊外摘除术的禁忌症的是()

- A、有视网膜脱离病史者
- B、玻璃体情况不明的并发性白内障
- C、35 岁以上已有硬核的白内障
- D、晶体脱位或半脱位
- E、虹膜广泛后粘连的并发性白内障

正确答案：D

33、关于 Behcet 病，不正确的是()

- A、可伴有关节炎，神经系统损害等
- B、眼部可出现全葡萄膜炎改变
- C、可出现多发性、反复发作的口腔溃疡
- D、有多形性皮肤损害
- E、疼痛性生殖器溃疡，愈合后无瘢痕

正确答案：E

34、以下关于交感性眼炎哪些说法是错误的()

- A、属于自身免疫性疾病，主要与体液免疫有关
- B、外伤后其发生率为 0.2%，内眼手术后约 0.07%
- C、潜伏期为 2 周~2 个月
- D、周边部眼底可出现 Dalen-Fuchs 结节
- E、晚期眼底呈晚霞状

正确答案：A

35、下列哪项可导致结膜干燥综合征()

- A、自身免疫性因素
- B、慢性结膜炎
- C、长期的屈光不正未经矫正
- D、沙眼衣原体感染
- E、维生素 A 缺乏

正确答案：A

36、球结膜下出血说法正确的是()

- A、早期应行冷敷以促进止血
- B、早期应行热敷以促进出血吸收
- C、一般都与全身性疾病有关
- D、通常可找到确切的病因

E、一般 3~6 天可自行吸收

正确答案：A

37、患者女性，60 岁，与邻居吵架后出现右眼痛、头痛、视力减退，并恶心、呕吐。检查：右眼视力眼前手动，结膜混合性充血，角膜上皮水肿，角膜后色素沉着，前房极浅，瞳孔中度大，眼后节看不清，眼压 65mmHg 上述疾病最可能的诊断为()

A、急性闭角型青光眼

B、继发性青光眼

C、急性结膜炎

D、虹膜睫状体炎

E、开角型青光眼

正确答案：A

38、哪项是沙眼常见合并症()

A、上睑下垂

B、慢性泪囊炎

C、角膜混浊

D、睑内翻及倒睫

E、睑球粘连

正确答案：D

39、弱视治疗越早效果越好，一般应尽量在几岁内治疗()

A、12 岁

B、14 岁

C、3 岁

D、10 岁

E、6 岁

正确答案：E

40、某男，58 岁，右眼视力下降 1 个月。右眼视力眼前指数，左眼视力 1.0。眼底：玻璃体轻度混浊，视乳头边界不清，轻度隆起，静脉迂曲扩张，呈腊肠样，视网膜大范围片状出血，近视盘的视网膜可见多量片状黄白色渗出，黄斑中心凹亦可见出血渗出。此例病人的诊断应首先考虑为()

A、视网膜中央动脉阻塞

B、糖尿病性视网膜病变

C、中心性渗出性脉络膜视网膜病变

D、视网膜中央静脉阻塞

E、高血压视网膜病变

正确答案：D

41、下列关于暗适应检查不正确的是()

A、属主观检查法

B、表明视锥细胞功能状态

C、可对夜盲进行量化评价

D、检查方法有对比法和暗适应计

E、暗适应过程即视紫红质复原过程

正确答案：B

42、沙眼是由什么微生物引起的一种慢性传染性结膜角膜炎()

A、病毒

B、衣原体

C、细菌

D、支原体

E、立克次体

正确答案：B

43、手术时切口在睑皮肤面，与睑缘平行的疾病是()

A、外睑腺

B、溃疡性睑缘炎

C、内睑腺炎

D、睑板腺囊肿

E、鳞屑性睑缘炎

正确答案：A

44、泡性结膜炎最常见的致病微生物是()

A、结核杆菌

B、表皮葡萄球菌

C、沙眼衣原体 L 型

D、白色念珠菌

E、球孢子菌

正确答案：A

45、男，46岁。发现右眼睑皮下硬结半月余，自觉无明显不适。检查：右眼视力正常，眼睑皮肤稍隆起，眼睑皮下可触及一黄豆大圆形肿块，边界清楚，与皮肤无粘连，无明显压痛，局部睑结膜暗红色充血，余无

异常发现。可能性最大的诊断为()

- A、内睑腺炎
- B、鳞屑性睑缘炎
- C、眦部睑缘炎
- D、睑板腺囊肿
- E、外睑腺炎

正确答案：D

46、不符合睑板腺囊肿临床表现的是()

- A、自行破溃后可在睑结膜面形成蘑菇样肉芽肿块
- B、自觉无疼痛不适或仅有沉重感，严重者可引起上睑下垂
- C、眼睑皮下圆形肿块，大小不一，边界清楚，与皮肤粘连，有压痛
- D、当有继发感染时，即形成急性内睑腺炎
- E、多见于青少年或中壮年，病程缓慢

正确答案：C

47、一般认为角膜缘的后界止于()

- A、巩膜脊
- B、后弹力层止端
- C、基质层止端
- D、前弹力层止端
- E、内皮细胞层止端

正确答案：B

48、患者男性，70岁，左眼突然胀痛，视力下降明显，伴同侧头痛、恶心、呕吐。检查：左眼角膜水肿，虹膜前移，前房浅，晶状体混浊，体积增大，眼压高。诊断为白内障引起的青光眼大发作，目前患者的白内障处于哪一期()

- A、膨胀期
- B、成熟期
- C、初发期
- D、过熟期
- E、以上均不是

正确答案：A

49、某女，18岁，双眼视物不清伴眼球转动时疼痛一周，眼部检查：视力：0.06/0.08，不能矫正，双眼角膜透明，前房深浅正常，瞳孔大小正常，对光反应稍迟钝，晶体无明显混浊，眼底可见视乳头边界清，颜色

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087064003150006042>