

# 药物制剂工考证■药理学试题

## 一、单选题

1 . 药物作用的两重性是指（） [单选题] \*

A.防治作用和副作用

B.兴奋作用和抑制作用

C.防治作用和毒性反应

D.防治作用和不良反应 ✓

2 . 影响药物吸收的因素不包括（） [单选题] \*

A.给药途径

B.药物理化性质

C.药物剂型

D.药物与血浆蛋白的结合力 ✓

3 . 治疗过敏性休克首选（） [单选题] \*

A.肾上腺素 ✓

8 . 去甲肾上腺素

C.多巴胺

D.异丙肾上腺素

4 . 为了延长局麻药的作用时间，减少其吸收中毒，常在局麻药中加入适量的（） [单选题] \*

A. 肾上腺素 ✓

C.异丙肾上腺素

D. 去甲肾上腺素

5 . 既有局麻作用又有抗心律失常作用的药物是 ( ) [单选题] \*

A. 普鲁卡因

8 . 利多卡因,

C.丁卡因

D. 布比卡因

6 . 苯妥英钠对下列何病无效 ( ) [单选题] \*

A.癫痫小发作 ✓

B.癫痫大发作

C.精神运动性发作

D.三叉神经痛

7 . 患儿 5 岁，近来经常在玩耍中突然停顿、两眼直视、面无表情，几秒钟即止，每天发作十几次，应试用下述哪种药物治疗 ( ) [单选题] \*

A. 苯妥英钠

8 . 苯巴比妥

C.乙琥胺 ✓

D.丙戊酸钠

9 . 吗啡不用于慢性钝痛，主要原因是 ( ) [单选题] \*

A. 治疗量即抑制呼吸

B.对钝痛效果差

- C.易成瘾 ✓
- D 易致体位性低血压

10 吗啡中毒致死的原因是（） [单选题] \*

- A. 昏迷
- B.针尖样瞳孔
- C.血压下降
- D.呼吸麻痹 ✓

11 .吗啡中毒最典型的特征是（） [单选题] \*

- A.呼吸麻痹
- B.血压下降
- C.瞳孔度缩小 ✓
- D.昏迷

12 .下列哪项不属于吗啡禁忌症（） [单选题] \*

- A.颅脑外伤
- B.哺乳妇骨折
- C.心源性心脏病 ✓
- D.支气管哮喘

13 .下列哪项不是阿司匹林的作用（） [单选题] \*

- A 抗炎
- B.解热
- C.镇痛
- D 消菌 ✓

A.大剂量突击疗法

B.大剂量长疗程

C.小剂量长疗程 ✓

D.小剂量短疗程

14. 下列哪种药物几乎无抗炎作用（） [单选题] \*

A.阿司匹林

B.吲哚美辛

C.炎痛昔康

D.对乙酰氨基酚 ✓

15 . 与强心苷合用时，可引起低血钾，增加心脏毒性的药物是（） [单选题] \*

A.螺内酯

16 双氢克尿噻。

C.氨苯蝶啶

D.甘露醇

17 . 高血压合并支气管哮喘者应避免选用（） [单选题] \*

A.普萘洛尔 ✓

B.可乐定

C.甲基多巴

D.卡托普利

18 . 抗室性心律失常的首选药是（） [单选题] \*

A.普萘洛尔

B.普鲁卡因胺

C.利多卡因 ✓

D.奎尼丁

19 .阵发性室上性心动过速药物治疗首选（） [单选题] \*

A.维拉帕米 ✓

B.利多卡因

C.苯妥英钠

D.奎尼丁

20 .迅速缓解各类心绞痛发作的是（） [单选题] \*

A.普萘洛尔

B.硝酸甘油 ✓

C.硝苯地平

D.维拉帕米

21 .铁剂常用于治疗（） [单选题] \*

A.恶性贫血

B.小细胞低色素性贫血 ✓

C.再生障碍性贫血

D.巨幼红细胞性贫血

22 .服用铁剂的注意事项哪项是错误的（） [单选题] \*

A.同服维生素 C

B.饭后服用

C.用茶水送服 ✓

D.与稀盐酸同服

23 .下列何药为质子泵抑制药 ( ) [单选题] \*

A.法莫替丁

B.哌仑西平

C.奥美拉 D $\frac{1}{8}$  ✓

D. 枸梅酸铉, 钾

24 .胃蛋白酶合剂主要用于 ( ) [单选题] \*

A.消化不良 ✓

B.胆囊炎

C.胃溃疡

D.便秘

25 .下列配伍不合理的是 ( ) [单选题] \*

A.乳酶生+四环素 ✓

B.氢氧化铝+三硅酸镁

C.胃蛋白酶+稀盐酸

D.胰酶+碳酸氢钠

26 .原因不明的哮喘急性发作时, 安全有效的平喘药是 ( ) [单选题] \*

A 肾上腺素

B.异丙肾上腺素

C.氨茶碱 ✓

D.沙丁胺醇

27 .糖皮质激素不易引起那种不良反应（） [单选题] \*

A.水肿

B.高血压

C.血糖升高

D.息] 血钾 ✓

28 .糖皮质激素隔日疗法的给药时间最好在隔日（） [单选题] \*

A.中午 12 点

B.上午 8 点 ✓

C.下午 8 点

D.下午 5 点

29 .下列何种情况不应该做青霉素皮肤过敏试验（） [单选题] \*

A.初次注射青霉素

B.停用青霉素 24 小时以上

C.有其它过敏史者

D.有青霉素过敏史者 ✓

29 .胰岛素的常用给药途径是（） [单选题] \*

A.口服

B.皮下注射 ✓

C.肌肉注射

D.舌下含化

30. 对胰腺功能完全丧失者无效的药物是（） [单选题] \*

A. 普通胰岛素

B. 格列齐特 ✓

C. 珠蛋白锌胰岛素

D. 苯乙福明

31 . 预防和治疗厌氧菌感染的是（） [单选题] \*

A. 味喃啉酮

B. 吡哌酸

C. 甲硝 1½ ✓

D. TMP

32 . 可防治异烟阴引起的周围神经炎的是（） [单选题] \*

A. 维生素 B2

B 维生素 B6 ✓

C. 维生素 B1

D. 维生素 E

33 . 控制疟疾症状的首选药是（） [单选题] \*

A. 奎宁

34 氯喹 ✓

C 伯氨喹

D. 乙胺嘴陡

34 . 主要用于控制复发和传播的抗疟药是（） [单选题] \*



A.奎宁

B.氯喹

C.伯氨喹 ✓

D.乙胺嘧啶

35 .主要用于病因性预防的抗疟药是（） [单选题] \*

A.奎宁

B.氯喹

C.伯氨喹

D.乙胺嘧啶 ✓

## 二、多选题

1 .药物的不良反应包括（） [多选题] \*

A.过敏反应 ✓

B.副作用 ✓

C.致畸作用 ✓

D.毒性反应 ✓

2. 可避开首关效应的给药途径是（） [多选题] \*

A.肌注 ✓

B.静注 ✓

C.口服

D.舌下含化 ✓

3.影响药物作用机体方面的因素包括（） [多选题] \*

A.年龄，体重 ✓

B.性别 ✓

C.个体差异 ✓

D.病理状态 ✓

4.配伍用药的目的包括（） [多选题] \*

A.提高疗效 ✓

B.增强药物的安全性

C.减少不良反应 ✓

D.延缓病原体耐药性的产生 ✓

5.新斯的明可用于治疗（） [多选题] \*

A.重症肌无力 ✓

B.术后肠胀气 ✓

C.青光眼

D.阵发性室上性心动过速 ✓

6.普萘洛尔在临床上可用于治疗（） [多选题] \*

A.心律失常 ✓

B.心绞痛 ✓

C.高血压 ✓

D.心功能不全

7.地西洋的药理作用不包括（） [多选题] \*

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/088103102041006051>