

医院药学-金华职业技术学院-中国大学MOOC慕课答案

常见疾病合理用药指导单元作业

模块一项目一至项目五单元测验

1、单选题：以下治疗消化不良的药中属于胃动力药的是
选项：

- A、胃蛋白酶
- B、双歧杆菌三联活菌胶囊
- C、地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- D、多潘立酮片
- E、复方乳酸菌胶囊

参考：【**多潘立酮片**】

2、单选题：以下治疗消化不良的药中属于酶类制剂的是
选项：

- A、胃蛋白酶
- B、双歧杆菌三联活菌胶囊
- C、地衣芽孢杆菌活菌胶囊
- D、多潘立酮片
- E、复方乳酸菌胶囊

参考：【**胃蛋白酶**】

3、单选题：多潘立酮片的适宜服用时间是
选项：

- A、饭前15-30分钟
- B、饭前30-60分钟
- C、饭后15-30分钟
- D、饭后30-60分钟
- E、睡前

参考：【**饭前15-30分钟**】

4、单选题：以下哪个药物能抑制、吸附活菌制剂
选项：

- A、阿司匹林
- B、布洛芬
- C、活性炭
- D、贝诺酯
- E、多潘立酮

参考：【**活性炭**】

5、单选题：以下哪个是属于治疗便秘的外用药物
选项：

- A、便通胶囊
- B、小麦纤维素颗粒

- C、开塞露
- D、大黄
- E、硫酸镁

参考：【开塞露】

6、单选题：以下对治疗便秘的药物用药指导错误的是
选项：

- A、开塞露的作用是润滑并刺激肠壁，起到治标作用
- B、小麦纤维素颗粒使用时只能用水送服，不宜用牛奶、果汁等送服
- C、将开塞露的容器顶端刺破或剪开后，要涂以少许油脂再使用
- D、小麦纤维素颗粒能增加纤维素含量，起到治本作用
- E、开塞露如果经常使用会引起习惯性便秘及依赖性

参考：【小麦纤维素颗粒使用时只能用水送服，不宜用牛奶、果汁等送服】

7、单选题：以下哪个不属于治疗痛经的药物
选项：

- A、布洛芬缓释片
- B、双氯芬酸钠缓释片
- C、痛经宝颗粒
- D、谷维素片
- E、硫酸镁注射液

参考：【硫酸镁注射液】

8、单选题：以下对治疗痛经的药物用药指导错误的是
选项：

- A、非甾体抗炎药不可随意合用
- B、非甾体抗炎药有胃肠道副作用
- C、非甾体抗炎药最好在餐中或餐后服用
- D、缓释片可以掰开或溶解后服用
- E、痛经宝颗粒应强调服用持续时间与周期

参考：【缓释片可以掰开或溶解后服用】

9、单选题：芬必得是以下哪个药物的商品名
选项：

- A、布洛芬缓释片
- B、双氯芬酸钠缓释片
- C、痛经宝颗粒
- D、阿司匹林缓释片
- E、对乙酰氨基酚片

参考：【布洛芬缓释片】

10、单选题：泰诺含扑尔敏，不适合以下哪个职业人群服用
选项：

- A、交警
- B、营业员
- C、司机
- D、保安

E、护士

参考：【司机】

11、单选题：以下对白加黑的用药指导错误的是

选项：

A、白天吃白片，晚上吃黑片

B、可以治疗和减轻感冒引起的发热、头痛、喷嚏、流涕、鼻塞等症状

C、购买时需要登记身份证

D、司机不能使用

E、不能同时服用其它有相同成分的感冒药

参考：【司机不能使用】

12、单选题：以下哪个感冒药购买时需要登记身份证

选项：

A、感冒清热胶囊

B、连花清瘟胶囊

C、芙朴感冒颗粒

D、复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊

E、氢溴酸右美沙芬胶囊

参考：【复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊】

13、单选题：以下不是支气管哮喘的常见症状的是

选项：

A、喘息

B、气急

C、胸闷

D、咳嗽

E、咽痛

参考：【咽痛】

14、单选题：以下治疗支气管哮喘的药中属于 β_2 受体激动剂的是

选项：

A、布地奈德

B、异丙托溴铵

C、沙丁胺醇

D、氟替卡松

E、孟鲁司特

参考：【沙丁胺醇】

15、单选题：对吸入气雾剂和粉吸入剂的使用描述错误的是

选项：

A、喷口放入口内时，要迅速地完成吸气

B、吸入药物后要尽可能长时间屏气

C、吸药后用清水漱口

D、吸气前要先轻轻地呼气

E、雾剂的贮存应注意避光、避热

参考：【喷口放入口内时，要迅速地完成吸气】

模块一项目六至项目十单元测验

1、单选题：以下治疗消化性溃疡的药中属于质子泵抑制剂的是
选项：

- A、雷尼替丁
- B、奥美拉唑
- C、法莫替丁
- D、枸橼酸铋
- E、克拉霉素

参考：【奥美拉唑】

2、单选题：以下治疗消化性溃疡的药中属于胃黏膜保护剂的是
选项：

- A、雷尼替丁
- B、奥美拉唑
- C、法莫替丁
- D、枸橼酸铋
- E、克拉霉素

参考：【枸橼酸铋】

3、单选题：以下治疗消化性溃疡的药中属于H₂受体拮抗剂的是
选项：

- A、甲硝唑
- B、奥美拉唑
- C、法莫替丁
- D、枸橼酸铋
- E、克拉霉素

参考：【法莫替丁】

4、单选题：以下治疗消化性溃疡的药物服用时间错误的是
选项：

- A、枸橼酸铋钾宜在餐后服
- B、埃索美拉唑需饭前服用
- C、克拉霉素对胃有刺激性，宜在饭后服用
- D、阿莫西林宜在饭后服用
- E、消化性溃疡要坚持疗程服药

参考：【枸橼酸铋钾宜在餐后服】

5、单选题：以下治疗急性肠胃炎的药中属于止泻药的是
选项：

- A、洛哌丁胺
- B、双歧三联活菌
- C、复方嗜酸乳杆菌
- D、盐酸小檗碱
- E、诺氟沙星

参考：【洛哌丁胺】

6、单选题：以下治疗急性肠胃炎的药中属于抗菌药的是
选项：

- A、洛哌丁胺
- B、双歧三联活菌
- C、复方嗜酸乳杆菌
- D、盐酸小檗碱
- E、蒙脱石散

参考：【盐酸小檗碱】

7、单选题：下列关于急性肠胃炎用药的注意事项错误的是
选项：

- A、在止泻的同时，应实施对因治疗
- B、应及时补充水和电解质
- C、蒙脱石散对消化道粘膜具有很强的覆盖保护能力
- D、服用小檗碱时不能同服铁剂或鞣酸蛋白
- E、急性胃肠炎不论是否有感染，都要选用抗菌药进行治疗

参考：【急性胃肠炎不论是否有感染，都要选用抗菌药进行治疗】

8、单选题：以下治疗尿路感染的药中属于喹诺酮类的是
选项：

- A、复方磺胺甲恶唑
- B、氧氟沙星
- C、阿莫西林
- D、头孢呋辛
- E、头孢氨苄

参考：【氧氟沙星】

9、单选题：以下不是治疗尿路感染的常用抗菌药的是
选项：

- A、磺胺类
- B、喹诺酮类
- C、青霉素类
- D、头孢菌素类
- E、大环内酯类

参考：【大环内酯类】

10、单选题：痛风是以下哪种物质升高引起的
选项：

- A、肌酐
- B、尿酸
- C、尿蛋白
- D、尿胆红素
- E、葡萄糖

参考：【尿酸】

11、单选题：以下属于急性痛风治疗药物的是
选项：

- A、秋水仙碱
- B、溴马隆
- C、丙磺舒
- D、盐酸小檗碱
- E、别嘌醇

参考：【秋水仙碱】

12、单选题：以下属于降尿酸药物的是
选项：

- A、秋水仙碱
- B、吲哚美辛
- C、双氯芬酸钠
- D、盐酸小檗碱
- E、别嘌醇

参考：【别嘌醇】

13、单选题：以下为痛风最常见的诱因是
选项：

- A、饮酒
- B、关节局部劳损
- C、高嘌呤饮食
- D、精神紧张
- E、过度运动

参考：【高嘌呤饮食】

14、单选题：以下不属于失眠的常见症状的是
选项：

- A、入睡困难
- B、睡眠深度不够
- C、早醒
- D、睡眠时间不足
- E、头疼

参考：【头疼】

15、单选题：直接作用于中枢神经系统，使之兴奋或抑制，连续使用可以产生依赖性的药品是指
选项：

- A、精神药品
- B、麻醉药品
- C、毒性药品
- D、放射性药品
- E、镇痛药

参考：【精神药品】

模块一项目十一至项目十四单元测验

1、单选题：以下治疗高血压的药物中属于利尿剂的是
选项：

- A、氢氯噻嗪
- B、美托洛尔
- C、氨氯地平
- D、卡托普利
- E、氯沙坦

参考：【**氢氯噻嗪**】

2、单选题：以下治疗高血压的药物中属于血管紧张素转换酶抑制剂的是
选项：

- A、氢氯噻嗪
- B、美托洛尔
- C、氨氯地平
- D、卡托普利
- E、氯沙坦

参考：【**卡托普利**】

3、单选题：以下治疗高血压的药物中属于血管紧张素II受体拮抗剂的是
选项：

- A、氢氯噻嗪
- B、美托洛尔
- C、氨氯地平
- D、氨氯地平
- E、氯沙坦

参考：【**氯沙坦**】

4、单选题：服用以下哪个药物血压波动性会稍大
选项：

- A、硝苯地平缓释片
- B、美托洛尔缓释片
- C、硝苯地平控释片
- D、硝苯地平片
- E、非洛平缓释片

参考：【**硝苯地平片**】

5、单选题：以下不属于高血压发生的危险因素的是
选项：

- A、高盐低钾饮食
- B、吸烟
- C、超重/肥胖
- D、接触过敏原
- E、缺少体育锻炼

参考：【**接触过敏原**】

6、单选题：以下治疗高脂血症的药物中属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是
选项：

- A、辛伐他汀
- B、非诺贝特

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/08812305511006030>