

# 2024年公共卫生与预防医学题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、属半污染区的区域是【单选题】——

- A. 治疗室. 值班室
- B. 走廊及病区化验室
- C. 配餐室与更衣室
- D. 浴室. 洗涤间 病室及厕所

【答案】： B

2、 I类. II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ , 未检出致病菌

【答案】： D

3、 无菌盘铺好后有效期不超过多长时间【单选题】——

- A. 2h
- B. 12h
- C. 16h
- D. 4h 8h

【答案】： D

4、 妇产科检查室【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.

空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$   
D. —, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气  
 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ? 下列各医  
疗区的细菌学指标是

【答案】： C

5、为节省时间, 护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

- A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- B. 车下层放盆, 内盛消毒液
- C. 按床号依次给患者服药
- D. 全病区发药完毕, 按常规消毒药杯 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】： C

6、根据我国卫生标准回答以下问题: 接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu}/\text{g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ , 致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu}/\text{g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ , 致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu}/\text{mL}$ , 致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu}/\text{mL}$ , 致病性微生物不得检出

【答案】： C

7、肾移植患者应采取【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 严密隔离
- D. 消化道隔离 接触隔离

【答案】： A

8、进行医院感染管理的策略研究,为卫生部提供咨询意见【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

9、SARS 传播最重要的途径是【单选题】——

- A. 接触传播
- B. 飞沫传播
- C. 气溶胶传播
- D. 血液-体液传播 空气传播

【答案】：B

10、医院必须对消毒、灭菌效果定期进行监测,灭菌合格率必须达到【单选题】——

- A. 0.8
- B. 1
- C. 0.85
- D. 0.95 0.9

【答案】：B

11、取无菌溶液时,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 倒溶液时可不顾及瓶签的朝向
- B. 用前核对瓶签
- C. 保持瓶盖内侧面无菌
- D. 用后立即盖上 检查药液是否有沉淀

【答案】：A

12、下排气式灭菌器灭菌包体积不应大于【单选题】——

- A. 30cm×30cm×20cm
- B.

30cm×30cm×40cm

C. 30cm×40cm×30cm

D. 30cm×30cm×25cm 20cm×30cm×40cm

【答案】：D

13、腹部手术铺单原则【单选题】——

A. 先上后下,先远后近

B. 以上都不是

C. 先上后下,先近后远

D. 先下后上,先远后近 先下后上,先近后远

【答案】：D

14、手术部位感染的常见诱因【单选题】——

A. 留置导尿管

B. 气管切开

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】：D

15、免疫功能低下病人的医院内感染预防,下列哪项错误【单选题】——

A. 保护皮肤黏膜的完整性

B. 广谱抗生素肠道预防感染

C. 保护性隔离

D. 治疗局部感染病灶 疫苗注射

【答案】：B

16、下列各项中错误的是【单选题】——

A. 医护人员在采血、输血前后要洗手

B. 每批一次性注射器均应注明出厂日期、灭菌日期和有效期

C. 使用过的一次性注射器、输血器材应消毒毁灭或焚烧

D. 实验工作人员不能用口吸管,处理污物时要戴手套 艾滋病的

潜伏期内无传染性

**【答案】**：E

17、属于低水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 过氧乙酸
- C. 碘伏
- D. 氯己定 异丙醇

【答案】：D

18、治疗室的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 注射、治疗时,应辅无菌盘,抽出的药液存放不能超过2小时
- B. 治疗室中开启的各种溶媒不得超过24小时
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需要4小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换及灭菌1~2次 经消毒后的棉球、纱布包,一经打开,保存时间不得超过48小时

【答案】：E

19、手术间通常保持的湿度【单选题】——

- A. 40~60%
- B. 30~50%
- C. 30~40%
- D. 50~60% 40~50%

【答案】：D

20、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药【单选题】——

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿奇霉素
- D. 磷霉素 环丙沙星

【答案】：A

21、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B.

省医院感染管理专家咨询委员会

- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

22、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

23、手术区皮肤消毒的正确方法是【单选题】——

- A. 消毒范围超过手术切口 15cm
- B. 会阴部用碘酊消毒
- C. 消毒范围与备皮范围一致
- D. 用 2.5~3%的碘酊消毒 3 遍 用 95%乙醇脱碘

【答案】：A

24、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开 2 个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

- A. 将原来铺好的重新消毒
- B. 另取一个未经消毒的
- C. 使用昨天使用过的
- D. 使用原来铺好的 使用未使用但经消毒的

【答案】：D

25、下列消毒剂中属高水平消毒剂的是【单选题】——

- A. 戊二醛
- B. 聚维酮(络合碘)
- C. 苯扎溴铵(新洁尔灭)

D. 乙醇 碘酊

【答案】：A



26、医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括【单选题】——

- A. 依据有关政策法规,制定全院控制医院感染规划、管理制度,并组织实施
- B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见
- C. 建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项;遇有紧急问题随时召开
- D. 定期总结、分析细菌学检测监测资料,向有关部门反馈,并向全院公布 对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定,对其工作进行考评

【答案】：D

27、B-D 试验只适用于【单选题】——

- A. 下排气压力蒸汽灭菌器检测
- B. 预真空压力蒸汽灭菌器监测
- C. 流动蒸汽灭菌器的监测
- D. 环氧乙烷灭菌器的监测 化学消毒液浸泡消毒时

【答案】：B

28、密闭式潴留导尿系统引起感染的危险因素中,哪一项最常见【单选题】——

- A. 潴留导尿持续1周
- B. 集尿袋位处膀胱水平之上
- C. 抗生素膀胱冲洗
- D. 集尿管扭结或阻塞 密闭系统的接头反复打开

【答案】：E

29、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C.

细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ , 致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ , 致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ , 致病性微生物不得检出

【答案】： B

30、传染病房两病床之间的距离应【单选题】——

- A.  $\geq 2.0\text{m}$
- B.  $\geq 1.5\text{m}$
- C.  $\geq 1.2\text{m}$
- D.  $\geq 1.1\text{m}$        $\geq 1.0\text{m}$

【答案】： D

31、病室内住有百日咳病人, 已知病室长 6m、宽 3.2m、高 3m, 用纯乳酸进行空气消毒, 乳酸的用量是【单选题】——

- A. 7ml
- B. 6ml
- C. 12ml
- D. 15ml      5ml

【答案】： A

32、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的, 最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200\text{cuf/mL}$ , 不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5\text{cuf/mL}$ , 不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10\text{cuf/mL}$ , 允许检出金黄色葡萄球菌
- E. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100\text{cuf/mL}$ , 不得检出致病性微生物

【答案】： E

33、取无菌纱布的正确方法是【单选题】——

- A. 戴手套拿取纱布
- B. 以上都不是
- C.

用灭菌换药镊子夹取纱布

- D. 用无菌持物钳夹取纱布          用消毒的手指拿取纱布

【答案】：D

34、供应室无菌区【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. 空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ? 下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

35、下列情况属于医院感染的是【单选题】——

A. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎性反应

C. 婴儿经胎盘获得的感染, 如 CMV, 弓形虫发生在出生后 48 小时以内者

D. 住院中由于治疗措施而激活的感染          由于输注碳酸氢钠溶液(苏打)外渗引起的局部炎性反应

【答案】：D

36、新生儿重症监护室对每张床位占地面积的要求是不少于一般新生儿床位的【单选题】——

A. 1 倍

B. 2 倍

C. 3 倍

D. 4 倍          5 倍

【答案】：B

37、手术部位感染的常见诱因是【单选题】——

A. 留置导尿管

B.

气管切开

- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

38、发生医院内尿路感染最常见的诱因是【单选题】——

- A. 长期卧床
- B. 留置导尿管
- C. 膀胱冲洗
- D. 膀胱内注药 膀胱镜检查

【答案】：B

39、和破损皮肤、黏膜相接触，而不进入无菌的组织内的器材【单选题】——

- A. 应用物理灭菌方法
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法
- D. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂 应用灭菌剂或高效消毒剂

【答案】：E

40、低效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

41、下列哪项不是医院感染的特点【单选题】——

- A. 易感人群抵抗力低，病死率高
- B. 医院中流行的菌株大多为多重耐药性
- C. 医院中病原体来源广泛
- D. 在医院感染中人群的病死率很低

在医院内一旦发生感染很容易播散

【答案】：D

42、根据我国卫生标准回答以下问题：根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求，对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

43、穿过皮肤或黏膜进入无菌组织或器官内部的器材应采用的消毒方式【单选题】——

- A. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中、低效消毒剂
- B. 杀灭细菌繁殖体的消毒剂
- C. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- D. 灭菌剂或物理、化学灭菌方法 应用物理灭菌方法

【答案】：D

44、细菌耐药最常见的机制是【单选题】——

- A. 细菌改变代谢途径
- B. 产生抗生素灭活酶
- C. 抗菌药物作用靶位改变
- D. 细菌细胞膜渗透性改变使抗菌药物不易进入细菌细胞 细菌细胞将抗菌药物排除细菌

【答案】：B

45、铺好的无菌盘，在无污染情况下的有效时间是【单选题】——

- A. 6h
- B. 24h
- C.

4h

D. 12h 2h

【答案】：C

46、医源性感染【单选题】——

- A. 病原体来源于病人本身的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人 病人在家中已发生的感染

【答案】：B

47、SARS 最主要的传染源是【单选题】——

- A. SARS 患者
- B. SARS 病毒携带者
- C. SARS 感染的动物
- D. 携带 SARS 的动物 污染的环境

【答案】：A

48、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

49、同一病房内住有伤寒与痢疾患者,3 周后伤寒患者的大便培养出痢疾杆菌,其属【单选题】——

- A. 病人在家中已发生的感染
- B. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病
- C. 病原体来源于病人本身的感染
- D. 病人之间引起的交叉感染 同时患伤寒和痢疾

【答案】：D

50、高效消毒剂【单选题】——

- A. 0.5%碘伏
- B. 2%戊二醛
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：B

51、支气管镜采用2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

- A. 120min
- B. 60min
- C. 30min
- D. 20min 10min

【答案】：D

52、根据我国卫生标准回答：使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出  
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】：D

53、根据我国卫生标准回答以下问题：对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B



54、根据我国下列卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

55、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染
- D. 表皮传染病 呼吸道传染病

【答案】：E

56、每日 I 级手术间开始前,提前开启净化空调系统时间【单选题】——

- A. 10 分钟
- B. 30 分钟
- C. 15 分钟
- D. 20 分钟 40 分钟

【答案】：B

57、伤寒病人应采取【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 保护性隔离
- D. 消化道隔离 呼吸道隔离

【答案】：D

58、婴儿室【单选题】——

- A.

$\leq 10 \leq 5 \leq 5$

B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$

C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$

D.  $= - \leq 15 \leq 15$

【答案】： B

59、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

A. 住院患者

B. 工作人员

C. 陪护人员

D. 探视人员 门诊患者

【答案】： A

60、根据我国卫生标准回答以下问题：对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析，提出控制措施，并组织实施的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

61、下述哪项不属于微生物【单选题】——

A. 病毒

B. 支原体

C. 细菌

D. 衣原体 钩虫

【答案】： E

62、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

A. 蚊

B. 虱

C.

螨

D. 鼠 蚤

【答案】：A

63、治疗室的管理中,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 注射治疗时要铺无菌盘,抽出的药液存放不能超过 2 小时
- B. 治疗室中开启的各种溶酶超过 24 个小时不能使用,最好采用小包装
- C. 治疗室中开启的无菌溶液需在 2 小时内使用
- D. 碘酊、乙醇瓶应保持密闭,每周更换并对容器灭菌 1~2 次 经灭菌后的棉球、纱布包一经打开,使用时间不能超过 48 小时

【答案】：E

64、生活垃圾为【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：D

65、医院感染最重要的传染来源是【单选题】——

- A. 病原携带者
- B. 血液制品
- C. 食品
- D. 动物 各种病人

【答案】：E

66、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】

——

- A.  $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B.  $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C.  $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D.  $\leq 200\text{cfu/cm}^2$   $\leq 500\text{cfu/cm}^2$

**【答案】**： A

67、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

- A. 泌尿道感染
- B. 表皮传染病
- C. 呼吸道传染病
- D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】：C

68、预防免疫功能低下患者发生医院感染,不正确的是【单选题】——

- A. 保护皮肤黏膜的完整性
- B. 保护性隔离
- C. 全身使用广谱抗生素
- D. 治疗局部感染病灶 注射相关疫苗

【答案】：C

69、碘伏属于【单选题】——

- A. 中效消毒剂
- B. 低效消毒剂
- C. 以上都不是
- D. 高效消毒剂 中低效消毒剂

【答案】：A

70、发现医院感染流行或暴发流行趋势时,进行流行病学调查的基本步骤的第一步是【单选题】——

- A. 查找感染的
- B. 证实流行或暴发
- C. 查找引起感染的因素
- D. 分析流行或暴发的原因 制定防范措施

【答案】：B

71、下列概念中哪项是错误的【单选题】——

- A. 全面综合性监测可获得医院感染本底感染率
- B.

目标性监测是将有限的人力、财力用于解决医院感染的关键问题

- C. 医院感染与传染病相同的是培养出细菌即能确诊
- D. 医院感染的现患率高于同期的感染发生率 医院感染漏报率的调查目的是对感染率监测质量的评估

【答案】： C

72、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】： C

73、对传染性非典型肺炎无效的公众预防措施是【单选题】——

- A. 讲究个人卫生
- B. 不接触传染性非典型患者或临床诊断患者
- C. 在通风不好或人群密集的场所戴口鼻罩
- D. 勤洗手 注射丙种球蛋白

【答案】： E

74、根据我国卫生标准回答以下问题:使用中的消毒剂【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： D

75、紫外线辐射强度为多少时更换紫外线灯管【单选题】——

A.

$\approx 70 \mu W/cm^2$

- B.  $=70 \mu W/cm^2$
- C.  $<70 \mu W/cm^2$
- D.  $\geq 70 \mu W/cm^2$

【答案】：C

76、使用戊二醛达到灭菌的时间是【单选题】——

- A. 6 小时
- B. 2 小时
- C. 10 小时以上
- D. 8 小时以上 4 小时

【答案】：C

77、取无菌溶液时,先倒去少量溶液的的目的是【单选题】——

- A. 冲洗瓶口
- B. 练习操作,以便从原处倒出
- C. 减少瓶内溶液
- D. 检查液体是否清亮 检查瓶口是否有裂缝

【答案】：A

78、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

- A. 1%氯胺溶液
- B. 5%碘伏
- C. 0.1%苯扎溴铵溶液
- D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

79、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B. 从页面抓取
- C. 随便撕取



D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

**【答案】**：B

80、脊髓灰质炎宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：C

81、医疗区域属于半污染区的是【单选题】——

- A. 患者洗涤间
- B. 病区化验室
- C. 病室及厕所
- D. 治疗室 病区营养配餐室

【答案】：B

82、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称
- B. 由A型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C. 由H5N1血清型引起的禽流感称高致病性禽流感
- D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之间传播

【答案】：D

83、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

84、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B.

省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： B

85、传染病房每间病室的病人数不应超过【单选题】——

A. 6人

B. 5人

C. 4人

D. 3人 2人

【答案】： C

86、传染病区医务人员使用的隔离衣一般情况下更换时间是【单选题】——

A. 24h

B. 6h

C. 48h

D. 12h 72h

【答案】： A

87、高效消毒剂是【单选题】——

A. 醋酸氯己定

B. 新洁尔灭

C. 两者均是

D. 两者均否

【答案】： D

88、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

A. 完全具备持续的人传人的能力

B. 狨猴为自然储存宿主

C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播

D. 单峰骆驼可能是人类感染来源

非密切接触即可引起人际间传播

【答案】：D

89、关于地面和拖洗工具的消毒,下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- B. 因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好
- C. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时,应局部用消毒剂处理
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗

【答案】：C

90、临床科室医院感染管理小组的职责下列哪项错误【单选题】——

- A. 制定本科室医院感染管理规章制度
- B. 监督检查本科室有关医院感染管理的各项工作,对医院感染可疑病例,可能存在感染的环节进行监测,并采取有效防治措施
- C. 对医院感染散发病例按要求登记报告,并立即向当地卫生行政机构报告
- D. 按要求对疑似或确诊病例留取临床标本,进行细菌学检查和药敏试验 监督检查本科室抗生素使用情况

【答案】：C

91、有关紫外线消毒效果监测下列哪项规定是错误的【单选题】——

- A. 对灯管应用时间、照射累计时间进行记录并签名
- B. 对紫外线灯管在安装后、使用前应进行强度监测
- C. 使用中的灯管的强度监测应每个月监测 1 次
- D. 新购灯管强度大于  $100 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ,使用中灯管强度大于  $70 \mu\text{W}/\text{cm}^2$  为合格灯管 照射前后人工染菌杀灭率达到 99.9%以上为合格灯管

【答案】：C

92、经血液、体液传播病原体不包括【单选题】——

- A. 麻疹病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 疟原虫 丙型肝炎病毒

【答案】：A

93、调查医院感染的最佳方法【单选题】——

- A. 从医院微生物室获得病例来源
- B. 临床医师填报病例
- C. 专职护士到病室前瞻性发现病例
- D. 病室监控护士报告病例 专职护士到病案室从出院病历中  
查找病例

【答案】：C

94、关于洗手指征错误的是【单选题】——

- A. 脱手套后不需洗手
- B. 接触血液、体液和被污染的物品前后
- C. 接触患者前后
- D. 戴口罩和穿脱隔离衣前后 进行无菌技术操作前后

【答案】：A

95、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

- A. 脑室镜
- B. 胸腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

96、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B.

收到标本后及时检查

- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查  
在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

97、卫生部对医院感染有关的检查指标中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医务人员接受医院感染在职教育每年不少于6学时
- B. 常规器械消毒合格率应达100%
- C. 当证实有医院感染爆发时医院应于48小时内报告当地卫生部门
- D. 医院抗生素使用率力争小于50% 一级、二级、三级医院感染率应分别控制在 $\leq 7\%$ 、 $\leq 8\%$ 、 $\leq 10\%$

【答案】：C

98、测定压力蒸汽灭菌效果的指示菌是【单选题】——

- A. 白色念珠菌(ATCC10231)
- B. 金黄色葡萄球菌(ATCC6538)
- C. 大肠杆菌(ATCC8099)
- D. 枯草杆菌黑色变种(ATCC9372) 嗜热脂肪杆菌芽胞(ATCC9753)

【答案】：E

99、根据我国卫生标准回答以下问题:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$ 或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$ 或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

细菌菌落总数应 $\leq 300$ cfu/mL,致病性微生物不得检出

【答案】：B

100、医疗废物【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

101、当被沾有 HBsAg 阳性血的针头刺伤时,立即应做的主要处理是【单选题】——

- A. 伤口立即涂以碘酊
- B. 给受伤者立即注射丙种球蛋白
- C. 受伤者立即抽血作乙型肝炎病毒全套抗原抗体检测
- D. 乙型肝炎病毒高价免疫血清注射 乙型肝炎病毒疫苗注射

【答案】：D

102、传染病房使用口罩下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 不可用污染手触碰口罩
- B. 口罩必须遮住口鼻
- C. 不用时不能挂在胸前
- D. 护理严密隔离患者后,口罩污染面向内折叠,放置备用口罩潮湿应立即更换

【答案】：D

103、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播
- B. 接触传播
- C. 经呼吸道飞沫传播
- D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】：C

104、给传染病患者发药,下述哪一项是错误的【单选题】——

- A. 协助同一病种的患者服药后,再给另一病种患者喂药
- B. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- C. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯
- D. 车下层放盆,内盛消毒液 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：A

105、输液反应中属于医院内感染的是【单选题】——

- A. 由液体或输液通路中的毒素引起的发热
- B. 由于液体被细菌污染引起的发热
- C. 由于输注液体中的药物引起的发热
- D. 由于输液管中的内毒素引起的发热 由于输注的液体中含有热源物质引起的发热

【答案】：B

106、对病室进行紫外线消毒,下列做法错误的是【单选题】——

- A. 紫外线穿透性差,被消毒的物品不可有任何遮蔽
- B. 灯管使用期限不能超过 2000 小时
- C. 紫外线灯管要保持清洁透亮
- D. 为检查紫外线杀菌效果,定期进行空气细菌培养 照射前,先做好病室的清洁工作

【答案】：B

107、传染病区使用的拖把【单选题】——

- A. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用
- B. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- C. 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用
- D. 拖把应有明显的标记,严格分区使用 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用

【答案】：C



108、无菌盘铺好后有效期不超过【单选题】——

- A. 8h
- B. 2h
- C. 16h
- D. 12h 4h

【答案】：E

109、I类、II类区域工作人员卫生手及物体表面的合格标准为【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 20\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 25\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$ ,未检出致病菌

【答案】：D

110、目前引起输血后肝炎的主要的肝炎病毒为【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 甲型肝炎病毒
- C. 戊型肝炎病毒
- D. 丙型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：D

111、冲手时应取姿势为【单选题】——

- A. 指尖朝下,手肘朝上
- B. 手指及前臂前伸
- C. 双手互相搓洗手臂
- D. 指尖朝上,手肘朝下 手指及前臂平伸

【答案】：D

112、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

—

- A.

泌尿道

- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

113、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

【答案】：B

114、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好
- B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上
- C. 冷水时即放入计时
- D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】：C

115、患者出院后,需将其用过的被褥在阳光下曝晒 6 小时,可达到哪种效果【单选题】——

- A. 隔离
- B. 清洁
- C. 灭菌
- D. 灭虱 消毒

【答案】：E

116、目前国内医院感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道

B. 外科切口

C.

血液

D. 下呼吸道 胃肠道

【答案】：D

117、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

A. 手

B. 饮水

C. 食品

D. 医疗器械 衣物

【答案】：A

118、浸泡无菌持物钳的容器应是【单选题】——

A. 大口容器,盛用消毒液

B. 大口容器,底部垫纱布

C. 大口容器,盛用消毒液,底部垫无菌纱布

D. 盛用消毒液,底部垫无菌纱布 大口容器,盛用消毒液,底部垫纱布

【答案】：A

119、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

A. 医院感染是指在医院内获得的感染

B. 与上次住院有关的感染是医院感染

C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染

D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染 婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

120、普通病房【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：C

121、接触传染病患者后隔离衣应放在【单选题】——

- A. 治疗区, 清洁面向外
- B. 走廊, 清洁面向外
- C. 走廊, 清洁面向内
- D. 办公室, 清洁面向外 病室, 清洁面向外

【答案】：B

122、ICU 的医院感染管理措施错误的是【单选题】——

- A. 探视者进入 ICU 应更衣、换鞋
- B. 工作人员进入 ICU 要穿专用工作服、换鞋、戴帽子、口罩、洗手
- C. ICU 应布局合理, 分治疗室(区)和监护区
- D. 病人的安置应感染病人与非感染病人分开, 特殊感染病人单独安置 监护区每床使用面积不少于  $9.5\text{m}^2$

【答案】：A

123、下述监测不合格的有【单选题】——

- A. 层流洁净手术室空气细菌数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$
- B. 重症监护室医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 供应室无菌区物体表面细菌数 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. 一次性注射器和输液器细菌培养阴性, 噬试验阳性 传染病病房物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：D

124、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 丙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒 疟原虫

【答案】：D

125、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】：D

126、若需提高煮沸温度,可在水中加入【单选题】——

- A. 碳酸氢钠
- B. 高锰酸钾
- C. 乙醇
- D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】：A

127、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

128、下列概念中不正确的是【单选题】——

- A. 医院感染发病率是指一定时间内住院病人中发生医院感染新发病例的频率
- B. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院病人中,短时间内、突然发生3例以上同源感染病例的现象
- C. 医院感染流行是指某医院、某科室医院感染发病率显著超过历年散发发病率水平
- D. 医院感染散发是指医院感染在某医院、或某地区住院病人中历年的一般发病率水平

医院感染的流行趋势是指医院、某科室的医院感染持续流行,长时间不能控制

【答案】：E

129、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

130、术前皮肤消毒应由【单选题】——

- A. 巡回护士完成
- B. 未洗手的手术医生完成
- C. 手术护士完成
- D. 已洗手的手术医生完成 麻醉医生完成

【答案】：D

131、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】：B

132、我国医院内感染最常发生的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

133、低效消毒剂是【单选题】——

- A. 醋酸氯己定
- B. 新洁尔灭
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】：C

134、外科刷手法刷手顺序【单选题】——

- A. 手掌,指尖,甲缘,指间,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- B. 甲缘,指尖,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上
- C. 指间,指尖,甲缘,手掌,腕部,前臂,肘部刷手至肘上
- D. 指尖,甲缘,指间,手掌,腕部,前臂,肘部,刷手至肘上腕部,前臂,肘部,肘上,指间,指尖,甲缘,刷手至肘上

【答案】：D

135、属于高度危险性物品的是【单选题】——

- A. 手术器械和用品
- B. 体温表
- C. 呼吸机管道
- D. 胃肠道内窥镜和气管镜 麻醉机管道

【答案】：A

136、合胞体病毒感染宜采取【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 呼吸道隔离
- C. 两者均是
- D. 两者均不是

【答案】：B

137、霍乱病人应采取【单选题】——

- A. 接触隔离
- B. 保护性隔离
- C.



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/095324100332011204>