

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤与性病学试题及答案(强化练习)

1、多选 女性, 62岁。口腔溃烂疼痛4个月, 全身红斑伴瘙痒1周。病程中无四肢肌肉疼痛和无力。发病前身体健康。体格检查: 面、颈、躯干、四肢广泛分布大量大小不等的紫(江南博哥)红色斑疹、斑丘疹, 表面覆有灰白色鳞屑, 三联征阴性, 皮损以面颈部为著, 未有水疱、大疱及糜烂。口唇、舌及两侧颊黏膜较多处大小不等的糜烂, 口唇部分糜烂面表面结痂。系统检查无异常。入院1周后出现双侧眼球结膜充血和眼睑糜烂。该患者诊断应考虑以下哪些疾病()。

- A. 寻常型银屑病
- B. 玫瑰糠疹
- C. 二期梅毒
- D. 扁平苔藓
- E. 白塞病
- F. 天疱疮

正确答案: C, D, F

2、单选 虫咬皮炎可见以下表现, 除了:

- A. 瘙痒
- B. 畏寒、发热
- C. 呼吸困难
- D. 疼痛
- E. 遗传

正确答案: E

3、单选 斑秃恢复期是在患者发病后多长时间()。

- A. 1~2个月
- B. 2~3个月
- C. 3~4个月
- D. 4~6个月
- E. 6~9个月

正确答案: C

4、单选 维生素A缺乏症临床表现叙述错误的是()。

- A. 甲板变薄, 有纵沟
- B. Bitotspot
- C. VitA 低于 $0.45 \mu\text{mol/L}$
- D. 毛囊角化性丘疹
- E. 夜盲症

正确答案: C

参考解析: 维生素A缺乏症确诊维生素A水平测定一般低于 $0.35 \mu\text{mol/L}$ 。

5、单选 糊剂不适合用于以下哪种情况()

- A. 躯干皮损
- B. 头部皮损
- C. 亚急性湿疹，少量渗出
- D. 急性湿疹，少量渗出

正确答案： B

6、单选 恶性红斑见于（）。

- A. SLE
- B. 皮炎
- C. 系统性硬皮病
- D. 混合性结缔组织病
- E. 干燥综合征

正确答案： B

参考解析： 伴有恶性肿瘤的皮炎患者，皮炎红斑损害更为明显，这种红斑称为恶性红斑。

7、单选 某患者，聚餐食入大量鱼虾，同时饮酒，半小时后全身多发鲜红色风团，发生和消退均较快，伴瘙痒、腹痛、呼吸困难 立即给予哪项治疗（）。

- A. 口服抗组胺药
- B. 皮下注射 0.1% 肾上腺素 0.5ml、吸氧
- C. 阿托品等解痉药
- D. 抗生素控制感染
- E. 通便利尿

正确答案： B

8、单选 下列关于脓疱型银屑病正确的是（）。

- A. 不伴高热、寒战
- B. 皮疹不成批出现
- C. 四肢伸侧更易受累
- D. 脓疱可融合成脓湖
- E. 不会转化为红皮症

正确答案： D

参考解析： 脓疱型银屑病可转化为红皮病。伴高热、寒战，皮疹成批出现，四肢屈侧更易受累。

9、单选 Bowen 病出现何种情况提示侵袭性生长的可能（）。

- A. 皮疹色素变深
- B. 皮疹逐渐扩大
- C. 皮疹出血倾向
- D. 皮疹呈不规则隆起性损害
- E. 皮疹出现溃疡

正确答案： E

10、单选 以下部位不容易发生裂隙的是()

- A. 口角
- B. 手掌边缘
- C. 背部
- D. 足底及边缘

正确答案: C

11、单选 下列不是皮肤复合感觉的是()

- A. 湿
- B. 软
- C. 痛
- D. 硬

正确答案: C

12、单选 痤疮的好发部位为()。

- A. 面部
- B. 颈部
- C. 胸部
- D. 背部
- E. 肩部

正确答案: A

13、单选 下列不属于晚期梅毒的是()。

- A. 结节性梅毒疹
- B. 树胶肿
- C. 近关节结节
- D. 红斑糜烂性梅毒疹
- E. 梅毒性主动脉瓣关闭不全

正确答案: D

参考解析: 红斑糜烂性梅毒疹是二期梅毒的黏膜损害之一。

14、单选 窄谱 UVB 的波长为()。

- A. 532nm
- B. 380nm
- C. 311nm
- D. 180nm
- E. 370nm

正确答案: C

15、单选 某患者因肺炎住院输液治疗 2 天后全身泛发鲜红斑风团、瘙痒 最常见引起荨麻疹的药物()。

- A. 吗啡
- B. 青霉素

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/096055232121010142>