

美容牙科

I 型题

- 1、牙体硬组织中透明度最高的是 (A)。
 - A、牙釉质
 - B、牙本质
 - C、牙骨质
 - D、牙槽骨
 - E、牙颌骨

- 2、牙周膜对下列那种方向的力承受效果最好? (A)
 - A、垂直向
 - B、颊舌向
 - C、近远中向
 - D、剪切力
 - E、扭力

- 3、光固化树脂修复与烤瓷冠修复相比, 主要优点是 (D)。
 - A、美观性更好
 - B、前后牙都适合
 - C、色泽更稳定
 - D、切割牙体组织少
 - E、咀嚼功能更好

- 4、四环素主要沉积在牙的哪个部位? (B)
 - A、牙釉质
 - B、牙本质
 - C、牙骨质
 - D、牙髓
 - E、牙周膜

- 6、修复治疗中需作局部麻醉的病例是 (C)
 - A、铸造核桩冠修复
 - B、根管治疗后的全冠修复
 - C、基牙健康的固定桥修复
 - D、患者敏感的无髓牙冠修复
 - E、纤维树脂桩核修复

- 7、全口义齿选排前牙时, 一般要求病人微笑时露出中切牙的 (D)。
 - A、切缘
 - B、切 1/3
 - C、切 1/2

- D、切 2/3
- E、龈缘

8、前牙瓷贴面修复牙体预备时，轴面一般要求预备厚度为（B）mm。

- A、0.2-0.3
- B、0.3-0.7
- C、1.0-1.5
- D、1.5-2.0
- E、2.0-2.5

9、当缺牙间隙过宽时，为达到美观要求常需作一些调整。但在下列措施中哪一项是错误的（D）。

- A、利用视觉误差
- B、酌情添加人工牙
- C、扩大前牙唇面近远中邻间隙
- D、扩大舌侧外展隙
- E、改变颊脊的位置

10、有关过渡性修复特点的说法中，错误的是（E）。

- A、戴用时间较短，为非永久性修复
- B、易于调改，以便于纠正原有的设计不足之处
- C、具有诊断和治疗双重作用
- D、可以调节患者心理，提高治疗效果
- E、对每个患者都是必须的

11、下列哪项是进行桩冠修复的必要前提（A）。

- A、患牙经过完善的根管治疗
- B、牙周洁治术
- C、牙冠缺损至龈下
- D、牙漂白术
- E、龋洞充填术

12、桩冠牙体预备时应该（C）。

- A、把根管内的牙胶去净
- B、把剩余的牙冠磨除
- C、尽可能多的保留牙体组织
- D、把根管尽量扩大，以保证固位
- E、把根管口预备成喇叭状

13、对于桩冠修复的根管预备，下列说法错误的是（B）。

- A、根据 X 片，了解牙根基本情况
- B、一次选定圆钻进行预备
- C、观察切割出的粉末性质调整前进方向
- D、可借助根管探照灯判断前进方向
- E、预备至最后应用磨光钻将根管壁修平

- 14、下列情况不适宜作桩核冠修复的是（ D ）。
- A、残根根面达龈下，牙周健康，而剩余牙根有足够长度
 - B、错位、扭转牙没有条件作正畸治疗或非正畸适应证者
 - C、畸形牙直接牙体预备固位不良者
 - D、牙槽骨吸收达到根尖 1/3 的残根
 - E、牙槽骨内残根的根长和根径能够满足支持与固位，经过冠延长术或牵引术后可暴露出断根面者
- 15、Cerec—II 型 CAD/CAM 系统使用的材料为（ D ）
- A、金合金
 - B、普通镍铬合金
 - C、树脂材料
 - D、可切削陶瓷
 - E、软质钛合金
- 16、义齿修复前需进行牙槽骨修整的是（ C ）。
- A、未愈合的牙槽窝
 - B、上颌结节
 - C、尖锐骨突
 - D、下颌角
 - E、下颌舌骨嵴
- 17、选取托盘时，托盘内面和组织面应该有（ B ） mm 的间隙
- A、2mm
 - B、3-4mm
 - C、4-5mm
 - D、5-6mm
 - E、6-8mm
- 18、下列哪种情况不宜作金属烤瓷修复（ E ）
- A、氟斑牙、四环素牙、染色牙
 - B、牙体缺损过大的牙
 - C、前牙错位，扭转而不宜作正畸治疗者
 - D、需要作烤瓷桥固位体的基牙
 - E、青少年恒牙
- 19、前牙金属烤瓷全冠唇面龈边缘的位置应该在（ C ）
- A、龈缘上 2mm
 - B、附着龈根方 2mm
 - C、龈缘下 1—2mm
 - D、龈缘下 2—4mm
 - E、平齐龈缘

20、上前牙金属烤瓷全冠修复牙体预备时，其舌面与对颌应该预备出的间隙至少是（D）

- A、3mm
- B、2mm
- C、1.5mm
- D、0.5mm
- E、0.2mm

21、活髓牙牙体制备后，暂时冠粘固一般采用以下哪种粘固剂为好（D）

- A、玻璃离子水门汀
- B、磷酸锌水门汀
- C、羧酸锌水门汀
- D、丁香油粘固剂
- E、树脂粘固剂

22、临床上衡量一个牙是否为良好基牙的最重要指标是（D）

- A、牙根长度
- B、牙根数目
- C、牙根分叉度
- D、牙周膜面积
- E、牙槽骨的密度

23、一般情况下固位力最大的固位体是（A）

- A、全冠
- B、高嵌体
- C、多面嵌体
- D、3/4冠
- E、瓷嵌体

24、哪种情况下不能设计单端固定桥（E）

- A、尖牙缺失
- B、第二、三磨牙缺失
- C、修复前牙小间隙
- D、上颌侧切牙缺失
- E、第一、二磨牙缺失

25、冠修复咬合升高如果未及时发现处理，可能导致以下的问题，除了（D）

- A、咬合疼痛
- B、牙周炎症
- C、牙槽骨吸收，牙齿松动
- D、对牙伸长
- E、颞下颌关节功能紊乱

26、选择人工前牙时不重要的因素是（B）

- A、剩余牙的颜色、形状和大小

- B、患者过去是否戴过义齿
- C、患者的面型
- D、患者的肤色
- E、患者的年龄

27、放置牙合支托的位置是 (E)

- A、基牙邻近缺隙侧的边缘
- B、基牙非缺席侧的边缘
- C、磨牙颊沟或舌沟
- D、尖牙舌隆突
- E、以上都可以

28、从拔牙到义齿修复通常需要多长时间 (C)

- A、1 个月
- B、2 个月
- C、3 个月
- D、4 个月
- E、6 个月

29、固定桥桥体设计时，桥体的龈面生物相容性最好的材料为 (A)

- A、烤瓷
- B、金属
- C、热凝塑料
- D、自凝塑料
- E、光敏复合树脂

30、与单冠修复相比，在设计固定桥修复时还需要考虑 (B)

- A、牙冠的形态
- B、共同就位道
- C、牙根的形态
- D、牙周的健康
- E、修复材料的选择

31、关于种植义齿，正确的说法是 (D)

- A、可以取代常规义齿
- B、比常规固定桥更舒适
- C、其支持、固位和稳定功能比其它义齿好
- D、可以减少或避免因基牙制备而可能发生的不良后果
- E、在临床上可以应用于所有患者

32、下列哪些不是 I 型杆的优点 (B) ?

- A、固位作用好
- B、稳定作用强
- C、美观

- D、对基牙损伤小
- E、暴露金属少

33、一般情况下，可摘局部义齿的固位体数目为（C）

- A、尽可能多
- B、4—6个
- C、2—4个
- D、1—2个
- E、尽可能少

34、藻酸盐印模材料从口内取出后应及时灌注的主要原因是（B）

- A、印模材吸水收缩，体积不稳定
- B、印模材吸水膨胀，失水收缩，体积不稳定
- C、时间过长，印模材变硬，不易脱膜
- D、石膏凝固时间会变长
- E、时间过长，模型的强度会下降

35、与常规义齿相比，附着体义齿的主要优点是（C）

- A、物美价廉
- B、制作简便
- C、美观舒适
- D、经久耐用
- E、保护基牙

36、切牙乳突作为排列上颌全口义齿前牙的解剖标志之一，是因为（A）

- A、切牙乳突与上颌切牙之间有比较稳定的关系
- B、切牙乳突位于上颌腭中缝的前端
- C、切牙乳突下方为腭大神经
- D、两个上中切牙的交界线应以切牙乳突为准
- E、切牙乳突位于两个尖牙的连线上

37、全口义齿前牙要排成浅覆牙合，浅覆盖，主要是因为（C）

- A、美观
- B、排牙方便
- C、易于取得前伸平衡颌
- D、发音清晰
- E、不容易咬舌或咬唇

38、戴全口义齿后，面部丰满度主要影响因素是（E）

- A、正中关系与息止牙位
- B、前伸牙位侧向牙合
- C、唇侧基托与舌侧基托厚度
- D、前牙唇舌向位置与唇侧基托厚度
- E、垂直距离、前牙唇舌向位置与唇侧基托厚度

39、垂直距离是指 (B)

- A、上下颌牙槽嵴顶之间的距离
- B、天然牙列呈正中牙合时面下 1/3 的高度
- C、瞳孔连线到口裂间的距离
- D、息止颌时，上下颌牙牙合面间距离
- E、眶底到颏底间的距离

40、上颌全口义齿基托后缘伸展位置与腭小凹的关系是 (D)

- A、基托后缘在腭小凹前 2mm
- B、基托后缘在腭小凹前 1mm
- C、基托后缘与腭小凹连线平齐
- D、基托后缘盖过腭小凹后 2mm
- E、基托后缘盖过腭小凹后约 4mm

II 型题

1、固定桥由哪几个部分组成 (ABC)

- A、桥体
- B、固位体
- C、连接体
- D、间接固位体
- E、卡环

2、为了减少金属烤瓷修复后瓷崩现象的发生，口腔医生应该注意 (ABCD)

- A、粘固前将烤瓷牙回炉重新上釉
- B、正确设计咬牙合，避免咬牙合力集中
- C、牙体预备量足够，
- D、牙体预备打磨圆滑，避免尖锐棱角
- E、选择正确的瓷粉颜色

3、对于临床上缺牙间隙过窄的病例，为了达到审美要求，可以采用下列那些措施来调整 (ACD)

- A、适当多磨除缺牙区邻近的基牙邻面
- B、加大桥体的牙龈高度
- C、改变颊脊的位置
- D、将桥体与邻牙重叠
- E、桥体突度增加

4、增加全冠固位的措施应从以下哪些方面考虑 (ACE)

- A、增加辅助固位形
- B、增加牙窗聚合度
- C、选用粘接力强的粘接剂，提高全冠与牙体之间的粘接力
- D、在轴壁上预备倒凹
- E、增加牙齦径

5、暂时冠桥的作用包括（ABDE）

- A、保护作用
- B、美观作用
- C、压缩龈缘
- D、维持和稳定作用
- E、诊断信息作用

6、可以通过下列方法调节可摘局部义齿的固位力（ABCE）

- A、调整就位道
- B、改变基托的大小
- C、增减卡环数目
- D、改变舌杆厚度
- E、改变卡环材料

7、病例一：患者前牙前突，要求修复并内收上前牙，在当地医院经烤瓷桩冠修复后，上前牙区疼痛，不能正常进食。检查发现 21|12 扣痛，松动 I 度。X 光片示未作根管治疗，根管内有短桩，根尖区暗影。针对此病例，下面哪些处理措施你认为妥当？（AD）

- A、拆除桩冠
- B、拔除患牙
- C、不作处理，嘱患者以后发作时都服用抗生素加止疼药，
- D、重作根管治疗
- E、拆除烤瓷冠，换做全瓷修复

8、病例二：患者新戴用局部活动义齿后出现压痛，此时应当做的处理是（BCE）

- A、嘱患者停用义齿，休息一周后复诊
- B、检查义齿有无咬合高点，酌情调整人工牙的牙齶
- C、检查并标记压痛点，对基托组织面作相应缓冲
- D、对基托组织面均匀磨除，或对义齿基托组织面重衬
- E、检查义齿边缘是否伸展过度，必要时作相应调磨

9、病例三：患者 1|1 间多生牙 5 年，患者自觉影响美观，要求治疗，改善前牙美观，你认为下列哪些方案可供选择（ABC）

- A、拔除多生牙，正畸治疗关闭缝隙
- B、拔除多生牙，前牙烤瓷冠修复，关闭缝隙
- C、拔除多生牙，前牙瓷贴面修复，关闭缝隙
- D、拔除多生牙，种植义齿修复，关闭缝隙
- E、拔除多生牙，采用自凝塑胶口内关闭缝隙

10、病例四：患者 1| 普通金属烤瓷全冠修复后，出现牙龈红肿、溢脓，以下哪些处理措施正确（BCDE）

- A、口服大剂量抗生素
- B、局部冲洗上药
- C、如系对金属 Ni 过敏，则拆除全冠，换做贵金属，或者全瓷修复

- D、检查全冠边缘密合性
- E、检查是否有粘接剂嵌入牙龈

III 型题

1—3 题：色彩学与美容修复密切相关，它有三个重要的名词，分别是

- A、色相
- B、色度
- C、明度

- 1、颜色间彼此区分的名字，及代表不同的颜色，指的是（A）
- 2、颜色的亮度或者明暗程度，指的是（C）
- 3、颜色的饱和程度或者强度，指的是（B）

4—7 题：可摘局部义齿的卡环有较多的种类：

- A、对半卡环
- B、连续卡环
- C、联合卡环
- D、圈型卡环

- 4、主要用于前后有缺隙、孤立的前磨牙或磨牙的是（A）
- 5、主要用于牙周夹板的是（B）
- 6、适用于相邻牙之间有间隙或者有食物嵌塞等情况的是（C）
- 7、多用于最后孤立磨牙，牙向近中舌侧或者近中颊侧倾斜的情况（D）

8—12 题：对以牙痛为主诉就诊的病者，可将牙的疼痛性质作为初步诊断的依据，并据此作相应的处理。

- A、急性牙髓炎
- B、根尖周炎
- C、慢性牙髓炎
- D、牙周炎
- E、牙本质过敏症

- 8、患者牙疼表现为夜间阵发性疼痛，自发痛，不能准确定位患牙，疼痛可放射到患侧头部，初期口含冷水可以缓解疼痛，首先应该考虑的诊断是（A）
- 9、患牙表现为冷热或酸甜刺激时疼痛，无自发痛，首先应该考虑的诊断是（E）
- 10、患牙表现为自发性疼痛，口含冷水不能缓解，因患牙叩痛明显可准确定位，患牙无松动，牙周无红肿。首先应该考虑的诊断是（B）
- 11、钝性自发痛，伴牙龈红肿出血，牙周溢脓，可探及牙周袋，有或无牙松动。
- 12、上述牙病中应该立即进行开髓处理的是（A）

13—16：固定修复中，根据固位体的设计，可以分为

- A、双端固定桥
- B、半固定桥
- C、单端固定桥
- D、复合固定桥

- 13、两端为不同的连接体，桥体的一端为固定连接体；另一端多位栓道式结构的活动连接体，这种类型属于（B）
- 14、仅一端有固位体，另一端为悬臂无基牙支持的是（C）
- 15、两端都有固位体，固位体与桥体之间都为固定连接，与基牙组成了一个新的咀嚼单位（A）
- 16、包含双端固定桥、单端固定桥等两种或两种以上形式的是（D）
- 17—20：全瓷修复体应用日趋广泛，其主要特点有：
- A、美观性和生物相容性好
 - B、分层构筑法
 - C、高强度基底瓷具有良好的机械性能
 - D、切割牙体组织相对较多
- 17、全瓷修复体与非贵金属烤瓷修复体相比较的最大优点是（A）
- 18、全瓷冠修复体更适宜修复无髓牙是因为（D）
- 19、全瓷修复体多采用的制作方法是（B）
- 20、全瓷修复体已能够制作后牙多单位桥，是因为（C）

卫生行业职业资格鉴定理论试卷

职业名称： 口腔修复工

级 别： 三级
准考证号： _____
姓 名： _____
考点名称： _____

卫生部职业技能鉴定指导中心

二零一三年四月

一、单选题：以下每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题目的相应字母所属的方框涂黑。

1、关于口腔修复工职业守则的说法中错误的是

- A. 严格执行工作程序
- B. 具备独立完成整个修复件的能力
- C. 爱岗敬业
- D. 爱国守法
- E. 爱护设备工具

2、关于职业道德，描述错误的是

- A. 职业道德具有行业性，说明不同行业之间的职业道德不同，没有共通之处
- B. 职业道德具有很强的针对性和可操作性
- C. 随着时代变化，职业道德也在发展，职业道德在一定程度上贯穿和体现着当时社会道德的普遍要求
- D. 由于职业分工有其相对的稳定性，与之相适应的职业道德也就有较强的稳定性和连续性
- E. 职业道德规则带有各自不同的个性特征，鲜明地体现着社会对某种具体的职业活动的特殊要求

3. 从剖面观察，牙的组成不包括

- A. 牙釉质
- B. 牙本质
- C. 牙冠
- D. 牙骨质
- E. 牙髓

4. 正常的牙邻接关系的作用中，错误的是

- A. 可防止食物嵌塞
- B. 免使龈乳头受压萎缩及牙槽突降低
- C. 可使牙及牙颌系稳定、牙弓完整
- D. 对食物排溢有一定的阻碍作用
- E. 有利于咀嚼，维护颞下颌关节、咀嚼肌及牙周组织的健康

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/097040156066006041>