

传染病学试题及答案（4）

- 1、构成传染必须具备的条件是：
 - A 传染源、传播途径
 - B 传染源、易感人群
 - C 病原的毒力、数量
 - D 病原体、人体
 - E 自然因素、社会因素
- 2、传染病流行过程必须具备的三个环节是：
 - A 病原体、人体及其所处的环境
 - B 病原体、自然因素、社会因素
 - C 病原体毒力、数量及适当的侵入门户
 - D 病原体、传播途径、易感人群
 - E 传染源、传播途径、人群易感性
- 3、感染性疾病和传染病的主要区别是
 - A 是否有病原体
 - B 是否有传染性
 - C 是否有感染后免疫
 - D 是否有发热
 - E 是否有毒血症症状
- 4、影响传染病流行过程的二个重要因素是：
 - A 地理因素、气候因素
 - B 社会制度、经济状况
 - C 气温、雨量
 - D 生活习惯、文化传统
 - E 社会因素、自然因素
- 5、伤寒患者经环丙沙星治疗体温正常，1周后又发热，血培养阳性，属于：
 - A 复发
 - B 再燃

C 重复感染

D 混合感染

E 再感染

6、伤寒患者经治疗后体温渐降，但未降至正常，体温再次升高，血培养阳性，属于：

A 复发

B 再燃

C 重复感染

D 混合感染

E 再感染

7、女因急性黄疸性肝炎住院，抗-HAV-IgM 阳性，对其丈夫的处理，下列哪项是最恰当的

A 立即化验肝功能，抗-HAV

B 接受医学观察 45 天

C 注射人免疫球蛋白

D 甲肝疫苗预防接种

E 人免疫球蛋白+甲肝疫苗

8、我国最常见的 HbsAg 亚群是：

A adr,adw

B adr,ayr

C adr,ayw

D adw,ayr

E adw,ayw

9、急性乙型肝炎最迟出现的血清学指标是：

A HbsAg

B 抗-HBs

C HbeAg

D 抗-HBe

E 抗-HBc

10、急性重症肝炎最突出、最有诊断价值的临床表

现是：

- A 黄疸迅速加深
- B 肝脏进行性缩小
- C 显著的消化道症状
- D 明显的出血倾向
- E 中枢神经系统症状如烦躁、谵妄、嗜睡以至昏迷、抽搐等

11、重症肝炎服用乳果糖，主要目的是：

- A 补充能量，防止肝昏迷
- B 杀灭肠道细菌，防止继发感染
- C 杀死肠道细菌，减少氨的吸收
- D 降低肠道 PH，减少氨的吸收
- E 增加肠蠕动，加速肠内有害物质的排泄

12、对乙脑病毒普遍易感，感染后主要表现为

- A 病毒被排除
- B 隐性感染
- C 显性感染
- D 病毒携带状态
- E 潜在性感染

13、乙脑惊厥或抽搐最常见的原因是

- A 高热
- B 缺氧
- C 脑实质炎症及水肿
- D 低钙
- E 碱中毒

14、乙脑主要的死亡原因是：

- A 过高热
- B 脑水肿、脑疝形成
- C 中枢性呼吸衰竭
- D 外周性呼吸衰竭
- E 循环衰竭

15、3 岁儿童，高热、昏迷、抽搐 2 天急诊入院，疑为乙脑和中毒性痢疾，为及时诊断，应立即进行哪项检查

- A 大便培养
- B 肛拭子或盐水灌肠镜检
- C 脑脊液常规
- D 头颅 CT
- E 乙脑特异性 IgM 测定

16、乙脑尚无特殊治疗，为了降低病死率和防止后遗症，应积极处理好哪些危重症状

- A 高热，呼吸衰竭，循环衰竭
- B 高热，呼吸衰竭，惊厥
- C 高热，呼吸衰竭，肾功能衰竭
- D 惊厥，呼吸衰竭，循环衰竭
- E 惊厥，呼吸衰竭，肾功能衰竭

17、男，30 岁，发热 2 天，上厕所时昏倒在地，急测血压 5/0Kpa，面色苍白，脉搏细速，医院诊断为流行性出血热休克期，你认为患者产生休克最主要的原因是什么

- A 小血管通透性增加，血浆外渗，血容量减少
- B 水电解质平衡失调
- C 内脏大出血
- D 继发细菌感染
- E 小动脉痉挛

18、流行性出血热患者突然抽搐昏迷，瞳孔改变，下列哪种可能性大

- A 肝衰竭
- B 尿毒症
- C 颅内出血
- D 肾破裂
- E 腔道出血

19、流行性出血热患者体温 40℃以上，有腔道出血，血压

75/60mmHg，尿蛋白+++，有膜状物及血尿，应属于下列哪型

- A 轻型
- B 中型
- C 重型
- D 危重型
- E 非典型

20、20岁农民，因高热伴呕吐于8月入院，查：神清，面潮红，结膜充血，胸前有散在性出血点，颈软，周围血 WBC $11 \times 10^9/L$ ，N，有异型淋巴细胞，尿蛋白++，发病前2周曾到某地参加水利建设。最可能的诊断是：

- A 钩体病
- B 流行性脑脊髓膜炎
- C 流行性出血热
- D 败血症
- E 伤寒

21、男，30岁，急起发热3天，伴头痛乏力。查体：体温 $38^{\circ}C$ ，脉搏120次/分，呼吸36次/分，血压75/60mmHg，神清，急性病容，球结膜充血，上胸部散在出血点，心肺正常，肝右肋下1CM，血象：WBC $12 \times 10^9/L$ ，N，L，异型淋巴细胞。尿蛋白+++，最可能诊断是：

- A 败血症
- B 流行性脑脊髓膜炎
- C 流行性出血热
- D 钩端螺旋体病
- E 上呼吸道感染

22、伤寒杆菌致病的主要因素是

- A 内毒素
- B 肠毒素
- C 外毒素
- D Vi 抗原

E H 抗原

23、伤寒慢性带菌者是指：

- A 排菌期 1 个月以内
- B 排菌期 2 个月以内
- C 排菌期 3 个月以内
- D 排菌期 3 个月以上
- E 排菌期 6 个月以上

24、伤寒持续发热和毒血症症状主要是由什么所致

- A 伤寒杆菌在局部繁殖，大量持续侵入血流
- B 伤寒杆菌在血中大量繁殖
- C 伤寒杆菌释放的内毒素直接作用于体温调节中枢
- D 迟发型变态反应
- E 病灶中单核、巨噬细胞和中性粒细胞释放的内源性致热源

25、伤寒病变最显著的部位是：

- A 脾
- B 肝
- C 骨髓
- D 回肠和空肠
- E 回肠下段集合淋巴结和孤立淋巴结

26、男，30 岁，农民，持续发热半个月，已用氯霉素治疗，每天 2 克，共 7 天，体温下降，但未降至正常。查体：体温 38℃，脉搏 70 次/分，呼吸 20 次/分，肝肋下 1CM，脾恰及。血象： $\times 10^9/L$ ，N，L。为确诊，最重要的检查方法是：

- A 血培养
- B 大便培养
- C 小便培养
- D 骨髓培养
- E 肥达反应

27、男，36 岁，稽留高热已 3 周，伴腹胀腹泻。病程中突然右下腹疼痛，出冷汗，肝浊音界消失，腹部 X 线片可见游离气体。实验室

检查：WBC $18\times 10^9/L$ ，N，L，E为0，肥达反应“H”1：640，“O”1：640，外斐反应1：80，最可能的诊断是：A 胃穿孔

B 阑尾穿孔

C 伤寒肠穿孔

D 胆囊炎胆囊穿孔

E 血吸虫病胆囊穿孔

28、伤寒复发的原因是：

A 菌血症未完全消失

B 潜伏在病灶或巨噬细胞内的伤寒杆菌再度繁殖

C 潜伏于肠腔内的伤寒杆菌再次侵入血液

D 再次感染伤寒杆菌

E 伤寒患者退热后2-3周，因其他感染再次出现发热

29、中毒性痢疾最突出的病变是：

A 脑部特别是脑干神经细胞变性、点状出血

B 肾上腺皮质萎缩

C 肠粘膜弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

D 全身小血管内皮细胞肿胀，血浆渗出，周围组织水肿

E 肠粘膜水肿，增厚，溃疡

30、鉴别细菌性痢疾和阿米巴痢疾最可靠的依据是：

A 潜伏期的长短

B 毒血症状的轻重

C 大便常规发现红细胞的多少，是否有吞噬细胞或夏-雷结晶

D 大便检出病原体

E 抗生素治疗是否有效

31、下列各项中，对于中毒性痢疾和乙脑的鉴别最有意义的是

A 起病急骤

B 是否有腹泻

C 高热、昏迷、抽搐

D 早期休克

E 呼吸衰竭

32、男，20岁，腹泻1天，每天10余次，水样便，无腹痛及里急后重，大便镜检：WBC 0-2个/HP，RBC 1-3个/HP，结肠阿米巴滋养体 0-1个/HP，大便涂片革兰染色见弯曲呈鱼群状排列的阴性细菌。其可能的诊断是：

- A 细菌性痢疾
- B 阿米巴痢疾
- C 细菌性食物中毒
- D 霍乱
- E 病毒性肠炎

33、女，20岁，民工，急起腹泻，呕吐6小时，共吐、泻30余次，开始为黄色稀便，后转为清水样便，就诊时大便已无法计数，成米泔水样，患者裤、被均被污染。查体：体温 $^{\circ}\text{C}$ ，脉搏110次/分，血压68/46mmHg，大便常规：米泔水样，RBC 0-2/HP，WBC 0-3/HP。大便悬滴可见穿梭状快速运动的细菌。最可能的诊断是：

- A 中毒性菌痢
- B 细菌性食物中毒
- C 霍乱
- D 病毒性肠炎
- E 化学性食物中毒

34、重型霍乱患者常有腓肠肌及腹直肌痉挛，其机理是：

- A 低钙
- B 低钾
- C 碱中毒
- D 低钠
- E 低氯

35、流脑脑膜炎期最常见典型病变是：

- A 血管内皮损害，血管壁有炎症、坏死和血栓形成
- B 内脏血管损害，内皮细胞坏死，脱落和血栓形成
- C 大脑两半球及颅底的软脑膜充血、浆液性和纤维蛋白性渗出，出现大量中性粒细胞

D 大脑皮质、丘脑和中脑神经细胞变性和坏死

E 脑水肿，脑疝形成

36、感染脑膜炎球菌后，最常见的感染类型是：

A 隐性感染

B 出血点型

C 上呼吸道炎型

D 典型化脓性脑膜炎

E 带菌者

37、男，5岁，突起畏寒，高热，烦躁不安6小时，查体：体温40℃，脉搏120次/分，血压71/60mmHg，神志不清，压眶有反应，瞳孔等大，对光反应存在，全身皮肤满布出血点及大量瘀斑，颈软，克、布氏征(-)，血象：WBC $20 \times 10^9/L$ ，N，L，尿：蛋白

(±)，镜检(-)，最可能的诊断是：

A 中毒性痢疾

B 流行性出血热

C 革兰阴性杆菌败血症

D 流脑，普通型

E 流脑，暴发型休克型

38、暴发型脑膜脑炎型流脑的治疗，除抗生素外，治疗的重点是：

A 物理降温

B 必要时气管切开，正压呼吸

C 兴奋呼吸中枢

D 肾上腺皮质激素

E 脱水，减轻脑水肿

螺旋体感染

39、男，20岁，持续发热7天于7月20日入院，伴畏寒，周身酸痛，乏力，鼻衄，食欲减退。查体：巩膜明显黄染，胸前区可见出血点，肝肋下1CM，脾未及。实验室检查：WBC $10 \times 10^9/L$ ，N，L，，尿胆红素+，尿胆元+，尿蛋白++，尿镜检白细胞数0-3/HP，血清总胆红素100umol/L，血清谷丙转氨酶150u。最可能的诊断是：

- A 急性病毒性肝炎
- B 流行性出血热
- C 钩体病
- D 流行性感冒
- E 革兰阴性杆菌败血症

40、某班学生 7 月 25 日到农村收割水稻，8 月 1 日至 5 日连续有 7 名学生发病，均有发热，畏寒，乏力，周身酸痛，小腿痛，重者不能行走，结膜充血，2 人轻咳，痰中带血丝，3 人腹股沟淋巴结肿痛。查：WBC (7-13) ×10⁹/L，尿蛋白微量至+，最可能的诊断是：

- A 流行性感冒
- B 流行性出血热
- C 钩体病
- D 沙门菌属感染
- E 支气管肺炎

41、溶组织阿米巴的致病型是：

- A 包囊
- B 小滋养体
- C 大滋养体
- D 裂殖体
- E 配子体

42、男，30 岁，农民，腹痛，腹泻半个月，大便 4-8 次/天，量多，暗红色，有腥臭，肉眼可见血液及粘液，无发热，左下腹隐痛。大便镜检：WBC+/HP，RBC+++ /HP。最可能的诊断是：

- A 急性菌痢
- B 血吸虫病
- C 弯曲菌肠炎
- D 阿米巴痢疾
- E 慢性非特异性溃疡性结肠炎

43、男，20 岁，间歇性畏寒，寒战，发热半年，约每月发作 1 次，每次持续 7-10 天，近 1 个月来出

现面部水肿，尿量减少，血压升高，尿蛋白++，尿红细胞 3-6/HP，血涂片发现间日疟原虫。应诊断为：

- A 疟疾
- B 急性肾小球肾炎
- C 肾病综合征
- D 疟疾并发急性肾小球肾炎
- E 疟疾并发肾病综合征

44、急性血吸虫病血象检查最突出的特点是：

- A 中性粒细胞显著增多
- B 嗜酸粒细胞显著增多
- C 嗜碱粒细胞显著增多
- D 肥大细胞显著增多
- E 血小板显著增多

45、血吸虫病肠道并发症最常见的是：

- A 阑尾炎
- B 肠穿孔
- C 结肠癌
- D 不完全性肠梗阻
- E 肠出血

46、关于免疫反应的概念，下列哪项是错误的

- A 机体的免疫反应对传染过程的表现和转归起着重要作用
- B 所有免疫反应都是对机体有利的
- C 免疫反应可分为非特异性免疫和特异性免疫
- D 特异性免疫包括细胞免疫和体液免疫
- E 变态反应都是特异性免疫反应

47、下列传染病中，感染性休克最少见的是：A 细菌性痢疾

- B 霍乱
- C 败血症
- D 流行性出血热
- E 流行性脑脊髓膜炎

48、接种下列制剂可获主动免疫，除外：

- A 活疫苗
- B 灭活疫苗
- C 菌苗
- D 抗毒素
- E 类毒素

49、传染病的基本特征应除外：

- A 有病原体
- B 有传染源
- C 有流行病学特征
- D 有感染后免疫
- E 有发热

50、下列均可作为传染源，除外：

- A 显性感染
- B 隐性感染
- C 潜伏性感染
- D 病原携带状态
- E 受感染的动物

51、关于隐性感染，下列叙述哪项不正确：

- A 无或仅有轻微组织损伤
- B 无症状、体征甚至生化改变
- C 不能通过免疫学检查发现
- D 有的可转变为病原携带状态
- E 有的传染病几无隐性感染存在

52、关于老年人乙型肝炎，下列哪项是错误的

- A 60 岁以上老年人组乙型肝炎发病率较其他年龄组高
- B 黄疸发生率高，黄疸深
- C 淤胆型多见
- D 重症型比率高
- E 并发症多

53、在原有 HBV 感染的基础上 HDV 重叠感染，可能性最小的结果是：

- A 诱发急性肝炎
- B 诱发重症肝炎
- C 原有 HBV 感染的减轻或清除
- D 发展为慢性肝炎
- E 演变为肝硬化

54、关于戊型肝炎的流行病学，下列哪项是错误的

- A 传染源为病人和亚临床感染者
- B 水源或食物污染可引起暴发性流行
- C 流行无季节性
- D 青壮年组发病率最高
- E 病后有一定免疫力

55、关于戊型肝炎的临床特点，下列哪项是错误的

- A 发病急，多有发热
- B 黄疸常见
- C 可发展为慢性肝炎
- D 妊娠后期患戊型肝炎易并发重症型肝炎和 DIC
- E 有的患者皮肤瘙痒和淤胆比较明显

56、列哪项不是乙脑常见的临床表现

- A 稽留热
- B 意识障碍
- C 中枢性呼吸衰竭
- D 外周性呼吸衰竭
- E 循环衰竭

57、关于乙脑的抽搐，下列哪项是错误的

- A 通常继发于脑实质炎症及脑水肿
- B 多见于病程第 2-5 天
- C 可为手、足、面部局部抽搐或肢体阵挛性或全身强直性抽搐
- D 多不伴有意识障碍

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/098126051124006036>