

## 康复医学测试题与答案

1、CT 检查中, 血管内注射对比剂后, 根据被扫描脏器的血供特点, 在不同延迟时间内进行的扫描属于( )。

- A、 平扫
- B、 增强扫描
- C、 造影扫描
- D、 高分辨率 CT 扫描
- E、 时相扫描

答案: E

2、对于椎弓峡部裂引起腰椎 I 度滑脱腰痛的患者, 不适宜的治疗是( )。

- A、 佩戴腰围
- B、 药物镇痛
- C、 中频电疗
- D、 旋扳手法复位
- E、 腰腹肌训练

答案: D

3、就单根纤维而言, 与阈强度刺激相比较刺激强度增加一倍时, 动作电位的幅度( )。

- A、 增加一倍
- B、 增加二倍
- C、 减少一倍
- D、 减少二倍
- E、 保持不变

答案: E

4、物体发热的能量以光的速度沿直线向周围传播的过程称为( )。

- A、 传导
- B、 对流
- C、 辐射
- D、 蒸发
- E、 沸腾

答案: C

5、臂丛神经不包括( )。

- A、 肩胛背神经
- B、 肌皮神经
- C、 桡神经

D、 胸长神经

E、 膈神经

答案： E

6、 能防止甚至逆转血管壁增厚和心肌肥大的抗高血压药是( )。

A、 利尿药

B、  $\beta$  受体拮抗剂

C、 钙离子通道阻滞剂

D、 血管紧张素转换酶抑制剂

E、  $\alpha$  受体拮抗剂

答案： D

7、 为清楚显示颅骨骨折, 首选的检查方法是( )。

A、 放射性核素检查

B、 CT 检查

C、 MRI 检查

D、 脑血管造影检查

E、 超声检查

答案： B

8、 强直性脊柱炎最先累及的关节是( )。

A、 指间关节

B、 腕关节

C、 骶髂关节

D、 膝关节

E、 肩关节

答案： C

9、 运动性失语症和感觉性失语症区别在于( )。

A、 感觉性失语症患者有“口语领悟困难”, 运动性失语症患者能理解他人语言

B、 感觉性失语症患者没有“口语领悟困难”, 运动性失语症患者能理解他人语言

C、 感觉性失语症病灶位于 Broca 区, 运动性失语症病灶位于 Wernicke 区和听觉联络区

D、 感觉性失语症患者听觉异常, 运动性失语症患者构音器官的活动并无障碍

E、 感觉性失语症患者听觉正常, 运动性失语症患者能构成语言

答案： A

10、非特异性免疫的特点不包括( )。

- A、 后天获得
- B、 先天具有
- C、 无特异性
- D、 无记忆性
- E、 作用快而弱

答案： A

11、物理治疗的缩写是( )。

- A、 PT
- B、 OT
- C、 ST
- D、 RT
- E、 NS

答案： A

12、慢性阻塞性肺病最常见的肺实质病理改变是( )。

- A、 小叶中央型肺气肿
- B、 全小叶型
- C、 混合型
- D、 肺血管壁破坏
- E、 肺毛细血管床破坏

答案： A

13、主动关节活动度训练的目的不包括( )。

- A、 改善心血管功能
- B、 维持关节的活动范围
- C、 消除骨关节肿瘤
- D、 增强关节周围肌力
- E、 提高关节的稳定性

答案： C

14、使静脉回流量减少的因素是( )。

- A、 体循环平均充盈压升高
- B、 心脏收缩力量加强
- C、 由卧位转为立位
- D、 有节律的慢跑
- E、 吸气时相

答案： C

15、用记事本和购物清单帮助记忆,此方法属于( )。

- A、 视觉记忆训练法
- B、 提示法
- C、 代偿
- D、 PQRST 法
- E、 自身参照法

答案: B

16、针对表面不新鲜的溃疡,紫外线照射的剂量应为( )。

- A、 亚红斑量
- B、 阈红斑量
- C、 弱红斑量
- D、 强红斑量
- E、 超强红斑量

答案: C

17、影响声强的因素不包括( )。

- A、 声压
- B、 振幅
- C、 频率
- D、 介质体积
- E、 介质密度

答案: D

18、对于平衡能力差的病人宜选用( )。

- A、 T 形单足手杖
- B、 问号形单足手杖
- C、 肘杖
- D、 四足手杖
- E、 前臂杖

答案: D

19、注意力训练包括( )。

- A、 背诵法
- B、 猜测游戏
- C、 分解-联合
- D、 提示法
- E、 视觉联想法

答案: B

20、刘某,男,26岁。因车祸入院,经神经系统检查发现病人上腹壁反射消失,提示病人病损部位在( )。

- A、 胸髓 3~4 节段
- B、 胸髓 5~6 节段
- C、 胸髓 7~8 节段
- D、 胸髓 9~10 节段
- E、 胸髓 11~12 节段

答案: C

21、膝关节损伤最常见的临床表现是( )。

- A、 关节间隙卡压感
- B、 疼痛
- C、 弹响
- D、 肌萎缩
- E、 关节内积液

答案: B

22、传染期出现最多的急性活动期、感染早期标志物是( )。

- A、 HBsAg
- B、 抗-HBs
- C、 HBeAg
- D、 抗-HBe
- E、 抗-HBc

答案: C

23、患者男,22岁。因“腰部屈伸活动受限半年”入院,诊断考虑“强直性脊柱炎”。治疗方法一般不包括( )。

- A、 药物治疗
- B、 物理治疗
- C、 功能训练
- D、 牵引疗法
- E、 手术治疗

答案: D

24、紫外线中心重叠照射时病灶周围通常采用什么剂量?( )

- A、 超强红斑量
- B、 强红斑量
- C、 中红斑量
- D、 弱红斑量

E、 亚红斑量

答案： C

25、患者女, 50 岁。行盆腔手术后卧床第 8 天下床, 自觉左小腿后方疼痛, 足部、踝部有水肿, 用手压迫小腿肌肉两侧或将足部向背侧屈曲时, 引起腓肠肌疼痛。应考虑的诊断是( )。

- A、 大隐静脉血栓性静脉炎
- B、 小腿肌肉静脉血栓形成
- C、 髂股静脉血栓形成
- D、 血栓性闭塞性脉管炎
- E、 下肢静脉、动脉反应性痉挛

答案： B

26、不属于作业治疗范畴的是( )。

- A、 日常功能活动训练
- B、 电疗法
- C、 轮椅训练
- D、 手眼协调性训练
- E、 认知训练

答案： B

27、运动疗法治疗高血压的机制不包括( )。

- A、 增加血容量
- B、 降低外周阻力
- C、 调整自主神经功能
- D、 血管运动中枢适应性改变
- E、 内分泌调整

答案： A

28、患者女, 67 岁。脑梗塞后言语不利 20 天。查体: 张口困难, 舌运动困难, 发音不清, 听理解、阅读理解、书写正常。应进行的评定是( )。

- A、 失语症评定
- B、 构音障碍评定
- C、 心理评定
- D、 认知评定
- E、 感知评定

答案： B

29、肘关节上方桡神经损伤, 表现为( )。

- A、 爪形手

- B、远节指间关节屈曲受限
- C、猿手畸形
- D、各伸肌瘫痪、垂腕
- E、手部尺侧、环指尺侧和小指背侧感觉障碍

答案：D

30、佝偻病初期的骨骼 X 线特点为( )。

- A、可正常或钙化带稍模糊
- B、长骨钙化带消失
- C、骨质稀疏
- D、骨皮质变薄
- E、干骺端呈毛刷状改变

答案：A

31、躯体运动中枢位于( )。

- A、中央前回及中央旁小叶后部
- B、中央前回及中央旁小叶前部
- C、颞横回
- D、角回
- E、扣带回

答案：B

32、第一秒最大用力呼气容量称为( )。

- A、肺活量
- B、时间肺活量
- C、最大吸氧量
- D、峰值吸氧量
- E、无氧阈

答案：B

33、食物滞留于会厌谷时宜采用的吞咽辅助动作是( )。

- A、空吞咽
- B、交互吞咽
- C、侧方吞咽
- D、点头样吞咽
- E、声门上吞咽

答案：D

34、患者在平行杠内进行步行训练时,最先进行的训练项目是( )。

- A、身体重心的转移训练

- B、同时拖地步行
- C、摆至步训练
- D、摆过步训练
- E、四点步训练

答案：A

35、不适合慢性软组织损伤的治疗是( )。

- A、服用镇痛药
- B、中频电疗法
- C、局部封闭
- D、运动疗法
- E、制动

答案：E

36、手指头感染已形成脓肿时,治疗原则为( )。

- A、冷敷
- B、热敷
- C、切开引流
- D、抗生素
- E、无温量超短波

答案：C

37、患者男,72岁。2月前出现左侧身体乏力,记忆力减退,诊断为:右侧脑梗死,目前肢体功能恢复良好,仍存在记忆力减退,下列属于针对患者记忆功能减退进行的康复治疗是( )。

- A、Rood法
- B、Schuel刺激促进法
- C、PQRST法
- D、Bobath法
- E、Vojia法

答案：C

38、左房室口处的瓣膜是( )。

- A、三尖瓣
- B、二尖瓣
- C、主动脉瓣
- D、肺动脉瓣
- E、肌性隔膜

答案：B

39、轮椅放置脚踏板时,板面离地的距离至少为( )。

- A、 2cm
- B、 3cm
- C、 4cm
- D、 5cm
- E、 6cm

答案: D

40、颈椎病的牵引重量多为( )。

- A、 3~6kg
- B、 6~15kg
- C、 10~18kg
- D、 12~20kg
- E、 25~40kg

答案: B

41、检查者被动屈伸偏瘫侧肘关节,伸肘一半后感到阻力稍增加,按改良Ashworth 分级为( )。

- A、 伸肘肌痉挛 1 级
- B、 伸肘肌痉挛 1+级
- C、 伸肘肌痉挛 2 级
- D、 伸肘肌痉挛 3 级
- E、 伸肘肌痉挛 4 级

答案: B

42、颈椎发生轴性旋转的是( )。

- A、 C1~C2
- B、 C2~C3
- C、 C3~C4
- D、 C4~C5
- E、 C5~C6

答案: A

43、治疗新生儿高胆红素血症应选用( )。

- A、 超短波
- B、 远红外线
- C、 氦氖激光
- D、 蓝紫光
- E、 药物治疗

答案：D

44、关闭后不能立即开启的治疗灯( )。

- A、 碳棒红外线灯
- B、 白炽灯
- C、 荧光灯
- D、 高压汞灯
- E、 低压汞灯

答案：D

45、下列关于下呼吸道的描述不正确的是( )。

- A、 左支气管细长且较倾斜
- B、 右支气管粗短且较陡直
- C、 气管上端平第6颈椎,在胸骨角平面分为左右支气管
- D、 下呼吸道包括气管和支气管
- E、 异物容易落入左支气管

答案：E

46、残疾的预防分级为( )。

- A、 一级
- B、 二级
- C、 三级
- D、 四级
- E、 五级

答案：C

47、在直流-感应电诊断中,神经对直流电刺激无反应,肌肉对直流电的反应存在,结果属于( )。

- A、 绝对变性反应
- B、 完全变性反应
- C、 部分变性反应
- D、 变性反应
- E、 无明显变化

答案：B

48、下呼吸道的组成成分包括( )。

- A、 鼻
- B、 喉
- C、 咽
- D、 口腔

E、 气管

答案： E

49、 佝偻病不宜采用的治疗措施是( )。

A、 日光疗法

B、 药物治疗

C、 超短波疗法

D、 紫外线疗法

E、 按摩疗法

答案： C

50、 当肩关节外展超过  $30^\circ$  时, 孟肱关节和肩胛胸壁关节运动幅度的比例为( )。

A、 1:1

B、 1:2

C、 2:1

D、 3:1

E、 4:1

答案： C

51、 心室舒张时, 防止血液逆流的装置有( )。

A、 二尖瓣和三尖瓣

B、 主动脉瓣和二尖瓣

C、 肺动脉瓣和三尖瓣

D、 主动脉瓣和三尖瓣

E、 主动脉瓣和肺动脉瓣

答案： E

52、 超声波治疗的剂量单位是( )。

A、  $\text{g}/\text{cm}^2 \cdot \text{s}$

B、  $\text{W}/\text{cm}^2$

C、  $\text{m}/\text{s}$

D、  $\text{kPa}$

E、  $\text{W}$

答案： B

53、 心动周期中, 左心室内压升高速率最快的时相是在( )。

A、 心房收缩期

B、 等容收缩期

C、 快速射血期

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/105132131243011102>