

眼科模拟试题与答案

1、生理盲点是视神经乳头投射到视野上所表示的一个暗点，它是属于什么性质的()

- A、病理性
- B、生理性
- C、相对性
- D、阵发性
- E、连续性

答案：B

2、中间葡萄膜炎诊断依据典型体征有()

- A、出现飞蚊症并有加重
- B、玻璃体雪球样混浊、雪堤样改变
- C、视神经萎缩
- D、视网膜新生血管
- E、黄斑囊样水肿

答案：B

3、下列有关眼外伤处理的叙述中，错误的是()

- A、有生命危险时首先抢救生命
- B、对于化学伤，应当争分夺秒地应用大量水冲洗眼部
- C、对开放性损伤，应当注射抗破伤风血清
- D、对于眼球贯通伤，切忌挤压眼球
- E、如果合并眼睑裂伤，应当先缝合眼睑伤口，然后再修复眼球

答案：E

4、世界上首次分离出沙眼衣原体的是()

- A、中国
- B、美国
- C、澳大利亚
- D、荷兰
- E、瑞典

答案：A

5、哪一种感染性角膜炎起病急骤，发展迅速。()

- A、棘阿米巴角膜炎
- B、单纯疱疹病毒性角膜炎
- C、真菌性角膜炎
- D、细菌性角膜炎

答案：D

6、关于眼眶的说法，下列不正确的是()

- A、为四边形锥形骨腔
- B、眼眶深度为 4~5cm
- C、眼眶外侧壁较厚
- D、鼻窦的病变常波及眶内
- E、眶内病变不会波及颅内

答案：E

7、导致弱势的原因不包括()

- A、先天性白内障
- B、先天性黄斑缺损
- C、斜视
- D、屈光不正
- E、不恰当的遮盖治疗

答案：B

8、关于眼的血液供应，正确的是()

- A、眼球血供来自颈外动脉的眼动脉
- B、眼动脉经眶下裂入眼内
- C、眼动脉在眶隔的前方后支
- D、视网膜中央动脉不属于终末动脉
- E、眼动脉的视网膜中央动脉系统和睫状动脉系统

答案：E

9、葡萄膜炎最常见的是()

- A、前葡萄膜炎
- B、中间葡萄膜炎
- C、后葡萄膜炎
- D、交感性眼炎
- E、视网膜脉络膜炎

答案：A

10、1m 光定位是检查哪部分组织的功能()

- A、晶状体混浊程度
- B、视网膜黄斑部
- C、黄斑部以外周边部视网膜
- D、视盘部
- E、眼球运动

答案：C

11、结膜囊冲洗时洗眼壶距眼球的距离为()

- A、1~2cm
- B、2~3cm
- C、3~4cm
- D、4~5cm
- E、4~6Ccm

答案：C

12、临床上使用下列哪种浓度的荧光素钠静脉注射进行眼底荧光血管造影?
()

- A、2%
- B、5%
- C、10%
- D、12%
- E、15%

答案：C

13、下列有关急性泪囊炎的叙述中，正确的是()

- A、急性泪囊炎治疗不及时可引起慢性泪囊炎
- B、应及时行鼻腔泪囊吻合术
- C、即使严重时也不会产生全身症状
- D、炎症仅仅局限于泪囊部
- E、尽早应用抗生素治疗

答案：E

14、眼部游离皮片的供皮区常选择()

- A、面颊部
- B、上臂内侧
- C、临近眼睑部位
- D、腹部
- E、大腿内侧

答案：C

15、黄斑中心凹是在胚胎期()出现。

- A、3个月时
- B、4个月时
- C、5个月时
- D、6个月时

E、7个月时

答案：E

16、慢性泪囊炎主要症状为()

A、结膜充血

B、下睑皮肤出现湿疹

C、脓性分泌物

D、溢泪

E、泪囊扩张

答案：D

17、糖尿病患者行白内障摘除手术时，血糖应控制在()mmol/L 以下

A、7.0

B、7.3

C、8.0

D、8.3

E、9.0

答案：D

18、虹膜主要由基质层和色素上皮层构成，其基质层是为()

A、致密的色素和瞳孔括约肌构成

B、疏松的结缔组织和虹膜色素细胞构成

C、基质内色素细胞和神经、血管构成

D、基质内扁平细胞和虹膜色素细胞构成

E、基质内扁平细胞和瞳孔开大肌构成

答案：B

19、下列检查中，最适宜眼眶骨折的检查是()

A、X线摄片

B、超声波

C、CT

D、MRI

E、以上都不是

答案：C

20、以下有关共同性斜视的说法不正确的是()

A、两眼视轴不呈分离状态

B、眼球运动无障碍

C、第一斜视角等于第二斜视角

D、无复视

E、各注视方向斜视度无明显差异

答案：A

21、患儿，12岁，右上睑痛3天，查体：右上睑局限压痛性结节，睑结膜面局限充血；应诊断为：（ ）

A、麦粒肿

B、外麦粒肿

C、霰粒肿

D、睑板腺癌

E、以上都有可能

答案：A

22、视路是指视觉信息传导到大脑枕叶视中枢的径路，其开始部位起自于：（ ）

A、视网膜光感受器

B、视乳头

C、视神经

D、视交叉

E、视盘

答案：A

23、内眼手术前护理不包括（ ）

A、剪睫毛

B、冲洗结膜囊

C、冲洗泪道

D、眼部热敷

E、滴抗生素眼液

答案：D

24、对眼科病人的术前护理错误的是（ ）

A、向病人介绍病区环境

B、说明手术的必要性及过程

C、解释术前术后常规处理的重要性

D、根据手术需要做术前指导

E、指导病人术前吃饱

答案：E

25、下面哪项不是晶状体异位、脱位的并发症？（ ）

A、葡萄膜炎

B、继发性青光眼

- C、巩膜炎
- D、视网膜脱离
- E、屈光不正

答案：C

26、视乳头位于黄斑内侧，其直径为()

- A、小于 1mm
- B、2mm
- C、1mm
- D、2.5mm
- E、1.5mm

答案：E

27、哪种结膜炎不常出现耳前淋巴结肿大和压痛()

- A、春季结膜炎
- B、流行性角结膜炎
- C、流行性结膜炎
- D、衣原体性结膜炎
- E、淋球菌性结膜炎

答案：A

28、儿童最常见的原发性眼恶性肿瘤是()

- A、眼睑基底细胞癌
- B、眼睑鳞状细胞癌
- C、眼睑恶性黑色素瘤
- D、脉络膜恶性黑色素瘤
- E、视网膜母细胞瘤

答案：E

29、延长泪液在结膜囊内停留时间的方法有()

- A、泪小点封闭
- B、硅胶眼罩
- C、湿房镜
- D、潜水镜
- E、以上均可

答案：E

30、滴眼药水技术中，护理人员应嘱患者()

- A、向颞侧注视
- B、向内眦注视

- C、向上方注视
- D、向下方注视
- E、向任意方向注视

答案：C

31、球后麻醉属于()

- A、浸润麻醉
- B、传导阻滞麻醉
- C、球筋膜下麻醉
- D、全麻
- E、以上均不是

答案：B

32、患者，女，48岁，6年前无明显诱因右眼出现泪溢，遇冷风或冬季明显，无眼痛、眼红。查体见泪囊区轻度隆起，诊断为“慢性泪囊炎”，行右鼻腔泪囊吻合术。以下围手术期护理要点哪项不正确()

- A、术前3天滴用抗菌素眼药水
- B、术前1天用1%麻黄素液滴鼻
- C、术后安静半卧位休息
- D、注意鼻腔填塞物位置
- E、如有鼻腔内有渗血及时擤出，以免误吸

答案：E

33、眼外肌包括()条。

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8
- E、9

答案：B

34、流泪主要是由于()

- A、泪小点的阻塞
- B、泪小管的阻塞
- C、鼻泪管的阻塞
- D、鼻腔粘膜的肿胀
- E、泪液的分泌增多

答案：E

35、视网膜糖代谢的主要方式为()

- A、有氧氧化
- B、无氧酵解
- C、磷酸戊糖途径
- D、多元醇途径
- E、以上都不正确

答案：B

36、角膜横径为()

- A、11mm
- B、11.5~12.5mm
- C、12~12.5mm
- D、13mm
- E、13.5mm

答案：B

37、行泪道冲洗时，错误的是()

- A、先挤压泪囊区
- B、操作应轻稳
- C、插入针头应缓慢
- D、针头垂直插入下泪点
- E、针头垂直插入泪小管

答案：E

38、眼压是指()

- A、眼眶对眼球的压力
- B、眼内血管压力
- C、眼球内容物对眼球壁的压力
- D、以上各种压力的综合
- E、与以上各种压力无关

答案：C

39、正常人眼球向前方平视时，一般突出于外侧眶缘约()

- A、11~12mm
- B、12~13mm
- C、12~14mm
- D、14~15mm
- E、13~14mm

答案：C

40、健眼全遮盖疗法()

- A、一直遮盖健眼
- B、遮盖健眼 1 天，去遮盖 1 天
- C、遮盖健眼 2 天，去遮盖 1 天
- D、遮盖健眼 6 天，去遮盖 1 天
- E、遮盖健眼 1~6 天，遮盖弱视眼或去遮盖 1 天

答案：E

41、泪腺炎治疗原则为()

- A、局部治疗
- B、怀疑肿瘤，宜行病理检查
- C、针对病因
- D、全身应用抗生素或抗病毒药
- E、以上全是

答案：C

42、慢性闭角型青光眼与原发开角型青光眼鉴别的最重要的依据是()

- A、房角是否关闭
- B、病人的症状
- C、眼压是否高
- D、视野是否损害
- E、眼部充血的情况

答案：A

43、下列有关糖尿病性视网膜病变的护理不正确的是()

- A、严格控制血糖
- B、每年散瞳检查眼底
- C、指导病人按医嘱用药
- D、如有眼痛、虹视、视力突然下降、视野突然缺损等及时就医
- E、如需手术按外眼手术前准备

答案：E

44、女，24 岁双眼屈光不正（近视），近半年来更换了 3 次眼镜。查体：角膜前弹力层自发破裂，浅层混浊，眩光，后弹力层破裂，基质层水肿，并且其祖父也有同样的情况。请问：是什么病 其主要的体症应是什么 ()

- A、细菌性角膜炎 角膜混浊
- B、梅毒性角膜炎 角膜新生血管
- C、角膜基质炎 畏光 流泪
- D、圆锥角膜 角膜出现向前突起的圆锥
- E、病毒性角膜炎 疼痛、畏光

答案：D

45、关于真菌性角膜炎的叙述，错误的是()

- A、多有植物性角膜外伤史
- B、有长期使用激素和抗生素史
- C、起病急骤
- D、前房积脓呈灰白色，粘稠或呈糊状
- E、有时在角膜感染病灶旁可见“伪足”或“卫星样”浸润病灶

答案：C

46、耳前淋巴结肿大常见于：()

- A、病毒性结膜炎
- B、慢性结膜炎
- C、过敏性结膜炎
- D、变性性结膜炎
- E、急性细菌性结膜炎

答案：A

47、玻璃体中含量最多的是()

- A、维生素C
- B、胶原纤维
- C、透明质酸
- D、蛋白质
- E、水分

答案：E

48、患儿，男性，三岁，发现左眼外斜三个月。检查：晶状体绕核性混浊，扩瞳检查眼底无异常，全身情况尚可。询问病史家族中无此类患者，母亲妊娠无感冒及风疹感染史，但常有手足抽搐，当时检查有低血钙与高血磷。最可能的诊断为()

- A、外伤性白内障
- B、先天性白内障
- C、代谢性白内障
- D、先天性风疹综合征
- E、视网膜母细胞瘤

答案：B

49、共同性外斜视的主要治疗方法是()

- A、屈光矫正
- B、遮盖法

- C、手术矫正眼位
- D、集合训练
- E、同视机训练

答案：C

50、结膜最常见的疾病是()

- A、结膜炎
- B、翼状胬肉
- C、睑裂斑
- D、结膜皮样脂肪瘤
- E、结膜血管瘤

答案：A

51、锯齿缘是指()

- A、睫状体冠状突与扁平部的分界
- B、睫状体与玻璃体的分界
- C、睫状体扁平部与视网膜的分界
- D、视网膜周边部与后极部的分界
- E、玻璃体基底部附着处

答案：C

52、测远视力时，错误的是()

- A、视力表挂在光线充足的地方
- B、视力表中 4.0 行与眼平行
- C、用对数视力表应采用 5 分记录法
- D、先测右眼再测左眼
- E、自上而下依次辨认视标

答案：B

53、原发性青光眼具有下列临床特征()

- A、眼压升高
- B、眼底的青光眼改变
- C、青光眼性视野缺损
- D、以上全项

答案：D

54、高度近视是指近视度数在()及以上的屈光不正状态。

- A、200 度
- B、400 度
- C、600 度

D、800 度

答案：C

55、被检查者站在视力表前 3m 处，若能看清最大字母、其远视力为()

A、0.08

B、0.07

C、0.06

D、0.05

E、0.04

答案：C

56、眼内动脉来自()

A、颈内动脉

B、颈外动脉

C、大脑前动脉

D、大脑中动脉

E、大脑后动脉

答案：A

57、引起倒睫的各种原因中最为常见的原因是()

A、睑缘炎

B、沙眼

C、睑腺炎

D、睑外伤

E、睑烧伤

答案：B

58、眼科手术后，护士嘱病人控制咳嗽，不要用力排便是为()

A、防止伤口感染

B、防止发生后发障

C、防止眼内出血

D、防止发生青光眼

E、防止视网膜脱离

答案：C

59、有关溃疡性睑缘炎，不正确的是()

A、是睫毛毛囊及其附属腺体的慢性或亚急性化脓性炎症

B、睑缘充血，睫毛根部去除痂皮后有溃疡出现，但不会破坏毛囊形成秃睫

C、眼部有痒、痛和烧灼感

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/107126032051006043>