

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤与性病学考试题三

1、单选 一女性因发热,口服先锋霉素后全身发生散在的红斑,其上发生松弛水疱,如烫伤样表现,黏膜也有大片坏死伴高热,最可能的诊断是( )。

- A. 大疱性表皮松解型药疹
- B (江南博哥). 剥脱性皮炎型药疹
- C. 麻疹样红斑型药疹
- D. 固定型药疹
- E. 湿疹型药疹

**正确答案:** A

**参考解析:** 大疱性表皮松解型药疹为服用青霉素类药物后,全身发生散在的红斑,其上发生松弛性水疱,如烫伤样。

2、单选 表皮内的淋巴细胞主要是( )

表皮内的淋巴细胞主要是( )

- A.  $CD3^+$  T细胞
- B.  $CD4^+$  T细胞
- C.  $CD8^+$  T细胞
- D. B 细胞

**正确答案:** C

3、单选 有关天疱疮的临床特征的描述不正确的是( )。

- A. 自身免疫性表皮内大疱病
- B. 壁易破裂,易渗出,糜烂
- C. 免疫病理示棘细胞间 IgG 和(或) C3 沉积
- D. 尼氏征阳性
- E. 表现为疱壁较厚、紧张不易破的大疱

**正确答案:** E

4、单选 关于皮脂腺下列叙述错误的是( )。

- A. 皮脂腺由腺泡和导管构成
- B. 腺体呈泡状,有腺腔
- C. 皮脂腺为全浆腺
- D. 导管由复层鳞状上皮构成
- E. 头、面及胸背上部等处皮脂腺较多

**正确答案:** B

**参考解析:** 腺体呈泡状,无腺腔,外层为扁平或立方形细胞。

5、单选 关于生殖器疱疹错误的是( )。

- A. 复发性生殖器疱疹最常见
- B. 1 年复发 6 次者为频繁复发
- C. 复发性生殖器疱疹常在原发性生殖器疱疹皮损消退后 1~4 个月以内复发

- D. 潜伏的 HSV II 较 HSV I 更易被激发致病  
E. 一般 50% 的 HSV I 和 70% 的 HSV II 感染在临床上无症状

**正确答案：** A

**参考解析：** 亚临床型生殖器疱疹最常见。

6、单选 哪一种病常有神经系统症状（）。

- A. 维生素 A 缺乏病  
B. 烟酸缺乏病  
C. 维生素 B 缺乏病  
D. 苔藓状皮肤淀粉样变  
E. 结节性黄色瘤

**正确答案：** B

7、单选 以下疾病容易发生皮肤癌的是（）。

- A. 先天性皮肤异色症  
B. 色素痣  
C. 毛周角化病  
D. 着色性干皮病  
E. 毛囊角化病

**正确答案：** D

8、单选 关于乳房外湿疹样癌的组织病理变化正确的是（）。

- A. 特征性的改变为表皮内 Paget 细胞，不侵犯表皮附属器  
B. 癌细胞对流涎黏蛋白染色为阴性  
C. 癌细胞对 PAS、阿辛蓝、胶性铁与黏液卡红染色可能均为阳性  
D. 继发性乳房外湿疹样癌 PAS 和阿辛蓝染色常为阴性  
E. 继发性乳房外湿疹样癌耐淀粉酶和透明质酸酶

**正确答案：** E

**参考解析：** 乳房外湿疹样癌病理见表皮内不等量的 Paget 细胞，在表皮附属器，特别是毛囊或小汗腺导管的上皮内也能见到，并能侵犯真皮。癌细胞对流涎黏蛋白染色均为阳性，而对 PAS、阿辛蓝、胶性铁与黏液卡红染色可能均为阴性。继发性乳房外湿疹样癌 PAS 染色阳性，耐淀粉酶，对阿辛蓝染色呈阳性，并耐透明质酸酶。

9、单选 患者，女，27 岁。孕 37 周，白带增多 6 天。查体：外阴正常，阴道充血，大量浆液脓性分泌物，宫颈红肿，II 度糜烂。宫颈分泌物培养可见沙眼衣原体。治疗上可选用（）。

- A. 多西环素  
B. 红霉素  
C. 氧氟沙星  
D. 甲硝唑  
E. 青霉素

**正确答案：**B

10、单选 以下关于板层状鱼鳞病的描述正确的是（）。

- A. 系常染色体显性遗传
- B. 皮损以肢体伸侧为重
- C. 常伴掌跖角化
- D. 面部皮肤正常
- E. 外阴无受累

**正确答案：**C

11、单选 莲子具有的功效是

- A. 敛肺止咳，益气生津，补益肝肾
- B. 涩肠止泻，益气生津，益肾养心
- C. 养心安神，益气生津，补脾止泻
- D. 涩肠止泻，益肾养心，固精止带
- E. 补脾止泻，益肾养心，固精止带

**正确答案：**E

12、单选 肠病性肢端皮炎的腹泻不包括（）。

- A. 90%的患者出现腹泻
- B. 表现为水样便或泡沫样便，恶臭
- C. 脓血便
- D. 伴恶臭
- E. 腹泻的发生常表现为加剧和缓解交替

**正确答案：**C

13、单选 皮肤病发生的内因不包括（）。

- A. 热水烫洗
- B. 胎传
- C. 代谢障碍
- D. 内分泌紊乱
- E. 血液循环障碍

**正确答案：**A

**参考解析：**外因包括物理性、动物性、植物性、化学性、微生物和寄生虫等。

14、单选 患者，女，妊娠 38 周，发现肛周赘生物 2 天，稍有痒感。自诉 2 个月前曾有外阴溃疡史，无痛，无痒，未诊治，自愈。配偶有婚外性生活史。查体：肛周可见数个暗红色、直径 1~3cm 的扁平疣状损害，基底宽，无蒂，表面少量渗液。首选的治疗是（）。

- A. 青霉类
- B. 激光治疗
- C. 红霉素
- D. 抗组胺类药物

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/115121000144011222>