

# 主治医师资格考试《内科》第四次综合测试卷（含答案）

一、单项选择题（共 130 题，每题 1 分）。

1、流行性出血热患者下列哪项病变不能作为本病病理诊断依据

- A、右心房出血
- B、后腹膜水肿，出血
- C、肾典型病变
- D、胃溃疡穿孔
- E、垂体前叶充血，出血坏死

**【参考答案】：** D

2、磺脲类降糖药物常见的不良反应是

- A、乳酸性酸中毒
- B、水肿
- C、肾功能受损
- D、肥胖
- E、低血糖

**【参考答案】：** E

3、患者，男性，25 岁，腹痛、腹泻和血便，肛周可见瘻管，常见于哪种疾病

- A、克罗恩病
- B、阿米巴肠病
- C、肠癌
- D、溃疡性结肠炎

E、血吸虫病

**【参考答案】：** A

4、引起班氏丝虫病发病与病变的主要是

A、成虫

B、微丝蚴

C、感染期幼虫

D、囊蚴

E、毛蚴

**【参考答案】：** A

5、关于垂体瘤放射治疗，正确的是

A、减小瘤体的疗效是肯定的

B、可迅速解除肿瘤对临近组织的压迫

C、常作为手术治疗的辅助治疗

D、较少引起腺垂体功能减退

E、多采用内放射治疗

**【参考答案】：** C

6、尿毒症最常见的死亡原因是

A、酸中毒

B、电解质紊乱

C、感染

D、脑出血

E、心功能不全

**【参考答案】：** E

7、预防高血压肾损的发生，血压应控制在

- A、平均动脉压达 100mmHg 以下，收缩压达 140mmHg 以下
- B、平均动脉压达 110mmHg 以下，收缩压达 140mmHg 以下
- C、平均动脉压达 105mmHg 以下，收缩压达 145mmHg 以下
- D、平均动脉压达 110mmHg 以下，收缩压达 150mmHg 以下
- E、平均动脉压达 120mmHg 以下，收缩压达 160mmHg 以下

**【参考答案】：** A

8、导致手足抽搐的原因是

- A、血浆中结合钙浓度升高
- B、血浆中结合钙浓度降低
- C、血浆中游离钙浓度降低
- D、血浆中游离钙浓度升高
- E、游离钙浓度升高，结合钙浓度降低

**【参考答案】：** C

9、慢性肺源性心脏病急性加重时，使用利尿剂可能引起

- A、低钾低氯性碱中毒
- B、代谢性酸中毒
- C、呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- D、呼吸性碱中毒合并代谢性酸中毒
- E、稀释性低钠血症

**【参考答案】：** A

10、成年肺结核最常见的类型是

- A、原发型肺结核

- B、亚急性血行播散性肺结核
- C、继发性肺结核
- D、结核性胸膜炎
- E、肺外结核

**【参考答案】：** C

11、在闭合性气胸时，通常不出现下列哪个临床症状

- A、突然发生
- B、呼吸困难和发绀
- C、患区叩诊音亢进
- D、患区呼吸音减弱
- E、纵隔向患侧移位

**【参考答案】：** E

12、女性，28岁，脐周隐痛伴腹泻一周，大便呈糊状，无黏液脓血，近半个月发热盗汗，钡剂灌肠示回盲部激惹征，为确诊应首先选哪项检查

- A、腹部平片
- B、剖腹探查
- C、结肠镜检查
- D、结核菌素检查
- E、大便常规检查

**【参考答案】：** C

13、日本血吸虫病的最主要感染的方式是

- A、注射途径
- B、母婴传播

- C、蚊虫叮咬
- D、因种田、捕鱼接触疫水
- E、呼吸道传播

**【参考答案】：** D

14、要确诊肝性脑病必须查

- A、血钠
- B、血氨
- C、血糖
- D、血常规
- E、血钾

**【参考答案】：** B

15、女性，58岁，10天前曾划破右下肢皮肤。3天来高热，伴皮肤淤点。查体：血压80 / 50mmHg(10.7 / 6.7kPa)。诊断为败血症、感染中毒性休克，经积极治疗后仍高热不退，且出现气急，未吸氧时PaO<sub>2</sub>45mmHg。X线示肺纹理增多、模糊，该患者出现呼吸困难的原因首先考虑为

- A、肺栓塞
- B、血源性肺脓肿
- C、左心功能不全
- D、ARDS
- E、合并支气管哮喘

**【参考答案】：** D

16、凝集试验是抗原、抗体反应，该试验阳性表明血清中存在的抗体是

- A、IgA

B、IgD

C、IgE

D、IgG

E、IgM

**【参考答案】：** E

17、确诊肺结核的主要的方法是

A、结核菌素试验

B、痰结核分枝杆菌检查

C、免疫学方法检测抗原

D、卡介苗接种

E、支气管镜检查

**【参考答案】：** B

18、上例患者若要进一步明确诊断，选择下列哪项检查较为合适

A、血清铁测定

B、骨髓涂片及骨髓活检

C、测血小板抗体

D、血清叶酸、维生素 B12 测定

E、红细胞渗透脆性试验

**【参考答案】：** B

19、男，58岁，明显肥胖，疑为糖尿病，下列哪项叙述是错的

A、三多一少症状并不是必备的条件

B、尿糖检查不一定阳性

C、空腹血糖一定升高

D、餐后 2 小时血糖大于 11. 1mmol / L

E、可进行口服糖耐量试验

**【参考答案】：C**

20、女性，58 岁，夜间从噩梦中醒来，感胸骨后压榨性闷痛，伴呼吸困难，胸痛及呼吸困难持续不能缓解，患者出现面色苍白，冷汗淋漓，血压明显下降，皮肤发绀，此发绀属于

A、缺血性发绀

B、淤血性发绀

C、混合性发绀

D、心性混血性发绀

E、肺性发绀

**【参考答案】：A**

21、腹腔渗出液常见于以下哪种疾病

A、结核性腹膜炎

B、重度营养不良

C、肾病综合征

D、肝硬化

E、慢性心功能不全

**【参考答案】：A**

22、下列属于内毒素的是

A、脂多糖

B、细菌素

C、肠毒素

D、破伤风毒素

E、白喉毒素

【参考答案】：A

23、颈内动脉系统供应眼部和大脑半球前

A、1 / 2 部分

B、3 / 5 部分

C、1 / 3 部分

D、3 / 4 部分

E、2 / 3 部分

【参考答案】：B

24、患者，女，38岁，2个月来智力下降，记忆力减退，体重增加10公斤，毛发脱落。可能的诊断为

A、甲状腺功能减退症

B、神经衰弱

C、脑梗死

D、甲状腺功能亢进症

E、单纯性肥胖

【参考答案】：A

25、女，28岁，浮肿、关节痛2个月。化验：查血 ALB25g / L，IgG 低于正常，血沉 120mm / h，ANA(±)，尿蛋白(++++)，尿糖(+)，尿RBC10—25个 / HP，WBC5~10个 / HP。最可能的诊断为

A、急性肾小球肾炎

B、慢性肾小球肾炎

C、糖尿病肾病

D、狼疮性肾炎



E、紫癜性肾炎

**【参考答案】：** D

26、由于大气污染、吸烟、工业经济发展导致的理化因子、生物因子吸入以及人口老龄化等因素，使哪些疾病发病率明显增加

A、肺癌、支气管哮喘

B、呼吸衰竭

C、病毒性肺炎

D、支原体肺炎

E、放射性肺炎

**【参考答案】：** A

27、下列哪项不是亚急性皮肤型红斑狼疮的皮疹特点

A、位于暴露部位

B、愈后不留瘢痕

C、呈对称性

D、皮疹局限

E、病变表浅

**【参考答案】：** D

28、肾病综合征诊断依据，不包括下列哪一项表现

A、高血压

B、大量蛋白尿

C、高胆固醇血症

D、低血浆白蛋白

E、水肿

**【参考答案】：** A

29、患者，女，28岁，水肿、关节痛2个月。化验：查血 ALB25g/L，IgG 低于正常，血沉 120mm/h，ANA(±)，尿蛋白(++++)，尿糖(+)，尿 RBC10~25个/HP，WBC5~10个/HP，最可能的诊断为

- A、慢性肾小球肾炎
- B、急性肾小球肾炎
- C、糖尿病肾病
- D、狼疮性肾炎
- E、紫癜性肾炎

**【参考答案】：** D

30、男性，35岁。阵发性右上腹痛2天，疼痛时大汗淋漓，向右肩放射，昨日大便呈黑色来诊。体检：巩膜轻度黄染，右上腹压痛，Mushy征(+)，肝压叩痛(+)，脾未扪及。最可能的诊断是

- A、胃溃疡并出血
- B、十二指肠溃疡并出血
- C、胃癌并出血
- D、胆道出血
- E、急性胃黏膜病变

**【参考答案】：** D

31、帕金森病常见下列哪种步态

- A、剪刀样步态
- B、慌张步态
- C、醉酒步态
- D、跨阈步态

E、摇摆步态

**【参考答案】：** B

32、蛲虫病的主要症状为

A、儿童烦躁不安等精神症状

B、腹泻与便秘交替出现

C、尿道刺激征及遗尿

D、因寄生于肠道而引起腹泻腹痛

E、肛周和会阴部瘙痒

**【参考答案】：** E

33、下述哪项不符合嗜酸性粒细胞性肺炎的临床表现

A、存在抗 IgA 抗体

B、血清 IgE 水平降低

C、外周血嗜酸性粒细胞明显增多

D、抗特异 IgG 抗体增高

E、速发型皮肤反应阳性

**【参考答案】：** B

34、下述哪项血清学检查对肝硬化的肝功能损害程度判断最有意义

A、谷丙转氨酶

B、谷草转氨酶

C、碱性磷酸酶

D、单胺氧化酶

E、白蛋白 / 球蛋白比例

**【参考答案】：** E

35、患者，女，45岁。出现双手遇冷变紫变白及疼痛3年，2年来颜面水肿、张口受限。查体：血压180/130mmHg，双肺VelCro啰音。化验：尿蛋白(++)，尿RBC10~20个/HP，血BUN20.8mmol/L，ANA阳性。该患者最可能的诊断是

- A、系统性红斑狼疮
- B、IgA肾炎
- C、系统性硬化病
- D、急性肾小球肾炎
- E、系统性血管炎

**【参考答案】：C**

36、二尖瓣门面积为2.0cm<sup>2</sup>时，下列提法哪项正确

- A、为二尖瓣轻度狭窄
- B、有明显的临床症状
- C、可无心尖部舒张期隆隆样杂音
- D、可无跨瓣压差存在
- E、一般不引起左心房扩大

**【参考答案】：A**

37、对激素依赖型肾病综合征最适合的治疗是

- A、中医药治疗
- B、应用细胞毒药物协同激素治疗
- C、加大激素用量
- D、使用抗凝疗法
- E、改用阿司匹林和双嘧达莫

**【参考答案】：B**

38、不是左心衰竭表现的是

- A、劳力性呼吸困难
- B、头晕、乏力
- C、咳嗽、咳痰
- D、少尿
- E、腹胀、恶心、呕吐

**【参考答案】：** E

39、男性，44岁。因气急伴腹胀半年，近1周来症状加重入院。体检：示气急半卧位，颈静脉怒张，心界不大，心尖搏动不明显。心率100次/min，律齐。心音减轻，各瓣膜区无杂音。两肺底有少量啰音。腹膨隆，肝肋下4指，有压痛，肝颈回流阳性。腹水征(+)，下肢不肿。血压12.5/11kPa(95/80mmHg)。心电图示低电压，胸导联T波低平。最可能的诊断是

- A、肝硬化腹水
- B、扩张型心肌病
- C、限制型心肌病
- D、缩窄性心包炎
- E、慢性心包炎

**【参考答案】：** D

40、下列哪项不是检验幽门螺杆菌的常用方法

- A、血培养
- B、快速尿素酶试验
- C、胃粘膜组织切片染色
- D、呼气试验
- E、血清抗幽门螺杆菌抗体检测

**【参考答案】：** A

41、当患者体内尿素氮过多时，可选用的紧急去除方法是

- A、免疫输血治疗
- B、置换输血治疗
- C、药物治疗
- D、大量补液
- E、替代输血治疗

**【参考答案】：** B

42、霍乱引起暴发流行最为重要传播形式

- A、接触病人
- B、食物污染
- C、苍蝇为媒介
- D、水源污染
- E、接触带菌者

**【参考答案】：** D

43、患者男性，50岁，头晕，夜尿增多，入院后非同日两次测量血压双上肢皆为155 / 90mmHg，下肢为170 / 100mmHg，父母均患高血压病。按WHO标准最可能诊断为

- A、白大衣性高血压
- B、临界性高血压
- C、血压正常
- D、原发性高血压
- E、以上都不是

**【参考答案】：** D

44、中国存在的血吸虫是

- A、曼氏血吸虫
- B、日本血吸虫
- C、间插血吸虫
- D、湄公血吸虫
- E、埃及血吸虫

**【参考答案】：** B

45、女，30岁，有结核病史，近期感腹胀、乏力、活动后气喘。查体：心尖搏动不易触及，心浊音界正常，心率120次/分，房颤律；颈静脉曲张，吸气时尤为明显；腹软，肝于右肋下3cm触及，腹水征(+)，双下肢轻度水肿；血压12.0/10.0kPa(90/75mmHg)。胸片：无肺淤血，主动脉弓小，上腔静脉扩张，心影大小正常。ECG：QRS波低电压，普遍导联T波低平，倒置。上述临床表现是

- A、右心功能不全
- B、左心功能不全
- C、心包缩窄心室充盈受阻
- D、心脏后负荷过重
- E、心脏前负荷过重

**【参考答案】：** C

46、能判明肝硬化并发上消化道出血部位和病因的实验室检查是

- A、X线钡餐造影
- B、肝功能测定
- C、粪便隐血检查
- D、B超
- E、胃镜

**【参考答案】：** E

47、患者，女，45岁，近2个月出现间断咳嗽，少量白痰。胸片示双肺门影增大，肺野清晰。胸部CT示双侧肺门及纵隔淋巴结肿大，不伴肺内阴影。双下肢可见结节性红斑，支气管灌洗液细胞分类结果：淋巴细胞占49%，中性粒细胞占4%。根据以上资料，患者最可能出现的检查结果为

- A、PPD 试验呈阳性反应
- B、贫血
- C、血钙降低
- D、抗核抗体滴度增高
- E、SACE 活性增高

**【参考答案】：** E

48、莱姆病持续感染期的临床表现特点是

- A、慢性游走性红斑
- B、神经系统损害
- C、循环系统症状
- D、高热
- E、关节损害

**【参考答案】：** E

49、30岁男性患者，阵发脐周疼痛伴恶心，反复呕吐2天，尿量减少，无口渴。查体：血压90/60mmHg，轻度腹胀，偶见肠型，肠鸣音亢进。化验：血白细胞 $12.5 \times 10^9 / L$ ，分叶82%， $CO_2CP 12 mmol / L$ 。此患者存在哪种代谢紊乱

- A、低渗性失水，代谢性碱中毒
- B、低渗性失水，呼吸性酸中毒



- C、等渗性失水，代谢性酸中毒
- D、高渗性失水，代谢性酸中毒
- E、高渗性失水，呼吸性酸中毒

**【参考答案】：** C

50、男性，70岁。因右侧肢体活动障碍3周入院。体检：发现患者右侧中枢性面、舌瘫，右侧肢体肌力III度，腱反射亢进。除上述体征外，最可能出现的体征还有

- A、肌张力下降(患侧肢体)
- B、病理反射阳性(健侧肢体)
- C、病理反射阳性(患侧肢体)
- D、腱反射亢进(健侧肢体)
- E、腱反射消失(健侧肢体)

**【参考答案】：** C

51、以下描述不正确的是

- A、房室结的血供通常来自左冠状动脉
- B、希氏束为索状结构，起自房室结前下缘
- C、心脏传导系统接受迷走与交感神经支配
- D、窦房结位于上腔静脉人口与右心房后壁交界处
- E、窦房结动脉起源于右冠状动脉者占60%

**【参考答案】：** A

52、下面哪项不是治疗先天性脑积水解除阻塞的手术

- A、大脑导水管成形术或扩张术
- B、选择性脊神经后根切断术
- C、后颅窝切除减压术

D、第四脑室正中孔切开或成形术

E、上颈椎椎板切除减压术

**【参考答案】：** B

53、男性，45岁，饮酒20余年，3两白酒/日。查体：肝肋下2.0cm，脾肋下5.0cm。化验检查示外周血三系减少。其主要原因为

A、营养吸收障碍

B、脾功能亢进

C、骨髓抑制

D、细菌感染，毒素作用

E、消化道少量出血

**【参考答案】：** B

54、20岁女患者，发作性头痛1年，在头痛前有短暂而轻微的视力模糊和闪光，继之偏侧搏动性头痛。常伴恶心和呕吐，持续3~6小时后缓解。应当诊断为

A、典型偏头痛

B、紧张型头痛

C、普通型偏头痛

D、丛集性头痛

E、基底动脉型偏头痛

**【参考答案】：** A

55、女性，28岁。反复下肢皮肤出血点2年，间有鼻出血及牙龈出血。化验：血小板 $52 \times 10^9 / L$ 。拟诊为ITP。下列何项对ITP有确诊价值

A、多次血小板计数低于 $100 \times 10^9 / L$

B、出血时间延长、血块退缩不佳

- C、骨髓巨核细胞数增多
- D、血小板相关抗体阳性
- E、放射性核素测定血小板寿命缩短

**【参考答案】：** E

56、下列激素哪一个为类固醇激素

- A、生长激素释放因子
- B、泌乳素
- C、雌激素
- D、生长激素
- E、促卵泡激素

**【参考答案】：** C

57、下述哪种表现最有利于鉴别支气管哮喘和心源性哮喘

- A、肺部干罗音为主兼有少量湿罗音
- B、心率快偶有早搏
- C、呼吸性呼吸困难为主
- D、心脏增大伴心尖部 S3
- E、静注氨茶碱有效

**【参考答案】：** D

58、下述对结节病 Scandding 分期叙述不正确的是

- A、0 期，肺部 X 线检查阴性，肺部清晰
- B、I 期，双侧肺门和或纵隔淋巴结肿大
- C、II 期，肺门淋巴结肿大，伴肺浸润
- D、III 期，仅见肺部浸润或纤维化，无肺门淋巴结肿大

E、分期代表了结节病的发展顺序规律

**【参考答案】：** A

59、女性，20岁。阵发性意识丧失伴四肢抽搐半年，脑电图示癫痫样放电，神经系统检查无阳性体征，现拟用抗癫痫药治疗，首选

A、卡马西平

B、地西洋(安定)

C、乙琥胺

D、氯硝西洋

E、扑米酮(扑痫酮)

**【参考答案】：** A

60、对肝肾综合征的治疗错误的是

A、多数病人需透析治疗

B、试用立其丁

C、试用速尿

D、避免肾损药物

E、试用多巴胺

**【参考答案】：** A

61、下述哪个部位出血可见柏油样便

A、十二指肠球部

B、直肠

C、结肠

D、回盲部

E、肛门

**【参考答案】：** A

62、洋地黄中毒的常见表现是

- A、心电图 QT 间期缩短
- B、第三度房室传导阻滞
- C、出现室早二联律
- D、窦性心动过速
- E、心电图 ST-T 呈鱼钩样改变

**【参考答案】：** C

63、关于多囊肾，下列哪种说法错误

- A、包括常染色体显性遗传型和常染色体隐性遗传型多囊肾病
- B、不宜进行肾穿刺活检
- C、腰痛、高血压等为常染色体显性遗传型多囊肾病的常见症状
- D、常为单侧肾脏受累
- E、肾脏体积增大

**【参考答案】：** D

64、女，44岁，右颈部包块伴发热 38℃以上 1 个月入院，活检诊断为弥漫性大细胞型淋巴瘤，B 细胞来源。脾肋下 5cm，肝不大，骨髓穿刺涂片内有 12% 淋巴瘤细胞，最可能的临床分期为

- A、IIIA
- B、IIIB
- C、IVA
- D、IVB
- E、IIB

**【参考答案】：** D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/116012115233011010>