

急诊科规培考试题及答案

一、单选题（共 100 题，每题 1 分，共 100 分）

1、女性，35 岁，腹痛 5 小时来诊，经检查诊断为外科急性腹痛，下列哪项决定是正确的

- A、粘连性肠梗阻不需要手术治疗
- B、消化道穿孔不是腹部探查的绝对指征
- C、疑为绞窄性肠梗阻时不可手术治疗，必须诊断明确后才可手术
- D、先有发热的急性腹痛一般是外科急性腹痛，均须手术治疗
- E、急性胰腺炎是否手术治疗要根据血淀粉酶的测定结果而定

正确答案：B

2、急性心肌梗死患者如果发生心室颤动，宜立即进行

- A、人工呼吸
- B、静脉应用利多卡因
- C、非同步直流电除颤
- D、同步直流电除颤
- E、心外按压

正确答案：C

3、慢性酒精性中毒的震颤性谵妄的临床表现是

- A、停酒后出现的急性精神症状群
- B、长期饮酒过程中出现的行为改变
- C、停酒后缓慢出现的记忆障碍
- D、长期饮酒过程中出现的慢性精神症状群
- E、长期饮酒过程中出现的记忆障碍

正确答案：A

4、男性，45 岁。呕血不止，烦躁，面色苍白，出冷汗。此时应首先做哪项处理

- A、快速补液
- B、肌注立止血
- C、快速输血
- D、口服去甲肾上腺素
- E、手术止血

正确答案：C

5、女性，36 岁。突然发生右上腹阵发性绞痛，伴发热、寒战，排柏油样便少量。查体：急性病容，巩膜黄染。应考虑是

- A、胆道出血
- B、出血性胃炎
- C、门静脉高压症
- D、胃十二指肠溃疡
- E、应激性溃疡出血

正确答案：A

6、毒蛇咬伤最有效的早期治疗方法是

- A、注射多价抗蛇毒血清
- B、中医中药治疗
- C、注射单价抗蛇毒血清
- D、局部清创
- E、局部注射胰蛋白酶

正确答案：C

7、哪种中毒不会引起呼吸肌麻痹

- A、河豚鱼中毒
- B、有机磷农药中毒
- C、安眠药中毒
- D、毒蛇咬伤中毒
- E、氯化钡中毒

正确答案：C

8、复苏后监护与器官功能支持的重点，除外下列哪一项

- A、积极预防 CA 再发
- B、复苏后治疗应围绕降低患者病死率，改善长期生存和神经功能
- C、维护患者肺功能及器官和组织的有效灌注，特别是脑灌注
- D、及时进行头颅 CT 检查，排除急性脑血管病变
- E、努力寻找引起 CA 的原因

正确答案：D

9、腹痛时可闻及肠鸣音亢进，气过水声或金属音的多属于

- A、梗阻性腹痛
- B、炎症性腹痛
- C、内出血性腹痛
- D、扭转性腹痛
- E、穿孔性腹痛

正确答案：A

10、休克时的重要代谢障碍为

- A、低渗性脱水，低镁血症
- B、低钙，低血糖
- C、呼吸窘迫综合征
- D、碱中毒，低血钾
- E、酸中毒，高血钾

正确答案：E

11、以下对头颈部、胸部、腹部闭合伤的处理，不正确的是

- A、肝、脾、肾等实质脏器的挫裂伤，如仅有少量出血，暂时不需要手术干预时，应留院观察
- B、对受伤后出现短暂意识丧失的患者，如头颅 CT 未发现颅内出血，可给予出院，无需复查
- C、对外伤后腹痛、腹肌紧张的患者，除腹部 CT 扫描外，还应进行腹腔穿刺明确有无内脏破裂
- D、对于有失血性休克的骨盆环破裂的患者，应立即采用使骨盆环关闭和稳定的措施
- E、“连枷胸”引起反常呼吸时可加垫包扎或肋骨牵引限制胸廓浮动

正确答案：B

12、心跳骤停后，复苏最有效的药物是

- A、血管加压素
- B、肾上腺素
- C、多巴胺
- D、去甲肾上腺素
- E、阿托品

正确答案：B

13、下列哪项不属于输卵管妊娠破裂或流产的常见体征

- A、宫颈外口松，开大容一指
- B、子宫稍大稍软
- C、子宫有飘浮感
- D、阴道后穹隆饱满
- E、宫颈明显举痛

正确答案：A

14、针对 ARDS 的治疗，不包括

- A、抗感染

- B、糖皮质激素
- C、机械通气治疗
- D、氧疗
- E、合理补液

正确答案：A

15、支气管哮喘发作时不会出现

- A、PEF 增加
- B、RV / TLC%增加
- C、FEV1 / FVC%下降
- D、MMFR 降低
- E、RV、FRC 增加

正确答案：A

16、急性肾衰竭血液透析的指征为

- A、少尿>4d
- B、 $\text{HCO}_3^- < 12 \text{mmol} / \text{L}$
- C、 $\text{BUN} > 25 \text{mmol} / \text{L}$ ，血钾 $> 6.5 \text{mmol} / \text{L}$
- D、水分潴留过多
- E、以上都是

正确答案：E

17、第三产程中，子宫不协调性收缩可造成

- A、胎盘粘连
- B、胎盘剥离不全
- C、胎盘残留
- D、胎盘植入
- E、胎盘嵌顿

正确答案：E

18、MODS 最常见的病因是

- A、免疫力低下
- B、营养不良
- C、吸氧浓度过高
- D、严重创伤和感染
- E、输液过多

正确答案：D

19、肺炎克雷伯杆菌感染

- A、脓臭痰
- B、砖红色胶冻样痰
- C、粉红色泡沫样痰
- D、绿色痰
- E、铁锈痰

正确答案：B

20、重度有机磷中毒时，全血胆碱酯酶活力应为

- A、40%以下
- B、70%以下
- C、30%以下
- D、50%以下
- E、60%以下

正确答案：C

21、胸膜腔穿刺抽出不凝血常因为

- A、血胸
- B、心脏损伤
- C、肋骨骨折
- D、开放性气胸
- E、张力性气胸

正确答案：A

22、以下对创伤患者的固定不正确的是

- A、对闭合性的骨折脱位，应在记录骨折移位和脱位情况、血管神经损伤情况后尽量现场复位固定
- B、下肢伤时可用健侧肢体来固定伤侧肢体
- C、肢体外伤固定时要包括受伤处的远近端关节
- D、怀疑脊柱外伤或无证据排除脊柱外伤时，应就地固定脊柱
- E、开放骨折如骨折端戳出体外时为避免继续污染，也应及早复位及固定

正确答案：E

23、女，34岁，因口角后自服敌敌畏 40ml，经当地医院用阿托品、解磷定抢救后，送来急诊。查：体温 39℃，神志模糊，瞳孔散大，皮肤绯红、抽搐，呼吸不规则，浅表双吸气及骤停，双肺有散在湿啰音；心率 158次/分，律齐；下腹膨隆，叩诊固定浊音；全血胆碱酯酶活力为 6 活力单位。此例除有机磷中毒外尚合并有

- A、肺部感染

- B、急性肾衰
- C、中毒性心肌炎
- D、脑水肿
- E、阿托品中毒

正确答案：E

24、根据胸部创伤分类，下列属于开放性损伤的是

- A、心包压塞
- B、气胸伴皮下气肿
- C、胸部皮肤有伤口，肺压缩 40%
- D、肋骨骨折并气胸
- E、肋骨骨折并血胸

正确答案：C

25、患者，男性，40 岁，症见心悸时发时止，受惊易作，胸闷烦躁，睡眠差多梦，口干苦，大便秘结，小便黄，舌红苔黄腻，脉弦滑。治疗应辨何证型

- A、虚证-阴虚火旺证
- B、实证-心脉瘀阻证
- C、虚证-心虚胆怯证
- D、实证-痰火扰心证
- E、实证-水饮凌心证

正确答案：D

26、关于卵巢肿瘤蒂扭转，以下哪个不正确

- A、瘤活动好
- B、与周围组织无粘连
- C、瘤中等大
- D、重心偏于一侧
- E、与患者体位改变无关

正确答案：E

27、心源性哮喘与支气管哮喘的不同点是

- A、两肺满布湿啰音和哮鸣音
- B、病史较长，反复发作
- C、大量粉红色泡沫样痰和心尖部舒张期奔马律
- D、发病年龄
- E、以上都不是

正确答案：C

28、下列关于做气管内管抽吸的叙述，错误的是

- A、抽吸的压力为-80~-120mmHg
- B、动作要轻柔，以免引起迷走反射
- C、可能会增加患者颅内压
- D、每次绝对不应超过 30s
- E、操作前应先用 100%的氧气，并增加病人的通气频率

正确答案：D

29、休克病人应用血管扩张药前最应注意的是

- A、补足血容量
- B、监测血压
- C、联合使用强心药
- D、监测尿量
- E、控制输液

正确答案：A

30、重度有机磷农药中毒的表现，下列组合哪项是正确的

- A、瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志不清、紫绀
- B、瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志模糊、心动过速
- C、瞳孔明显缩小、大汗、流涎、神志模糊、血压升高
- D、以上都不正确
- E、瞳孔明显缩小、大汗、流涎、视力模糊、肌无力

正确答案：C

31、一 50 岁男性，有反复晕厥病史。ECG 提示：III° 房室传导阻滞。应考虑行：

- A、射频消融
- B、电复律
- C、使用抗心律失常药物
- D、以上都不是
- E、临时起搏

正确答案：E

32、重症一氧化碳中毒患者的最有效的治疗措施是

- A、鼻导管间断低流量吸氧
- B、吸氧面罩吸氧
- C、持续低流量

D、吸入纯氧鼻导管

E、高压氧舱治疗

正确答案：E

33、单纯小脑幕裂孔疝的临床症状不包括

A、病侧瞳孔散大

B、呕吐

C、偏瘫

D、双侧瞳孔大小多变

E、昏迷

正确答案：D

34、女性、25岁。2小时前打扫室内卫生时突然出现咳嗽、胸闷、呼吸困难，追问病史近3年内每年秋季有类似发作，该病例最可能诊断为

A、心源性哮喘

B、慢性阻塞性肺病（B型）

C、慢性阻塞性肺病（A型）

D、支气管哮喘

E、慢性喘息型支气管炎

正确答案：D

35、男性，60岁。因疑冠心病住院进一步诊治。在花园内散步时突然摔倒，意识不清，呼吸断续，颈动脉、脉搏搏动消失。首选的抢救措施是

A、开放静脉

B、行心电图检查

C、立即行人工呼吸、心外按压

D、抬回病房

E、心内注射肾上腺素

正确答案：C

36、高热惊厥多见于

A、脑转移瘤

B、小儿急性感染

C、脑外伤

D、低钙血症

E、高血压脑病

正确答案：B

37、对手术耐受力最差的心脏病类型是

- A、房室传导阻滞
- B、急性心肌炎
- C、高血压性心脏病
- D、风湿性心脏病
- E、非紫绀型先天性心脏病

正确答案：B

38、经口气管插管机械通气的患者突然出现全身发绀，SpO₂ 下降至30%~40%，下列哪个原因可能性最大

- A、血氧饱和度监护仪故障
- B、患者体位改变
- C、气道痉挛
- D、气管插管脱出
- E、呼吸机通气参数设置不当

正确答案：D

39、下列哪项不属于酮症酸中毒时机体病理生理改变

- A、血浆渗透压显著降低
- B、电解质平衡紊乱
- C、循环衰竭和肾衰竭
- D、严重失水
- E、酸中毒

正确答案：A

40、患者，女性，52岁，头部外伤数天后，头痛如针刺，痛处固定不移，舌质紫黯，有瘀斑、瘀点，苔薄白，脉细涩。需用何方治疗

- A、天麻钩藤饮
- B、半夏白术天麻汤
- C、龙胆泻肝汤
- D、通窍活血汤
- E、五苓散

正确答案：D

41、患者，65岁，男性，吸烟史20年。突然心搏停止30分钟入院，入院时神志昏迷，面色苍白，四肢厥冷，大动脉搏动消失，血压测不出，心前区听不到心音，舌质淡黯，六脉全无。治疗首选的方剂是

- A、安宫牛黄丸
- B、生脉散

- C、独参汤
- D、黑锡丹
- E、通脉四逆汤

正确答案：E

42、女性患者，56岁，既往“冠心病”史10年，于上楼途中突感胸前区压榨性疼痛，舌下含服硝酸甘油，胸痛不缓解，急呼120入院，途中意识转模糊，入院后查体：BP 65 / 55mmHg，HR 110 / min，意识模糊，脉搏细速，四肢湿冷，末梢循环差，对该患者的处理中哪项不正确

- A、纠正水电解质及酸碱平衡失调
- B、酌情应用血管活性物质，缩血管药物和扩血管药物可同时应用
- C、快速大量的补液
- D、合理应用利尿药
- E、治疗原发心脏病

正确答案：C

43、患者女性，25岁，与家人争吵后离家，1h后被人发现昏迷在田间，口中大蒜味浓烈，口吐白沫，送至当地医院抢救。查体见瞳孔针尖样，呼吸急促，双肺满布湿啰音、哮鸣音，ChE活力30%，关于治疗药物中选择盐酸戊乙奎醚(长托宁)的说法中不正确的是

- A、对外周M受体和中枢M、N受体均有作用
- B、首次用药需与氯解磷定合用
- C、选择性作用于M1、M2受体
- D、作用时间长(半衰期6~8h)，不良反应少
- E、为中枢性抗胆碱能药物

正确答案：C

44、在高血压脑病诊断的相关检查中，常用并有重要诊断意义的检查是

- A、颅骨X线
- B、脑CT、MR
- C、脑彩超
- D、心电图
- E、肌电图

正确答案：B

45、创伤患者实验室检查的意义中，以下说法不正确的是

- A、外伤后凝血功能异常往往提示病情危重
- B、尿常规可提示泌尿系统损伤和糖尿病

- C、初次检查血常规正常可排除活动性出血
- D、血气分析可评估患者氧合情况和酸碱平衡紊乱的情况
- E、怀疑有胰腺损伤时，应做血和尿淀粉酶检查

正确答案：C

46、急性心肌梗死患者，抢救过程中突发意识丧失、抽搐，最大的可能是

- A、室性心动过速
- B、心室颤动
- C、室性期前收缩
- D、心房扑动
- E、心房扑动

正确答案：B

47、男，38岁，右下胸撞伤6小时，伤后感上腹部疼痛，头晕。查体：血压90/70mmHg，脉搏110次/分，面色苍白，右腹部压痛、反跳痛、肌紧张较明显。X线透视示肝阴影扩大、右膈抬高。首先应考虑的诊断是

- A、肝破裂
- B、胃十二指肠穿孔
- C、右肾破裂
- D、结肠肝区破裂
- E、外伤性血气胸

正确答案：A

48、有机磷农药中毒出现呼吸肌瘫痪时应用哪种药物

- A、解磷定
- B、可拉明
- C、新斯的明
- D、琥珀酰胆碱
- E、阿托品

正确答案：A

49、泥石流伤害的救治原则及工作中，错误的是

- A、伤员应注射抗破伤风血清及破伤风类毒素
- B、迅速做出检伤分类并做出标记
- C、创面严重，应彻底清创，尽早使用抗生素预防
- D、受污染严重的创面，一般不用彻底的清创
- E、迅速清除口腔、鼻腔内分泌物保持气道畅通

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/117063166065006040>