

2021 年护士执业资格考试模拟试题 (1)

(13)

一、单选题 (共 100 题, 100 分)

1、幼儿期是指

- A、 从出生~1 岁
- B、 从出生~2 岁
- C、 1~3 岁
- D、 3~5 岁
- E、 4~6 岁

正确答案: C

2、患儿男,3 个月,母乳喂养。腹泻 2 个月,大便 4~6 次/天,稀或糊状,无脓血。食欲好,面有湿疹,体重 5.8kg。最可能的诊断是

- A、 迁延性腹泻
- B、 慢性腹泻
- C、 生理性腹泻
- D、 饮食性腹泻
- E、 感染性腹泻

正确答案: C

3、患儿,男,12 岁。因发热,头痛 3 天,以流行性脑脊髓膜炎(普通型)入院,对于其密切接触的妹妹,预防措施正确的是

- A、 隔离观察 5 天
- B、 隔离观察 7 天
- C、 医学观察 5 天
- D、 不需要观察
- E、 医学观察 7 天

正确答案: E

4、不属于佝偻病激期骨骼的 X 线表现是

- A、 骨骺软骨带增宽
- B、 干骺端临时钙化带增宽
- C、 骨质疏松
- D、 骨干弯曲
- E、 青枝骨折

正确答案: B

5、骨髓造血开始于

- A、 胚胎第 1 个月
- B、 胚胎第 2 个月
- C、 胚胎第 3 个月
- D、 胚胎第 4 个月
- E、 出生后

正确答案： D

6、患儿女,足月儿,因脐带绕颈,出生后 1 分钟 Apgar 评分为 1 分。经窒息复苏后,目前患儿仍嗜睡、反应差、呕吐。此时对该患儿不恰当的护理是

- A、 头罩吸氧
- B、 监测生命体征
- C、 立即开奶
- D、 配合亚低温治疗
- E、 注意保暖

正确答案： C

7、属于疫苗接种异常反应的是

- A、 心因性反应
- B、 偶合发病
- C、 原有疾病加重
- D、 一般反应
- E、 变态反应

正确答案： E

8、足月新生儿,出生后 1 分钟,心率 70 次/分,呼吸弱而不规则,全身皮肤青紫,四肢肌张力松弛,喉反射消失,Apgar 评分为 2 分。该患儿为

- A、 正常新生儿
- B、 轻度窒息
- C、 青紫窒息
- D、 重度窒息
- E、 急性窒息

正确答案： D

9、预防维生素 D 缺乏性佝偻病应强调的是

- A、 母乳喂养
- B、 及早添加辅食
- C、 及早口服鱼肝油
- D、 及早服用钙剂
- E、 经常晒太阳

正确答案： E

10、护理法洛四联症患儿时,给予充足水分的主要目的是

- A、 预防形成脑血栓
- B、 预防并发肺感染
- C、 预防并发亚急性细菌性心内膜炎
- D、 预防心力衰竭
- E、 预防中枢神经系统感染

正确答案: A

11、经产妇,妊娠 37 周,阴道多量流血 5 小时入院。查血压 90/60mmHg,脉搏 102 次/分。无宫缩,宫底剑突 2 指,臀先露,胎心 94 次/分。最恰当的处理是

- A、 期待疗法
- B、 外倒转术
- C、 人工破膜
- D、 立即剖宫产
- E、 药物引产

正确答案: D

12、女 37 岁,停经 42 天阴道不规则出血两天,突发腹痛,诊断为异位妊娠,以下说法不正确的是

- A、 病侧下腹明显压痛反跳痛
- B、 一侧附件必有肿块
- C、 宫颈举痛明显
- D、 休克程度与阴道出血量不相符
- E、 后穹隆穿刺抽出不凝血液

正确答案: B

13、诊断前置胎盘较安全可靠的方法是

- A、 阴道检查
- B、 肛门检查
- C、 B 超检查
- D、 放射线检查
- E、 化验检查

正确答案: C

14、卵巢功能最旺盛的时期为

- A、 幼儿期
- B、 青春期
- C、 性成熟期
- D、 围绝经期
- E、 老年期

正确答案: C

15、关于肩先露,下列不正确的是

- A、 胎体纵轴与母体纵轴相垂直
- B、 容易发生脐带脱垂和胎膜早破
- C、 容易发生病理性缩复环
- D、 第二产程发现为横位立即行阴道助产
- E、 腹部检查时, 子宫呈横椭圆形

正确答案: D

16、 异位妊娠最常见的原因

- A、 输卵管发育异常
- B、 慢性输卵管炎
- C、 输卵管结扎再通术后
- D、 盆腔肿瘤压迫输卵管
- E、 孕卵游走

正确答案: B

17、 女 34 岁, 第一胎 40 周, 阴道分娩, 出院前护士指导产妇健康复诊时间在

- A、 产后 3 周
- B、 产后 4 周
- C、 产后 5 周
- D、 产后 6 周
- E、 产后 7 周

正确答案: D

18、 关于早孕诊断, 下述哪项最为准确

- A、 停经
- B、 晨起恶心、 呕吐
- C、 子宫增大
- D、 乳房胀大
- E、 B 超

正确答案: E

19、 女 34 岁, 第一胎孕 38 周, 医生测量骨盆, 正常骨盆的形态是

- A、 骨盆的 3 个假想平面均呈纵椭圆形
- B、 骨盆的入口和中骨盆平面为纵椭圆形
- C、 骨盆的入口平面呈横椭圆形
- D、 骨盆的 3 个假想平面均呈横椭圆形
- E、 骨盆的入口及出口平面呈纵椭圆形

正确答案: C

20、 女 29 岁, 第一胎 39 周不规则宫缩, 胎膜破, 处理错误的是

- A、 破膜后即听胎心音

- B、记录破膜时间
 - C、观察羊水性状
 - D、胎头高浮者,需抬高床尾
 - E、破膜超过 24 小时,需给予抗生素
- 正确答案: E

21、预防留置导尿管病人尿路感染的护理措施,错误的是

- A、保持尿道口,每日消毒 1~2 次
 - B、每日定时更换集尿袋
 - C、每周更换导尿管 1 次
 - D、鼓励病人多饮水,勤更换卧位
 - E、持续引流尿液
- 正确答案: E

22、病人,女性,60 岁。因脑出血入院 2 周。目前病人意识不清,骶尾部皮肤发红,大小为 3cmx3cm,未破损。病人的压疮处于

- A、淤血红润期
 - B、炎性浸润期
 - C、浅度溃疡期
 - D、深度溃疡期
 - E、坏死溃疡期
- 正确答案: A

23、病人,男性,50 岁,小学文化,胃癌术后第一天。护士在早上查房时准备对病人进行健康教育。病人感到伤口阵阵疼痛,心情烦躁,对健康教育内容毫无兴趣,护士最终不得不终止。影响此次护患沟通失败的因素是

- A、病人伤口疼痛
 - B、病人文化程度低
 - C、有其他人员在场
 - D、教育内容不合适
 - E、病人年龄较大
- 正确答案: A

24、为传染病病人工作后双手刷洗方法是

- A、由手至臂刷洗 2 遍,共 2 分钟
 - B、由臂至手刷洗 2 遍,共 2 分钟
 - C、由手至臂刷洗 3 遍,共 6 分钟
 - D、由手至臂刷洗 1 遍,共 2 分钟
 - E、由手至肘上 10cm,刷洗 2 遍,共 2 分钟
- 正确答案: B

25、病人需注射破伤风抗毒素,皮肤试验结果阳性,须用脱敏注射法。第一次注射剂量为

- A、 15IU
- B、 50IU
- C、 100IU
- D、 150IU
- E、 200IU

正确答案： A

26、病人, 男性, 45 岁。腰麻下胫腓骨切开复位内固定术, 术后回病房。应采取的卧位是

- A、 去枕仰卧位
- B、 屈膝仰卧位
- C、 中凹卧位
- D、 半坐卧位
- E、 端坐位

正确答案： A

27、发口服药操作, 下述哪项正确

- A、 病人不在, 药物放床旁桌上
- B、 病人服洋地黄类药物后要测其脉率
- C、 嘱病人服止咳糖浆后不要立即饮水
- D、 病人提出疑问, 即予解释
- E、 鼻饲病人不给口服药

正确答案： C

28、余先生, 30 岁, 因急性胰腺炎入院。患者精神焦虑, 护士在为其实实施入院护理时, 不正确的是
()

- A、 热情款待, 为患者提供舒适环境
- B、 及时满足患者的任何需要, 让患者安心
- C、 认真倾听述说, 科学指导
- D、 服务周到使患者放心
- E、 耐心安慰, 减轻焦虑

正确答案： B

29、李奶奶, 脑溢血经抢救无效死亡。护士为其做尸体护理, 操作错误的是 ()

- A、 填写尸体识别卡, 备齐用物携至床旁
- B、 撤去一切治疗用物
- C、 放平尸体, 仰卧, 肩下置一枕头
- D、 整理遗容、填塞孔道
- E、 清洁全身, 包裹尸体

正确答案： C

30、李先生, 57 岁, 刚被确诊为胃癌晚期, 患者正处于愤怒期, 护士对她进行护理时, 以下应注意的事项是错误的是

- A、 做好家属工作
- B、 忍让克制患者的不礼貌行为
- C、 充分理解患者的痛苦
- D、 注意保护患者的自尊心
- E、 尽量劝导患者少发脾气,以防病情恶化

正确答案: E

31、 疟疾病人最常见的发热类型是:

- A、 稽留热
- B、 不规则热
- C、 弛张热
- D、 间歇热
- E、 波浪热

正确答案: D

32、 李先生,因腕骨骨折,卧床已2各月,主诉骶骨触痛麻木,检查骶骨尾部皮肤局部红肿。下列护理措施不妥的是:

- A、 红外线照射
- B、 适当增加营养
- C、 减少潮湿摩擦刺激
- D、 增加翻身次数
- E、 局部可用棉垫包扎

正确答案: E

33、 推平车上下坡时,应注意下面的选项哪个是正确的

- A、 病人头向前
- B、 病人头向后
- C、 病人头在高处一端
- D、 病人头在低处一端
- E、 病人头在小轮一端

正确答案: C

34、 患者女性,35岁。主诉腹胀、4天未排大便,肛诊可触及粪块,医嘱给予大量不保留灌肠。当液体灌入100ml时患者感觉有便意,正确护理措施是()

- A、 停止灌肠
- B、 协助患者平卧
- C、 嘱患者张口深呼吸
- D、 提高灌肠筒高度
- E、 移动肛管或挤捏肛管

正确答案: C

35、 病人:“我每天都要喝一点酒。”护士“请问你每天具体喝多少?”护士使用的沟通技巧是

- A、 叙述
- B、 重复
- C、 澄清
- D、 反映
- E、 反馈

正确答案： C

36、 患儿女, 2 个月, 因肺炎、 高热急诊入院。 护士为其进行静脉输液时, 2 次穿刺失败。 患儿父亲非常气愤, 甚至谩骂护士。 导致此事件发生的主要因素是

- A、 角色责任模糊
- B、 角色期望冲突
- C、 角色心理差位
- D、 角色权利争议
- E、 经济压力过重

正确答案： B

37、 测量脉搏的方法, 错误的是

- A、 用示指中指无名指诊脉
- B、 病人剧烈活动后休息 30 分钟后再测
- C、 异常脉搏需测 1 分钟
- D、 脉搏短绌者先测心率, 后测脉率
- E、 偏瘫病人选择健侧肢体测脉

正确答案： D

38、 使用无菌容器是不正确的方法是

- A、 打开无菌容器盖后的内面向上
- B、 无菌物品取出未用应立即回放
- C、 手持无菌容器应托住底部
- D、 取出无菌物品后应立即将盖盖严
- E、 无菌容器应每周灭菌一次

正确答案： B

39、 为昏迷病人进行口腔护理时, 不需准备的用物是:

- A、 血管钳
- B、 张口器
- C、 吸水管
- D、 棉球
- E、 手电筒

正确答案： C

40、 方先生, 60 岁, 患慢性支气管炎, 痰粘稠不易咳出, 为帮助祛痰, 给予氧气雾化吸入, 下列操作错误的是

- A、 湿化瓶加蒸馏水
- B、 病人漱口以清洁口腔
- C、 氧气流量调至 6~8L/min
- D、 喷漆管口放入口中, 闭紧口唇
- E、 指导病人深呼吸

正确答案: A

41、使用人工呼吸器, 吸呼时比应为

- A、 1 : (0.5~1)
- B、 1 : (0.5~2)
- C、 1 : (1.0~3)
- D、 1 : (1.5~2)
- E、 1 : (1.5~3)

正确答案: D

42、双侧瞳孔缩小见于

- A、 阿托品中毒
- B、 有机磷农药中毒
- C、 脑出血
- D、 脑疝
- E、 颠茄类药物中毒

正确答案: B

43、胡某, 男, 68岁, 突然意识丧失, 口吐白沫, 继而呼吸困难, 入院就诊。在医生未到之前, 护士给予的紧急处理中, 不妥的是

- A、 平卧床上, 头偏向一侧
- B、 询问并记录病史
- C、 吸氧
- D、 清理呼吸道
- E、 测量血压

正确答案: B

44、为2岁以下婴幼儿肌内注射, 最佳注射部位是

- A、 股外侧肌
- B、 臀大肌
- C、 臀中、小肌
- D、 上臂三角肌
- E、 股内侧肌

正确答案: C

45、下述哪项不属于临终护理的目的

- A、解除病人肉体痛苦
- B、缓解病人心理恐惧
- C、使病人舒适安静
- D、使病人五官端详
- E、使家属获得安慰

正确答案： D

46、患者,女,27岁,阑尾炎手术后第五天,体温 36.8℃,刀口无渗血渗液。当日上午 9 时许,继续静脉点滴青霉素,30 分钟后,患者突然寒战,继之高热,体温 40℃,并伴有头痛、恶心、呕吐。根据上述表现,判断此患者可能出现了()

- A、发热反应
- B、过敏反应
- C、急性肺水肿
- D、空气栓塞
- E、细菌污染反应

正确答案： A

47、造成茂菲滴管内液面自行下降的原因是

- A、针头堵塞
- B、滴管有裂隙
- C、输液管扭曲
- D、压力过低
- E、静脉痉挛

正确答案： B

48、防止交叉感染针对性最强的措施是

- A、无菌包应放置在清洁、干燥、固定的地方
- B、无菌物品和非无菌物品应分开放置
- C、夹取无菌物品时,必须使用无菌持物钳
- D、一份无菌物品,只能供一位病人使用一次
- E、操作时环境要清洁

正确答案： D

49、一中年男子,在获知父亲去世两周后,逐渐出现少语,说话声音低沉,面容愁苦,对周围事物不感兴趣,浑身无力,食欲差,入睡困难,早醒,认为自己对不起父亲,对不起家人,感觉度日如年,活着没意思。近一个月来,上述症状加重,曾于入院前三天一次吞服 50 片安定,被及时发现后送入院抢救治疗。该患者入院后,根据上述病历,你认为首优的护理诊断/问题是

- A、有自杀、自伤的危险
- B、有暴力行为的危险
- C、睡眠形态紊乱
- D、营养失调:低于机体需要量
- E、社会交往障碍

正确答案： A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127132163155006034>