

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习

备考题库训练—习题强化

考前模拟测试—模拟演练

通关宝典梳理—真题体验

技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

## 护理学练习题库与答案

1、哪种病毒是引起病毒性心肌炎最常见的病毒?()

- A、EB 病毒
- B、流感病毒
- C、疱疹病毒
- D、麻疹病毒
- E、柯萨奇病毒

答案：E

:病毒性心肌炎, 最常见的病毒是柯萨奇 b 组病毒, 此病毒占引发病毒性心肌炎的 30% 到 50% 左右。除此之外, 像 EB 病毒, 巨细胞病毒, 以及单纯疱疹, 流感, 风疹, 人类腺病毒, 人类免疫缺陷病毒等, 都可能引发病毒性心肌炎。病毒感染是引发心肌炎最为常见的原因, 除此之外, 像细菌, 真菌, 原虫等感染也有可能引发心肌炎, 但是相对是比较少见的。

2、从组织学来看, 胃癌绝大多数为()。

- A、硬癌
- B、髓样癌
- C、胶样癌
- D、黏液癌
- E、腺癌

答案：E

:胃癌组织学分型: 腺癌(占绝大多数)、乳头状腺癌、管状腺癌、黏液腺癌、印戒细胞癌、腺鳞癌、鳞状细胞癌、小细胞癌、未分化癌和其他。

3、胃壁的淋巴液最后汇入()。

- A、胸导管
- B、腋窝淋巴管
- C、锁骨下淋巴结
- D、腹腔淋巴丛
- E、毛细淋巴管

答案：A

:胃壁各层中都分布着毛细淋巴管, 经淋巴输出管注入胃周围淋巴结, 最后均经腹主动脉周围淋巴结汇入胸导管。

4、正常足月妊娠的羊水量大约()。

- A、100~200mL
- B、<500mL
- C、600~800mL

D、1000~1500mL

E、2600~3000mL

答案：D

：正常足月妊娠羊水量约为 1000~1500mL。在妊娠的任何时期，如羊水量超过 2000mL，可诊断为羊水过多；如在妊娠晚期羊水量少于 300mL，可诊断为羊水过少。

5、妊娠满 28 周至不满 37 周之间分娩者称为（）。

A、早期流产

B、晚期流产

C、早产

D、足月产

E、过期产

答案：C

：早产是指妊娠满 28 周至不足 37 周间分娩者。AB 两项，妊娠不足 28 周、胎儿体重不足 1000g 而终止妊娠者称流产。流产发生于妊娠 12 周前者称早期流产，发生在妊娠 12 周至不足 28 周者称晚期流产。D 项，妊娠满 37 周至不足 42 周期间分娩称为足月产。E 项，超过 42 周再分娩的，称为过期产。

6、下列关于原发性醛固酮增多症术前护理，不正确的是（）。

A、观察血压变化

B、观察神经肌肉障碍情况

C、给予低钾高钠饮食

D、观察有无低血钙症状

E、加强护理，防止跌倒

答案：C

：应给予低钠高钾饮食，每日限制钠的摄入量为 20mmol，钾为 270mmol。

7、剖宫产术前准备，错误的是（）。

A、留置导尿管

B、术前禁用呼吸抑制剂

C、观察生命体征

D、反复阴道检查明确诊断

E、皮肤准备

答案：D

：剖宫产术前准备包括：给患者留置导尿管，术前禁用呼吸抑制剂，严格观察生命体征，做好局部皮肤准备。D 项，不可反复阴道检查，防止局部感染。

8、明确和量化诊断二尖瓣狭窄的最可靠方法是（）。

- A、X 线平片
- B、心电图
- C、超声心动图
- D、血沉
- E、C 反应蛋白

答案：C

:二维超声心动图可显示狭窄瓣膜的形态和活动度, 测量瓣口面积; 彩色多普勒血流显像可实时观察二尖瓣狭窄的射流。为明确和量化诊断二尖瓣狭窄的最可靠方法。

9、输卵管妊娠最常见的病因是()。

- A、输卵管发育异常
- B、输卵管炎症
- C、孕卵游走
- D、输卵管结扎后再通
- E、盆腔肿瘤压迫输卵管

答案：B

:输卵管妊娠是最常见的异位妊娠, 即受精卵种植于输卵管。以壶腹部妊娠为最多。最常见的病因是慢性输卵管炎症, 可导致管腔皱褶粘连、管腔部分阻塞。

10、生理性贫血时, 红细胞和血红蛋白分别可降至()。

- A、 $1.6 \times 10^12/L$ , 115g/L
- B、 $2.7 \times 10^12/L$ , 90g/L
- C、 $3.0 \times 10^12/L$ , 100g/L
- D、 $3.8 \times 10^12/L$ , 100g/L
- E、 $4.0 \times 10^12/L$ , 120g/L

答案：C

:新生儿出生时红细胞计数约 $(5\sim7) \times 10^12/L$ , 血红蛋白量约 150~220g/L。生后 2~3 个月时发生生理性贫血, 红细胞数降至 $3 \times 10^12/L$ , 血红蛋白降至 100g/L 左右而出现轻度贫血, 以后又逐渐增加, 约于 12 岁达成人水平。

11、病毒性心肌炎急性期应卧床休息至()。

- A、热退
- B、热退后 1~2 周
- C、热退后 3~4 周
- D、热退后 4~5 周
- E、热退后 4~6 周

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/127154043135006140>