

预防产后出血护理对顺产妇满意度的效果研究

**Effect of Prevention of Postpartum Hemorrhage Nursing on  
the Satisfaction of Pregnant Women**

## 致谢语

从论文选题到搜集资料，从提纲的完成到正文的反复修改，我经历了喜悦、聒噪、痛苦和彷徨，在写作论文的过程中，心情是如此复杂。如今，伴随着这篇毕业论文的最终成稿，复杂的心情烟消云散，自己甚至还有一点成就感。

我要感谢我的导师，老师为人随和热情，治学严谨细心。从选题、定题、撰写提纲，到论文的反复修改、润色直至定稿，老师始终认真负责地给予我深刻而细致地指导。正是有了老师的无私帮助与热忱鼓励，我的毕业论文才得以顺利完成。

## 摘要

目的：随着近年来我国在医疗技术和水平上的不断迈进，越来越多的产妇得益于先进的护理技术顺利完成了生产过程，并且体验到了体贴完善的产后护理。但是在现代医学中，由于产妇的身体、年龄等因素（例如宫缩乏力，凝血困难以及软产道受伤等等）而导致的产后出血状况仍然是需要被重点防治的工作内容。需要在预防和处理等措施上形成更完整、科学的体系流程。

方法：本文采用对比试验方法，对照了 A, B 两组共六十名顺产妇的各项参数，其中对 A 组产妇采取的是比较常规的产后护理方式（包括注射宫缩术，检测身体机能以及阴道出血量等）；对 B 组产妇进行预防产后出血护理（包括预测检查以及预防三项过程等）。

结果：首先对比出两组产妇的满意度，与 A 组比较，B 组产妇的总满意度为 96.7%，明显高于 A 组的 76.7%，差异有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。即说明了顺产妇预防产后出血护理工作相比于常规的护理方法，更能够使产妇满意。其次对比出两组产妇的产后出血量，与 A 组相比发现，B 组产妇的产后出血量为（ $203.2 \pm 18.4$ ）毫升，而 A 组产妇的产后出血量为（ $305.8 \pm 22.6$ ）毫升，差异有统计学意义（ $P < 0.05$ ）。结果表明 B 组产妇的产后出血量明显低于 A 组产妇，即说明了顺产妇预防产后出血护理工作相比于常规的护理方法，能够减少产妇出血量，更能维持产妇与产儿的身心健康。

结论：无论是从产妇的产后出血量来看，还是从产妇的满意程度上来看，接受了预防产后出血护理的产妇综合情况要高于接受常规护理的产妇。

关键词：阴道分娩；产后出血；预防

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/128101037014006141>