

肿瘤内科主治医师《基础知识》模拟试卷二（精选）

[单选题]1. 恶性肿瘤通常采用组织病理学分级来表示肿瘤分化程度，(G1~G4)。（江南博哥）下列陈述哪项正确

- A.G1低分化
- B.G1高分化
- C.G3高分化
- D.G3中分化
- E.G3未分化

参考答案： B

参考解析：恶性肿瘤组织学分级标准:G1 分化好，G2 中度分化，G3 分化差，G4 未分化

[单选题]2. 局部晚期乳腺癌的治疗应该

- A. 尽早手术
- B. 以化疗为主
- C. 以放疗为主
- D. 以放疗和手术为主
- E. 综合治疗为主

参考答案： E

参考解析：药物治疗与局部治疗相结合的综合治疗为目前局部晚期乳腺癌的标准治疗

[单选题]3. 确诊鼻咽癌的最主要手段是

- A. 鼻咽镜
- B. X线片、CT、MRI
- C. 病理
- D. EB病毒检查
- E. 体格检查

参考答案： A

参考解析：确诊鼻咽癌须先进行鼻咽镜检查，发现异常组织后即行活检病理学检查

[单选题]4. 属于中度癌性止痛的药物有

- A. 阿司匹林
- B. 曲马多
- C. 扑热息痛
- D. 布洛芬
- E. 芬太尼

参考答案： B

参考解析：弱阿片类镇痛药用于当非阿片类镇痛药不能满意止痛时或中度癌性疼痛患者。

[单选题]5. 男性，56岁，因“吞咽困难、背痛2个月，伴颈部肿物”而就诊，在钡剂造影检查时发现胸中段食管6cm充盈缺损，局部管壁破坏，管腔狭窄，周围软组织影增厚，颈部肿物穿刺活检诊断为“转移性鳞癌”，为指导放射治疗，下一步应选择哪一种检查方法来进一步明确病变范围

- A. 食管拉网检查
- B. 食管腔内超声
- C. 胸部X线片
- D. 胸部CT扫描
- E. 食管镜检查

参考答案：B

参考解析：食管超声内镜能准确判断食管癌的壁内浸润深度、异常肿大的淋巴结以及明确肿瘤对周围器官的浸润情况，对肿瘤的分期、治疗方案的选择有重要意义。

[单选题]6. 临床受益率指

- A. CR+PR
- B. CR
- C. PR
- D. SD
- E. CR+PR+SD

参考答案：A

参考解析：有效病例数=CR+PR

[单选题]7. 孤立性肺内结节，具有下列哪一项特征者，多为良性病变

- A. 直径>3cm
- B. 观察2年以上大小无改变
- C. 结节内有偏心钙化灶出现
- D. 边缘不规则毛刺状
- E. 伴有内分泌症状

参考答案：B

参考解析：影像学上恶性结节可表现边缘不规则，“毛刺征”，结节内偏心钙化灶等。良性结节表现边缘光滑清楚、无分叶或有浅分叶征，可有中心点状或斑片状钙化或弥漫性钙化。并且良性结节随时间延长无明显动态改变，恶性结节则反之

[单选题]8. 肿瘤手术最需要考虑的是

- A. 患者年龄
- B. 病人的一般情况
- C. 手术对正常生理功能的干扰
- D. 手术的复杂程度
- E. 手术的病死率

参考答案：C

参考解析：手术选择设计首要考虑保护机体免疫功能

[单选题]9. 关于 TNM分期说法正确的是哪项？()

- A. TNM分期适合所有肿瘤
- B. Tx 是指原发肿瘤巨大
- C. Mx是指转移病灶过多，难以计数
- D. Nx是指对区域淋巴结的情况难以做出估计
- E. TNM分期的 N均包括 N0~N3

参考答案：D

参考解析：TNM分期不适合淋巴瘤等非实体瘤的分期，故答案 A 错误；食管癌的 N 分期只有 N0 和 N1，故答案 B 项错误；Mx 和 Tx 分别指远处转移和原发肿瘤无法评估。

[单选题]10. 有关医师行为规范叙述正确的是()

- A. 实验性医疗旨在推动医学发展，即使有风险性也应尽早应用于患者
- B. 尚不成熟的医疗技术可以提前应用于临床
- C. 实验性临床医疗应充分保障患者本人或其家属的知情同意权
- D. 医师视患者病情需要可以越权使用医疗技术
- E. 医师可以在患方不知情的情况下，按照已确定的临床试验方案进行试验

参考答案：C

[单选题]11. 以下哪些药物不是我国缓解癌症疼痛的第一阶梯药物

- A. 萘普生、加合百服宁
- B. 吲哚美辛、意施丁
- C. 强痛定
- D. 氯诺昔康(可塞风, Lornoxicam)、美洛昔康(莫比可, Meloxicam)
- E. 双氯芬酸钠(钾)、赛来西布(西乐葆)

参考答案：C

参考解析：缓解癌症疼痛的第一阶梯药物主要为解热镇痛药类的止痛药。强痛定不属于此类药物

[单选题]12. 女性，35岁，9个月前曾因右侧乳腺癌行根治性切除术，术后未作放疗、化疗，近1个月来因消瘦，咳嗽检查发现双肺有多个转移结节，肝内亦有多占位病变。患者切除标本检查 ER 及 PR 阴性，腋窝淋巴结见癌转移。患者月经大致正常，请选择治疗方案

- A. 卵巢去势+三苯氧胺内分泌治疗
- B. 5-FU+CF 化疗
- C. 自体干细胞移植下大剂量化疗
- D. 以阿霉素及泰素为主的联合化疗
- E. 肝动脉及双侧支气管动脉介入治疗

参考答案：D

[单选题]13. 在国际上，新药的临床试验目前共分为

- A.1 期
- B.3 期
- C.5 期
- D.2 期
- E.4 期

参考答案：E

参考解析：一期：临床药理学毒理学研究，在健康志愿者身上进行，主要解决药物的安全问题而非疗效。二期：疗效的初步临床研究，小规模的药物效果和安全性研究。三期：全面的疗效评价，最全面严格的新药临床科学研究，病例数较大，并与当前的标准疗法比较。四期：销售后的监测，新药上市以后不良反应调查和长期的病死率和死亡率的研究

[单选题]14. 目前生物治疗疗效比较肯定的有

- A.恶性黑色素瘤
- B.胃癌
- C.急性白血病
- D.小细胞肺癌
- E.肝癌

参考答案：A

[单选题]15. 肺癌放疗后，胸部 CT扫描有约 80%的病人可见肺纤维化，肺纤维化一般发生在照射后

- A.3 个月
- B.12 个月
- C.3~4 个月
- D.6 个月
- E.8~12 个月

参考答案：D

参考解析：放射性肺纤维化是进行性、不可逆的，大部分病人在放射治疗 6 个月左右，可于 X线胸片上逐渐出现纤维化

[单选题]16.WHO将抗癌药物的急性及亚急性毒性反应分为 0、I、II、III、IV 度。它们的临床意义是

- A.除 0 度外，所有毒性反应都是不能接受的
- B.发生 II 度以上毒性反应后，应立即停药
- C.应尽量避免和减少 III/IV 度毒性反应
- D.I~III 度毒性均不严重，可继续用药
- E.只有 IV 度毒性需引起注意

参考答案：C

参考解析：化疗的毒副反应是不可避免的。应在安全的前提下继续治疗

[单选题]17. 1997 年肾癌 TNM分期中，N2是指几个以上淋巴结转移

- A.1 个以上
- B.2 个以上
- C.3 个以上
- D.4 个以上
- E.5 个以上

参考答案：A

参考解析：1997 年肾癌 TNM分期中，N2是指区域淋巴结转移超过 1 个。

[单选题]18. 对中度以上营养不良患者每日应保证供应蛋白质的量为()。

- A.1.5g/kg
- B.2.5g/kg
- C.3.5g/kg
- D.4.5g/kg
- E.5g/kg

参考答案：A

[单选题]19. 过多的热量和肥胖会导致()。

- A.肝癌
- B.膀胱癌
- C.乳腺癌
- D.脑胶质瘤
- E.前列腺癌

参考答案：C

参考解析：高热量和高脂肪饮食导致乳腺癌、大肠癌、胰腺癌的发生率增高。

[单选题]20. 大肠癌的最好发部位是

- A.直肠
- B.乙状结肠
- C.盲肠
- D.升结肠
- E.降结肠

参考答案：A

参考解析：大肠癌发生部位约半数以上位于直肠。

[单选题]21.Karnodsky 评分中 40 分是指

- A.病重，需住院及积极支持治疗
- B.失去活动能力，需特别照顾和帮助
- C.勉强可正常活动，有一些症状或体征
- D.严重失去活动能力需住院，但暂无死亡威胁
- E.生活偶需帮助，但能照顾大部分私人需求

参考答案：B

参考解析：正常，无症状及体征：100分；能进行正常活动，有轻微症状及体征：90分；勉强可进行正常活动，有一些症状及体征：80分；生活可自理，但不能维持正常生活或工作：70分；有时需人扶助，但大多数时间可自理：60分；常需人照料：50分；生活不能自理，需特别照顾：40分；生活严重不能自理：30分；病重，需住院积极支持治疗：20分；病危，临近死亡：10分；死亡：0分

[单选题]22. TNM分期中的 N是指

- A. 原发病灶的数目
- B. 转移病灶的数目
- C. 区域淋巴结受侵
- D. 转移淋巴结的数目
- E. 肿瘤复发次数

参考答案：C

参考解析：TNM分期中的 N表示该肿瘤患者区域淋巴结受侵情况，并不是转移淋巴结的数目。如食管癌 TNM分期中的 N0是指无区域淋巴结转移，N1是指有区域淋巴结转移，与转移淋巴结的数目无关。

[单选题]23. 医师应认真执行医疗文书书写与管理制度，不()医学文书及有关资料。

- A. 伪造
- B. 违规涂改
- C. 销毁
- D. 以上都是

参考答案：D

[单选题]24. 影响医患关系的最次要因素是()

- A. 社会环境的因素
- B. 医务人员的因素
- C. 患者方面的因素
- D. 医院管理的因素
- E. 患者所在单位的因素

参考答案：E

[单选题]25. 女性，52岁，因左乳肿物3个月就诊。体检：左乳外上象限可触及质硬肿物约(6×5)cm，左腋下可及肿大淋巴结，约(2×2)cm，双锁骨上淋巴结无肿大。左乳肿物穿刺细胞学检查发现腺癌细胞。X线胸片及腹B超均未见异常。临床诊断：左乳腺癌、左腋下淋巴结转移。病人的治疗选择

- A. 手术
- B. 手术→化疗→放疗
- C. 放疗→手术→化疗
- D. 化疗→手术→化疗
- E. 化疗+放疗

参考答案：D

参考解析：根据 TNM分期，患者临床分期为III期，对此期治疗原则为先行化疗再手术，术后再考虑放化疗治疗。

[单选题]26. 食管癌放射治疗后失败的主要原因为

- A. 胸内淋巴结复发
- B. 局部复发
- C. 血行转移
- D. 胸内外淋巴结转移
- E. 胸外淋巴转移与血行转移

参考答案：B

参考解析：食管癌放射治疗失败的主要原因为局部未控制、局部复发及远处转移

[单选题]27. 为残存肿瘤标志，R1是什么定义

- A. 切除区域淋巴结
- B. 显微镜下可见肿瘤残存
- C. 对有否残留癌无法估计
- D. 肉眼可见残存肿瘤
- E. 无残留癌

参考答案：B

参考解析：R0没有残存肿瘤；R1显微镜下肿瘤残留；R2肉眼肿瘤残留

[单选题]28. 25岁青年，已经穿刺证实右侧胫骨下端骨肉瘤，治疗应选择

- A. 尽快截肢手术
- B. 放射治疗后尽快手术
- C. 放疗+化疗
- D. 化疗后手术
- E. 核素治疗

参考答案：D

参考解析：诊断明确后，应尽早做截肢术或关节离断术，手术前后配合化疗和放疗可能提高疗效，单纯应用化疗或放疗效果不大

[单选题]29. 控制吸烟可降低患癌风险的比率

- A. 20%
- B. 40%
- C. 60%
- D. 30%
- E. 50%

参考答案：D

[单选题]30. 下列不属于食管癌高发的地区是

- A. 华北三省交界地区

- B. 四川北部
- C. 鄂豫皖交界的大别山区
- D. 苏北地区
- E. 东北的大兴安岭地区

参考答案：E

[单选题]31. 针对雌激素受体和孕激素受体阳性患者乳腺癌内分泌治疗有效率可提高至

- A. 10%~20%
- B. 20%~30%
- C. 30%~40%
- D. 40%~50%
- E. 50%~60%

参考答案：E

[单选题]32. 最先被发现和克隆的肿瘤易感基因(抑癌基因)是

- A. p53
- B. p16
- C. p15
- D. Rb
- E. p27

参考答案：D

参考解析：Rb即视网膜母细胞瘤基因是第一个被克隆的抑癌基因（1989年）

[单选题]33. 与吸烟有关的肿瘤是

- A. 大肠癌
- B. 下咽癌
- C. 宫颈癌
- D. 皮肤癌
- E. 肝癌

参考答案：B

参考解析：下咽癌的发生原因主要与吸烟、饮酒有关，据统计，90%的下咽癌患者有吸烟史。

[单选题]34. 关于神经病理性疼痛的描述中错误的是()。

- A. 三环类抗抑郁药物可与吗啡合用于烧灼样疼痛患者
- B. 属于临床难治性疼痛
- C. 应当合理使用辅助用药
- D. 吗啡类药物无效
- E. 电击样疼痛最好辅助选用抗惊厥类药物

参考答案：D

参考解析：神经病理性疼痛是疼痛处理中比较困难的一类疼痛，单用阿片类药物

疼痛控制不佳，一般联合使用一些辅助药物，如三环类抗抑郁药物可与吗啡合用于烧灼样疼痛患者，电击样疼痛最好辅助选用抗惊厥类药物。值得注意的是，此类辅助药物需要使用较长时间(5~7天)后才能达到较好疗效。

[单选题]35. 世界范围内女性肿瘤发病前三位的顺序为()。

- A. 乳腺癌、肺癌、肝癌
- B. 肺癌、肝癌、乳腺癌
- C. 乳腺癌、肺癌、大肠癌
- D. 食管癌、宫颈癌、大肠癌
- E. 宫颈癌、乳腺癌、大肠癌

参考答案：C

[单选题]36. 疼痛程度数字评估法

- A. 不可信，由于疼痛是病人的主观感受
- B. 用于比较不同病人的疼痛程度
- C. 应该反复应用于癌症疼痛病人及疼痛治疗期的疼痛评估
- D. 最好由医生评估
- E. 最好由护士评估

参考答案：C

参考解析：数字评估法是由患者根据自己的疼痛体验直接标记的，不由医务人员评估，但受个人对疼痛的耐受力影响无法在患者间比较。

[单选题]37. 下列哪种肿瘤肥大性骨关节病的发生率最高

- A. 胸膜间皮瘤
- B. 乳腺癌
- C. 肾癌
- D. 肺癌
- E. 多发性骨髓瘤

参考答案：D

参考解析：肥大性骨关节病又称肺性骨关节病，多继发于肺癌、肺脓肿等

[单选题]38. 关于上腔静脉综合征，下列哪项叙述不正确

- A. 上腔静脉综合征必须等一切诊断均完成后再治疗
- B. 上腔静脉综合征一经诊断，不必等待组织病理学结果就应开始治疗
- C. 严重的上腔静脉综合征可继发颅内高压
- D. 放疗是大多数肿瘤引起的上腔静脉综合征的首选治疗方法
- E. 上腔静脉综合征应抗凝治疗

参考答案：A

参考解析：病情危重情况下，在取得组织病理学诊断之前就应开展治疗。

[单选题]39. 有关医师人文关怀叙述正确的是()

- A. 医师不仅要关注治疗疾病过程，更应关注患者体验和感受
- B. 医师应将患者社会地位作为临床诊疗的重要依据

- 医师应对不同民族、性别、贫富和宗教信仰的患者区别对待
- D. 医师拥有高超的医疗技能就足以赢得患者信任
 - E. 医师应否决患者及其家属在充分知情条件下对诊疗决策的决定权

参考答案：A

[单选题]40. 晚期癌症病人的疼痛发生率

- A. <10%
- B. <20%
- C. <30%
- D. <40%
- E. 达60%以上

参考答案：E

参考解析：晚期癌症病人的疼痛发生率高达75%以上

[单选题]41. 肿瘤患者已不能进行正常的日常活动，但在大多数时间生活可自理，只是偶尔需要人帮助，白天卧床时间不超过50%，其行为状态的Karnofsky和ECOG评分分别为

- A. Karnofsky 评分60分，ECOG评分2分
- B. Karnofsky 评分60分，ECOG评分1分
- C. Karnofsky 评分70分，ECOG评分1分
- D. Karnofsky 评分70分，ECOG评分2分
- E. Karnofsky 评分50分，ECOG评分2分

参考答案：A

[单选题]42. 女性，65岁，晚期乳腺癌终末期，广泛性骨转移，右第4肋骨病理性骨折，严重呼吸困难及右胸痛进行性加重，治疗首先考虑

- A. 放射治疗
- B. 止痛及呼吸镇静药
- C. 抗生素
- D. 吸痰
- E. 呼吸兴奋药

参考答案：B

[单选题]43. 癌痛的非药物治疗方法不包括

- A. 物理疗法，如冷热敷、按摩等皮肤刺激、运动和锻炼、改变或固定体位等
- B. 社会心理干预，主要包括放松、冥想、分散注意力、调整心境、教育病人、认知-行为疗法等心理治疗
- C. 经皮神经电刺激(TENS)或针刺等
- D. 神经外科、肿瘤放疗及手术等
- E. 肿瘤化疗，借助药物的神经麻醉

参考答案：E

[单选题]44. 止痛药物治疗效果不佳是

- 与止痛药用药方法无关
- B.不要紧，只要病人没有不良反应
 - C.与药剂量无关
 - D.可能是由于疼痛评估不足所致
 - E.与用药种类无关

参考答案：D

参考解析：准确评估疼痛是有效止痛治疗的前提

[单选题]45. 癌症疼痛病人接受阿片类药物止痛治疗，可以给予最大耐受剂量的时间为

- A.预计生存时间不足1周
- B.预计生存时间不足1个月
- C.在癌痛治疗需要的任何时候
- D.预计生存时间不足3个月
- E.预计生存时间不足6个月

参考答案：C

参考解析：癌症疼痛止痛治疗所需要的阿片类药物用药剂量有较大的个体差异。剂量调整的基本原则是将止痛药剂量(包括按时给药与必要时给药的剂量)调整到理想止痛效果，降低不良反应的程度

[单选题]46. 预防皮肤癌的最好方法是

- A.避免皮肤晒伤
- B.避免中午直射的阳光
- C.夏天外出时穿衣戴帽
- D.多运动
- E.多游泳

参考答案：A

参考解析：减少皮肤过度暴晒，是预防皮肤癌的最佳方法

[单选题]47. 转移性非小细胞肺癌，使用卡铂+紫杉醇治疗，最佳用药方法是

- A.每3~4周为1个周期，连续6周期后改为每2个月1个周期，第2年起每季度1个周期巩固治疗
- B.每3~4周为1个周期，连续治疗，直至肿瘤进展，换用新的治疗方案
- C.每3~4周为1个周期，连续4周期后停药，改用对症支持治疗并定期随访
- D.采用多种不同药物方案交替治疗
- E.生物治疗

参考答案：C

[单选题]48. 前哨淋巴结检测是为了判断

- A.明确病理诊断
- B.明确是否需要手术
- C.有无全身淋巴结转移

区域淋巴结状况

E. 患者免疫状况

参考答案：D

参考解析：前哨淋巴结是指首先接受区域淋巴引流的哪一组淋巴结（可以是一个或者多个淋巴结），在恶性肿瘤是指肿瘤细胞到达的第1站淋巴结，如果前哨淋巴结不发生转移，则其他淋巴结发生转移的可能性 $<1\%$ 。

[单选题]49. 新辅助化疗（neoadjuvant chemotherapy）的含义符合以下哪一项

A. 全新药物进行的化疗

B. 化疗药物的使用途径与目前化疗途径完全不同

C. 术中化疗

D. 术前化疗

E. 术前+术中+术后联合化疗

参考答案：D

参考解析：新辅助化疗即手术或放疗前的诱导化疗，主要用于IVA期患者，疗程3~4个周期，约有80%患者化疗后肿瘤明显缩小，可进一步提高远期疗效；有利于选择有效的化疗药物，及早更换不敏感的药物。

[单选题]50. 男性，48岁，最近胃镜检查诊断为胃慢性萎缩性胃炎伴有中度上皮异型增生，并发现幽门螺杆菌（HP）阳性。治疗选择

A. 继续观察对症治疗

B. 治疗幽门螺杆菌

C. 抑制胃酸

D. 尽早安排手术

E. 服用扶正中药

参考答案：B

参考解析：清除胃内幽门螺杆菌感染，可使胃癌癌前病变及胃癌的发病风险降低40%。

[单选题]51. 下列皮肤肿瘤，哪种与日光照射无关

A. 基底细胞癌

B. 皮肤隆突性纤维肉瘤

C. 皮肤鳞状细胞癌

D. 皮肤黑色素瘤

E. 角化性棘皮瘤

参考答案：B

参考解析：B项是一种生长缓慢，起源于皮肤，并可扩展至皮下组织的局限性低度恶性的纤维肉瘤。病因不明，切除不干净时容易复发。

[单选题]52. 中医中药在肿瘤康复中的作用是（）。

A. 效果同化疗

B. 毒副作用大

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136201233054010032>