

## 血液病学主治医师考试 真题及答案

《天宇考王》主治医师考试题库包含：章节练习、综合复习题、模拟试卷、考前冲刺、历年真题、基础知识、相关专业知识、专业实践能力、更多题型，题库请到《天宇考王》官网 免费下载试用：  
复制网址到浏览器打开 。



TYKW® 天宇考王

医学中级职称考试题库

2016版

主治医生 主治中医 医技考试 护理考试

**不用看书  
轻松学习** (买单机版送手机版)

仅需一个注册码:  
即可在电脑上和手机端任意答题、练习!

导致中枢神经系统白血病的白血病类型是

正确答案：

答案解析：急淋白血病 的白血病细胞 淋巴细胞 易浸润  
中枢神经系统引起中枢神经系统白血病，所以白血病类型是 。

关于慢性粒细胞白血病急性变，下列哪项不正确

骨髓和血中原始细胞一般为 %~

不出现髓外原始细胞浸润

大多为急性粒细胞白血病变

%~ %为急性淋巴细胞白血病变

为慢性粒细胞白血病的终末期

正确答案：

答案解析：慢性粒细胞白血病急性变时，可以出现髓外原始细胞  
浸润，如中枢神经系统浸润等，所以 是不正确的，其余各项都正确。

血管受损后所释放的某些因子的描述，哪一项是错误的

血管受损后基底胶原暴露，激活因子XII，启动内源性凝血途径

表达并释放因子VIII，导致血小板在损伤部位粘附和聚集

表达并释放组织因子，启动外源性凝血系统

释放组织型纤维蛋白溶酶原激活剂 ，激活纤维蛋白溶解

系统

表达并释放血栓调节蛋白，启动蛋白 系统

正确答案：

答案解析：血管受损后表达并释放 因子，导致血小板在损伤  
部位黏附和聚集。

下面关于肝素的描述，哪一项是错误的

肝素为硫酸粘多糖类物质

抗凝作用主要表现为抗 和凝血酶

抗凝机制与蛋白 系统密切相关

肝素还有促进内皮细胞释放 ，增强纤溶活性的作用

主要由肺或肠黏膜肥大细胞合成

正确答案：

答案解析：肝素抗凝机制与 III密切相关。

关于血管的止血机制说法不正确的是

血管损伤后立即收缩止血

释放 促进血小板聚集

内皮释放 启动内源性凝血

基底胶原暴露激活 XII

释放 增强血管收缩

正确答案：

[题库下载请复制下面网址到浏览器](#)

答案解析：血管的止血机制包括血管收缩和分泌功能，内皮细胞释放 促进血小板聚集、基底胶原暴露激活 XII、释放 增强血管收缩都正确，释放 组织因子 是启动外源性凝血 错误。

延长见于哪几种凝血因子缺乏

因子XII、XI、IX、VIII

因子XII、XII、V、X

因子XI、X、IX、V

因子II、VIII、IX、XII

因子II、VII、V、X

正确答案：

答案解析： 即凝血酶原时间，是反映外源性凝血系统功能的  
筛选试验，凝血因子II、V、VII及 缺乏或凝血活性减低时 延长。

体内最重要的抗凝物质是

蛋白 系统

抗凝血酶

组织因子途径抑制物

肝素

$\alpha$

抗胰蛋白酶

正确答案：

答案解析：在人体抗凝系统中，抗凝血酶 是人体内最重要的  
抗凝物质，约占血浆生理性抗凝活性的 %。

下列疾病由复合性止血机制异常引起的是

过敏性紫癜

血友病

维生素 缺乏症

正确答案：

答案解析：考点是出血性疾病发病机制。在所列疾病中，过敏性紫癜属血管壁异常所致，因血小板破坏增多引起，血友病是凝血因子Ⅷ缺乏，为遗传性凝血异常，维生素缺乏引起获得性凝血因子缺乏，只有即血管性血友病因子生成减少或功能异常伴随Ⅷ：减少，血小板黏附、聚集功能障碍，属复合性止血机制异常引起的疾病。

一位正在接受糖皮质激素治疗的患者，突然出现脑出血，下列紧急处理措施中不适当的是

血小板输注

静脉注射丙种球蛋白

血浆置换

大剂量甲泼尼龙静脉注射

氨肽素口服

正确答案：

答案解析：考点是急症处理，包括急症处理的适应证 血小板低于  $\times$  / 者；出血严重广泛者；疑有或已发生颅内出血者；近期将手术或分娩者。处理措施有血小板输注、静脉注射丙种球蛋白、血浆置换、大剂量甲泼尼龙。本例患者发生脑出血，氨肽素口服不能很快提高血小板，对脑出血无特殊意义，其他治疗均可应用。

患者最常出现的抗体是

,

, 抗

,

,

抗 抗体, 抗 抗体

正确答案:

答案解析: 是因血小板免疫性破坏导致外周血中血小板减少的出血性疾病, %以上的患者及阳性, 而其他组合主要见于其他一些风湿性疾病, 患者部分也可以出现其他抗体阳性。

下列有关 的描述, 不适当的是

脾不大

骨髓巨核细胞数量增多

巨核细胞体积变大

血小板计数减少

出血时间延长

正确答案:

答案解析: 患者血小板计数减少, 反映血小板数量和功能指标之一的出血时间会延长, 脾不大, 骨髓巨核细胞数量增多或正常, 巨核细胞发育成熟障碍, 表现为巨核细胞体积变小, 而不是变大。

[题库下载请复制下面网址到浏览器](#)

男， 岁， 个月来间断发热伴腰痛，化验 / ，  
和 正常，尿蛋白 ，尿本周蛋白 ，血清蛋白电泳未见 带，  
/ ， . / ， . / ， 和 减低未测出，骨  
髓浆细胞占 %， 线片见 ~

有椎体压缩性骨折，诊断为多发性骨髓瘤。其

类型是

型

型

型

非分泌型

轻链型

正确答案：

答案解析：血清蛋白电泳见 、 、 均降低的骨髓瘤多为

、 型、非分泌型、轻链型。非分泌型不会出现尿本周蛋白。

地方性斑疹伤寒和流行性斑疹伤寒最重要的鉴别诊断为

临床表现轻重不同

发病季节不同

病死率不一

外斐反应

豚鼠阴囊肿胀试验

正确答案：

地方性斑疹伤寒和流行性斑疹伤寒最重要的鉴别诊断为

临床表现轻重不同

发病季节不同

病死率不一

外斐反应

豚鼠阴囊肿胀试验

女性， 岁， 月初无明显诱因下出现畏寒、发抖，继之发热，体温达 ℃，伴有剧烈头痛，数小时后热退，热退后患者感体力尚可，能进食，每 天发作 次。血象：白细胞数 ×

，中性粒细胞 。追问病史已停经 个月。

【 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 、 、 、 、 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。】

本病人应考虑什么诊断

流感

疟疾

钩端螺旋体病

流行性出血热

流行性乙型脑炎

正确答案：

如何明确诊断

血培养

钩体病凝溶试验

血涂片找疟原虫

出血热 抗体

乙脑 特异性抗体

正确答案：

应采取哪项治疗措施

病毒唑

氯喹加伯胺喹啉

阿的平加伯胺喹啉

小剂量青霉素逐渐加量

氯喹快速静脉内推注

正确答案：

流行性出血热患者每日尿量由 增加到 ，但血尿素氮和肌酐反而上升，症状加重 流行性出血热患者每日尿量 ，氮质血症逐步下降 流行性出血热患者出现顽固性呃逆、烦躁、嗜睡，皮肤淤斑增多，尿量 流行性出血热患者球结膜水肿明显，眼结膜呈片状出血及少量血尿，体温 ℃ 流行性出血热患者血压下降，心率加快

【 型题：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的

、 、 、 、 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。】

题库下载请复制下面网址到浏览器

流行性出血热少尿期

流行性出血热患者每日尿量由 增加到 ，但血尿素氮和肌酐反而上升，症状加重

流行性出血热患者每日尿量 ，氮质血症逐步下降

流行性出血热患者出现顽固性呃逆、烦躁、嗜睡，皮肤淤斑增多，尿量

流行性出血热患者球结膜水肿明显，眼结膜呈片状出血及少量血尿，体温 ℃

流行性出血热患者血压下降，心率加快

正确答案：

流行性出血热多尿期

流行性出血热患者每日尿量由 增加到 ，但血尿素氮和肌酐反而上升，症状加重

流行性出血热患者每日尿量 ，氮质血症逐步下降

流行性出血热患者出现顽固性呃逆、烦躁、嗜睡，皮肤淤斑增多，尿量

流行性出血热患者球结膜水肿明显，眼结膜呈片状出血及少量

血尿，体温 ℃

流行性出血热患者血压下降，心率加快

正确答案：

流行性出血热多尿移行期

流行性出血热患者每日尿量由 增加到 ，但血尿  
素氮和肌酐反而上升，症状加重

流行性出血热患者每日尿量 ，氮质血症逐步下降

流行性出血热患者出现顽固性呃逆、烦躁、嗜睡，皮肤淤斑增  
多，尿量

流行性出血热患者球结膜水肿明显，眼结膜呈片状出血及少量  
血尿，体温 ℃

流行性出血热患者血压下降，心率加快

正确答案：

[题库下载请复制下面网址到浏览器](#)

流行性出血热发热期

流行性出血热患者每日尿量由 增加到 ，但血尿  
素氮和肌酐反而上升，症状加重

流行性出血热患者每日尿量 ，氮质血症逐步下降

流行性出血热患者出现顽固性呃逆、烦躁、嗜睡，皮肤淤斑增  
多，尿量

流行性出血热患者球结膜水肿明显，眼结膜呈片状出血及少量

血尿，体温 ℃

流行性出血热患者血压下降，心率加快

正确答案：

男性， 岁，抽烟 年，右胸痛 个月，有时痰中带血，胸片示右上肺片状阴影，血 。

【 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 、 、 、 、 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。】

该例最可能的诊断是

肺炎球菌肺炎

浸润性肺结核

肺真菌病

支气管肺癌

支原体肺炎

正确答案：

为了确诊，首选检查是

胸部

胸部磁共振

放射性核素扫描

经皮穿刺活检

血沉

正确答案:

男性， 岁，反复咳喘 余年，加重 天，嗜睡 天来院。查体：嗜睡，球结膜水肿，皮肤湿暖红润，口唇发绀， ， 次分，脉搏 次分，双肺可闻干湿性啰音，双侧腱反射减弱，双下肢可凹性水肿。

【 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 、 、 、 、 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。】

[题库下载请复制下面网址到浏览器](#)

TYKW® 天宇考王

其神志障碍的最可能原因为

脑血管意外

严重低钠血症

中枢神经系统感染

潴留引起的肺性脑病

感染中毒性脑病

正确答案:

为明确诊断应尽快采取以下哪项检查

头颅

血气分析

腰穿

脑电图

血培养 药敏

正确答案:

对此患者应进行以下治疗,除了

积极抗感染治疗

持续低流量吸氧

建立通畅气道

尽早使用利尿剂,减轻水肿

应用支气管扩张药物

正确答案:

男性, 岁,乙型肝炎后肝硬化病史 年,患者间断出现双下肢水肿。近两年来反复出现腹水,治疗效果差。近日因黄疸加重、合并自发性腹膜炎入院。入院后查患者有高血钠。

【 型题:以下提供若干个案例,每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息,在每一道考题下面的 、 、 、 、 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。】

该患者钠潴留的最主要原因是

钠负荷增加

分泌增加

心房肽合成增加

醛固酮分泌增加,降解减少

交感神经系统兴奋

正确答案:

下列哪些临床表现提示应警惕患者合并肝肾综合征

夜尿增多

患者腹水量增大，双下肢水肿加重

尿常规检查发现大量红细胞

尿钠

尿钠

正确答案:

女性， 岁，间断上腹痛 年，主要表现为空腹痛，进食后缓解，冬春季多发。

【 型题：以下提供若干个案例，每个案例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息，在每一道考题下面的 、 、 、 、 五个备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。】

此病人最可能的诊断是

浅表性胃炎

萎缩性胃炎

十二指肠溃疡

胃溃疡

反流性食管炎

正确答案:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136223223213010044>