

2023 最新临床执业医师二单元全真模拟试卷

1. 阴茎癌的发生与下列哪项原因无关

A. 阴茎皮角

B. 阴茎黏膜白斑

C. 锋利湿疣

D. HPV 感染

E. 性生活频繁

【对的答案】E

【答案解析】阴茎癌绝大多数发生于有包茎或包皮过长者，被认为是包皮垢及炎症长期刺激所致。某些恶性倾向的病变，如阴茎皮角、阴茎黏膜白斑、巨大锋利湿疣等，也可恶变发展为阴茎癌。人乳头瘤病毒（HPV）感染和吸烟也许是阴茎癌发生的重要原因，其他危险原因有阴茎损伤、紫外线照射、干燥性龟头炎等。

2. 女性，40 岁。左腕部玻璃切割伤。体现为左腕部掌侧斜行切口，深达肌层，左手呈爪状畸形，拇指对掌功能丧失，手指浅感觉丧失。其损伤的神经也许是

A. 正中神经

B. 尺神经及正中神经

C. 桡神经及正中神经

D. 尺神经及桡神经

E. 桡神经

【对的答案】 B

【答案解析】腕部掌侧较深切割伤，可伤及行经腕掌侧至手部的正中神经和尺神经。

尺神经穿腕豆骨与钩骨之间的腕尺管即分为深浅两支，深支穿小鱼际肌进入手掌深部，

支配小鱼际

3. 老年患者，50 岁，开始夜尿增多，伴随腺体增大，机械性梗阻加重，排尿困难加，

B 超显示残存尿较多，诊断为前列腺增生。该患者良性前列腺增生的起始部位是

A. 移行带

B. 外周带

C. 中央带

D. 所有前列腺组织

E. 前列腺外壳包膜

【对的答案】A

【答案解析】前列腺病变的常见部位：前列腺增生起始于移行带；前列腺癌多起发于外周带。

4. 防止医学道德价值的社会性，常与下列原因相联络不包括

A. 需要国家资金的投入

B. 需要社会的支持

C. 工作对象是健康的社会人群

D. 防止医学工作者工作的特殊性

E. 工作内容与人们的生活环境有关

对的答案：D

答案解析：由于防止医学的群体性，因而防止医学工作的好坏会影响到整个社会，同步防止医学只依托防止保健人员是不够的，它需要社会的重视、支持和参与。不仅如此，伴随世界经济的发展、交通发达，国家交往日益频繁，以至任何一种国家单独采用疾病（尤其是传染病）的防治措施都不也许有效地控制疾病的发生、传播和保证人群的安全。因此，需要全人类社会的共同协作而进入人类防止的时代。因此，社会性也是防止医学的突出特点。

5. 引起人体病变较轻的阶段

A. 毛蚴

B. 尾蚴

C. 童虫

D. 成虫

E. 虫卵

对的答案：D

答案解析：成虫是引起人体病变较轻的阶段。

6. 防止医学道德价值的社会性，常与下列原因相联络不包括

A. 需要国家资金的投入

B. 需要社会的支持

C. 工作对象是健康的社会人群

D. 防止医学工作者工作的特殊性

E. 工作内容与人们的生活环境有关

对的答案：D

答案解析：由于防止医学的群体性，因而防止医学工作的好坏会影响到整个社会，同步防止医学只依托防止保健人员是不够的，它需要社会的重视、支持和参与。不仅如此，伴随世界经济的发展、交通发达，国家交往日益频繁，以至任何一种国家单独采用疾病（尤其是传染病）的防治措施都不也许有效地控制疾病的发生、传播和保证人群的安全。因此，需要全人类社会的共同协作而进入人类防止的时代。因此，社会性也是防止医学的突出特点。

7. 男性，19 岁，无业青年，父亲是生意人，该青年 5 年来一直在购置收藏女性的高跟鞋而感到满足，并且晚上要抱着高跟鞋睡觉，在门诊诊断为 恋物癖 ， 对此类患者的治疗措施最佳选择

A. 询者中心疗法

B. 厌恶疗法

C. 交互克制法

D. 冲击疗法

E. 电击

对的答案：B

答案解析：厌恶疗法是把病人厌恶的刺激与对病人有吸引力的不良情绪或行为相结合，使已形成的不良条件反射消退。

8. 男，35岁。2天前忽然出现尿频、尿急及排尿痛，排尿时出现尿线中断，并伴有寒战和高热。直肠指检前列腺肿胀、压痛、局部温度升高。尿沉渣可见白细胞。患者首先考虑

- A. 急性细菌性前列腺炎
- B. 慢性细菌性前列腺炎
- C. 慢性非细菌性前列腺炎
- D. 急性膀胱炎
- E. 急性肾盂肾炎

【对的答案】 A

【答案解析】急性细菌性前列腺炎发病忽然，为急性疼痛伴伴随排尿刺激征和梗阻症状以及发热全身症状、经典症状为尿频、尿急、排尿痛，梗阻症状为排尿踌躇、尿线中断，甚至急性尿潴留，会阴部及持股上疼痛。

9. 对流感人口中的传染性非经典肺炎病人、疑似病人处理的原则是

A.就地控制、就地治疗、就地康复

B.就地隔离、就地治疗、就地康复

C.就地控制、就地观测、就地治疗

D.就地隔离、就地观测、就地治疗 E.就地观测、就地治疗、就地康复

对的答案：D

答案解析：对传染病爆发、流行区域内流感人口，对传染病病人和疑似传染病病人，应当采用就地隔离、就地观测、就地治疗的措施。

10. 癌细胞穿破乳腺导管或腺泡的基底膜而侵入间质者

A.乳腺小叶原位癌

B.乳腺导管内原位癌

C.paget 病

D.乳腺浸润性癌

E.乳腺炎样癌

对的答案：D

答案解析：浸润性导管癌是乳腺癌中最常见的类型，占乳腺癌的 50%~80%。导管内癌的癌细胞突破导管基底膜进入间质，即为浸润性导管癌。

11.2cm，IVP 右肾功能正常，轻度积水，输尿管畅通，首选的治疗措施是

- A. 中药排石
- B. 消炎止痛
- C. 手术取石
- D. 体外震波碎石
- E. 大量饮水

【对的答案】D

【答案解析】非手术治疗：结石<0.6cm，光滑，无梗阻及感染、纯尿酸结石或胱氨酸结石，应试行药物排石及溶石治疗。体外冲击波治疗（ESWL：合用于肾、输尿管上

□≤2cm □□□□ 经皮肾镜取石或碎石术（PCNL□□□□≥2cm □□□□□□□□

肾盏结石及鹿角形结石。

12. 药理效应与剂量在一定范围内伴随剂量或浓度的增长而增长的规律性变化，为

- A. 时间-效应关系

B. 剂量-效应关系

C. 时间-反应关系

D. 剂量-反应关系

E. 浓度-剂量关系

对的答案：B

答案解析：剂量-效应关系：药理效应与剂量在一定范围内伴随剂量或浓度的增长而增长的规律性变化，故选 B。

13. 支气管哮喘发作的本质是

A. 气道慢性炎症

B. 气道高反应性

C. 可逆性气流受限

D. 不完全可逆的气流受限

E. 对外界物质过敏性疾病

【对的答案】A

真菌性肺炎

B.病毒性肺炎

C.过敏性肺炎

D.急性粟粒性肺结核

E.细菌性肺炎

【对的答案】D

【答案解析】思绪：“青霉素”“头孢菌素”抗感染无效，要想到是特殊的感染：结核、真菌、病毒。双肺多发小结节一下就排除了真菌和病毒。多发结节应当想到三种状况：粟粒性肺结核、矽肺、肿瘤。本题高热，消瘦，提醒消耗性疾病，答案牢牢锁定在结核上了。困惑点：**PPD** 试验阴性并不能排除结核，可以发生在抵御力极差的人群，尤其是粟粒性肺结核。

16. 调整肽是由下丘脑神经细胞产生的，其作用是通过

A.下丘脑-垂体束运送到腺垂体

B.下丘脑-垂体束运送到神经垂体

C.垂体门脉运送到腺垂体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138012016007006023>