

## 外科护理学试题库及答案

1. 膀胱癌最常见的临床表现是

- A. 尿频
- B. 尿潴留
- C. 排尿困难
- D. 血尿
- E. 尿急、尿痛

2. 腰椎间盘突出症病人腰部活动时，最容易受限的动作是

- A. 前屈
- B. 后伸
- C. 患侧倾斜
- D. 健侧倾斜
- E. 左右旋转

3. 对使用石膏绷带病人的护理措施中正确的是

- A. 四肢石膏包扎时要包住手指或足趾
- B. 石膏干固后关节部位可以承受较大弯曲力
- C. 石膏污染时可用毛巾蘸多量清水擦洗
- D. 若石膏内皮肤瘙痒，可将物品伸入石膏内搔抓
- E. 石膏未干前搬动病人时应用手掌平托

4. 神经根型颈椎病患者可能出现（ ）

- A. 眩晕
- B. 躯干有紧束感
- C. 上肢牵拉试验阳性

D. 行走有踩棉花感

E. 恶心、视物模糊

5. 老年男性尿潴留最常见的原因是

A. 尿道狭窄

B. 膀胱结石

C. 良性前列腺增生症

D. 膀胱肿瘤

E. 膀胱结核

6. 头皮撕脱伤病人被撕脱的头皮的保存方法是

A. 浸泡在生理盐水中常温保存

B. 浸泡于无菌用水中

C. 无菌敷料包裹，常温保存

D. 无菌敷料包裹、隔水低温保存

E. 无菌敷料包裹浸泡 4℃ 的生理盐水中

7. 某病人因车祸被抬入急诊室。下颌骨开放性骨折，并有舌后坠。CT 检查显示颅内血肿，量约 30 ml。首要的处理措施是

A. 降低颅内压

B. 下颌骨固定

C. 保持呼吸道通畅

D. 补充血容量

E. 立即手术

8. 急性硬膜外血肿病人典型的意识障碍表现为 ( )

A. 短暂昏迷

B. 持续昏迷

C. 昏迷-清醒-昏迷

D. 昏迷持续加重

E. 昏迷程度有波动

9. 良性前列腺增生症最简便易行、有效的检查手段是

A. B超

B. 静脉肾盂造影

C. 膀胱镜检查

D. 直肠指诊

E. 肾图

10. 良性前列腺增生症最早出现的症状是

A. 尿线变细

B. 尿滴沥

C. 尿频及夜尿次数增多

D. 急性尿潴留

E. 尿失禁

11. 颅内压增高病人床头抬高  $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ ，主要目的是为了

A. 有利于鼻饲

B. 有利于改善呼吸功能

C. 有利于颅内静脉回流

D. 有利于改善心脏功能

E. 防止呕吐物误入呼吸道

12. 下列骨折中属于不完全骨折的是

A. 青枝骨折

B. 斜形骨折

C. 骨骺分离

D. 横骨折

E. 压缩骨折

13. 腰椎结核病人可出现

A. 头前倾，双手托下颌

B. 托马斯征阳性

C. “4”字试验阳性

D. 拾物试验阳性

E. 浮髌试验阳性

14. 不符合枕骨大孔疝表现的是

A. 剧烈头痛

B. 反复呕吐

C. 呼吸骤停发生早

D. 没有瞳孔改变

E. 意识改变出现早

15. 枕骨大孔疝不同于小脑幕切迹疝的临床表现是

A. 头痛剧烈

B. 呕吐频繁

C. 意识障碍

D. 呼吸骤停出现早

E. 血压升高，脉缓有力

16. 可损害第8对脑神经，导致病人出现耳鸣、耳聋等表现的药物是

A. 异烟肼

B. 链霉素

C. 乙胺丁醇

D. 对氨基水杨酸钠

E. 利福平

17. 脑损伤病人的病情观察项目中最重要的是

A. 呼吸

B. 血压

C. 脉搏

D. 体温

E. 意识状态

18. 急性硬脑膜外血肿病人意识障碍的典型表现是

A. 短暂昏迷

B. 中间清醒期

C. 持续昏迷

D. 昏迷程度时重时轻

E. 昏迷进行性加重

19. 颅内压升高病人，医嘱给予输注 20%甘露醇 250 ml，输注时间至多

A. 10 分钟

B. 30 分钟

C. 60 分钟

D. 90 分钟

E. 120 分钟

20. 当椎间盘突出时神经根处于固定或半固定状态时，若病人仰卧，被动直腿抬高在多少度以内出现坐骨神经痛，称为直腿抬高试验阳性。

A. 30°

B. 40°

C. 50°

D. 60°

E. 70°

21. 男性最常见的泌尿系损伤部位是

A. 肾

B. 输尿管

C. 膀胱

D. 前尿道

E. 后尿道

22. 上尿路结石最多见于

A. 肾盂

B. 肾盏

C. 输尿管中段

D. 输尿管上 1/3

E. 输尿管下 1/3

23. 枕骨大孔疝的典型表现是 ( )

A. 头痛剧烈

B. 呕吐频繁

C. 呼吸骤停出现早

D. 血压升高

E. 一侧瞳孔散大

24. 通过改善毛细血管通透性降低颅内压的治疗方法是 ( )

A. 脱水治疗

B. 过度换气

C. 激素治疗

D. 冬眠低温治疗

E. 脑室穿刺外引流术

25. 昏迷病人因意识不清、长期卧床可造成下列多种并发症，除了

A. 消化系统感染

B. 泌尿系感染

C. 肺部感染

D. 暴露性角膜炎

E. 足下垂

26. 压迫颈交感神经丛可出现霍纳综合征，哪项不是主要表现

A. 患侧眼球内陷

B. 患侧上睑下垂

C. 患侧瞳孔缩小

D. 声音嘶哑

E. 同侧面部无汗

27. 颅内压增高的客观征象是（ ）

A. 头痛

B. 呕吐

C. 视神经乳头水肿

D. 神志淡漠

E. 呼吸深慢

28. 尿路结石的主要预防措施不包括（ ）

A. 多运动

B. 多饮水

C. 多卧床

D. 解除造成尿路梗阻

E. 鼓励病人均衡饮食

29. 输尿管结石病人绞痛发作时, 最重要处理方法是

A. 大量饮水

B. 应用抗生素

C. 跳跃运动

D. 解痉止痛

E. 立即手术治疗

30. 良性前列腺增生症的发生的必备条件是

A. 肥胖

B. 年龄大于 50 岁

C. 性功能正常

D. 有生育能力

E. 老龄和有功能的睾丸

31. 骨筋膜室综合征的严重后果是

A. 关节僵硬

B. 缺血性骨坏死

C. 骨化性肌炎

D. 缺血性肌挛缩

E. 创伤性关节炎

32. 输尿管结石病人绞痛发作时, 最重要的处理方法是

A. 大量饮水

B. 应用抗菌药物

C. 解痉止痛



D. 立即手术治疗

E. 跳跃运动

33. 下列关于冬眠低温治疗期间的护理的叙述错误的是

A. 冬眠期间不宜翻身或移动体位

B. 通常体温降至 32~34 °C

C. 收缩压低于 80 mmHg 应停止给药

D. 复温时应先停止使用冬眠药物

E. 降温前先给病人使用冬眠药物

34. 一患者左腰部被重物击伤，自觉疼痛，查体见左腰部压痛、扣击痛，血压、脉搏正常，尿液镜检红细胞 10~15 个/高倍视野，应考虑

A. 腰部挫伤

B. 肾挫伤

C. 肾部分裂伤

D. 肾全层裂伤

E. 肾蒂裂伤

35. 防治脑水肿，应用最广，效果较好的脱水剂是

A. 50%葡萄糖溶液

B. 20%甘露醇溶液

C. 25%山梨醇溶液

D. 30%尿素溶液

E. 浓缩血清白蛋白

36. 肾结石病人的主要症状是

A. 尿失禁

B. 排尿困难

C. 活动后镜下血尿

D. 无痛性血尿

E. 尿频、尿急

37. 以下是脑室引流术后，引流管无脑脊液流出的原因，除了

A. 颅内压高于 0.98~1.47kPa (12~15cmH<sub>2</sub>O)

B. 引流管放入脑室过深

C. 管口吸附于脑室壁

D. 引流管被小凝血块阻塞

E. 引流管被挫碎的脑组织阻塞

38. 诊断颅底骨折最可靠的临床表现是

A. 意识障碍

B. 头皮出血

C. 颅底骨质凹陷

D. 脑脊液漏

E. 脑脊液含血

39. 观察颅脑损伤患者病情时，为避免患者躁动影响准确性，应首先观察 ( )

A. 瞳孔

B. 呼吸

C. 脉搏

D. 血压

E. 神志

40. 脑疝急救护理，下列哪项是错误的

A. 吸氧

B. 保持呼吸道通畅

C. 快速静脉输入 50%葡萄糖

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/13802102510006035>