

主治医师考试口腔医学(习题卷47)

说明：答案和解析在试卷最后

第1部分：单项选择题，共100题，每题只有一个正确答案，多选或少选均不得分。

1. [单选题]下面对人体试验的理解，错误的是

- A) 为了获得医学科研成果，应该尽量多地开展人体试验，如果缺少受试者，可以通过多给报酬的办法增加志愿者
- B) 人体试验是医学基础理论研究和动物实验之后，常规临床应用之前不可缺少的中间环节
- C) 人体试验是医学的起点和发展手段
- D) 人体试验必须在动物实验之后

2. [单选题]一位患者右下第一磨牙缺失3个月，设计固定桥修复。如果第二磨牙近中倾斜，倾斜牙作固定桥基牙的最大障碍是

- A) 难以获得美观
- B) 共同就位道的获得
- C) 牙周应力集中
- D) 牙髓损害
- E) 难以边缘密合

3. [单选题]最易发生恶变的色素痣(见图)是 ()



- A) 交界痣
- B) 毛痣
- C) 皮内痣
- D) 雀斑样色素痣
- E) 复合痣

4. [单选题]对放射治疗不敏感的恶性肿瘤是哪种 ()

- A) 浆细胞肉瘤
- B) 恶性黑色素瘤
- C) 尤文肉瘤

- D) 未分化癌
- E) 恶性淋巴瘤

5. [单选题]逆行性牙髓炎常见病因是 ()



- A) 根尖肉芽肿
- B) 牙周脓肿
- C) 深牙周袋
- D) 创伤性合
- E) 血运感染

6. [单选题]口腔颌面部血循环丰富，受伤后通常还会导致

- A) 出血较多，常见发生休克
- B) 易形成血肿
- C) 组织水肿反应快而重
- D) 组织再生修复能力强
- E) 组织抗感染力强

7. [单选题]颈内动脉经哪儿入颅

- A) 圆孔
- B) 卵圆孔
- C) 棘孔
- D) 茎乳孔
- E) 颞骨的颈动脉管

8. [单选题]在釉质发育中启动釉质矿化的是

- A) 釉基质
- B) 酶
- C) 成釉细胞
- D) 釉基质蛋白
- E) 以上都不是

9. [单选题]带状疱疹的临床特征为 ()

- A) 口腔粘膜反复出现散在的圆形或椭圆性溃疡
- B) 牙龈、上腭等的口腔粘膜出现簇集的针头大小的透明水疱
- C) 口腔粘膜、手掌、足底出现水疱、丘疹等皮损
- D) 口腔粘膜出现白色凝乳状的斑点或斑块，不易擦掉
- E) 皮肤及口腔粘膜出现丛集成簇的疱疹，并沿神经排列，不超过中线

10. [单选题]第一鳃弓衍化出的面突是

- A) 中鼻突
- B) 上颌突
- C) 下颌突
- D) 颌突和下颌突
- E) 球状突

11. [单选题] 颈淋巴触诊时病人的体位为

- A) 坐位，两眼平视
- B) 坐位，头低向前方和受检侧
- C) 坐位，头略仰起
- D) 平卧，头偏向健侧
- E) 自由体位，肌肉放松

12. [单选题] 一患者戴全口义齿后，诉：左侧咀嚼食物效果好，右侧咀嚼时经常咬颊。应进一步检查

- A) 垂直距离
- B) 义齿固位是否良好
- C) 将新旧义齿进行对比
- D) 咬颊处人工牙的覆盖情况
- E) 检查基托伸展范围

13. [单选题] 下列哪项不是牙列缺失造成的软组织改变

- A) 面下1/3变短
- B) 黏膜变薄变平和敏感性增强
- C) 口角上翘
- D) 舌体增大
- E) 双颊内陷

14. [单选题] 关节盘的最薄处为 ()

- A) 中间带
- B) 前带
- C) 双板区
- D) 后带
- E) 以上均是

15. [单选题] 妊娠期妇女治疗口腔疾病的适宜时期是

- A) 妊娠初期(1~3个月)
- B) 妊娠中期(4~6个月)
- C) 妊娠后期(7~9个月)
- D) 整个妊娠期均可治疗
- E) 整个妊娠期均不可治疗

16. [单选题] 牙尖交错位时

- A) 咀嚼肌处于最松弛状态
- B) 上、下牙达到最大面积接触
- C) 上、下切牙间有1~4mm间隙
- D) 工作侧异名牙尖相对
- E) 工作侧同名牙尖相对

17. [单选题] 有关疱疹性口炎的病理描述，不正确的是

- A) 变性的上皮细胞显著肿胀，呈圆形，可无核，也可一个或多个核
- B) 上皮内可见气球变性和网状液化

- C) 胞核内可见病毒包涵体
- D) 变性细胞位于水疱顶部
- E) 变性细胞间桥消失

18. [单选题]下列哪种肿瘤在口腔颌面部恶性肿瘤中最为常见 ()

- A) 各类肉瘤
- B) 鳞状上皮细胞癌
- C) 腺源性上皮癌
- D) 恶性淋巴瘤
- E) 未分化癌

19. [单选题]关于琼脂印膜材料，下列说法错误的为

- A) 琼脂印膜材料具有反复使用的特点，临床常用作复制模型的印膜材料
- B) 琼脂印膜材料的胶凝温度介于36~40℃之间
- C) 琼脂作为印膜材料是利用其凝胶和溶胶之间的转化
- D) 琼脂印膜材料具有流动性、弹性好，准确性高的特点
- E) 琼脂印膜材料的凝胶转变为溶胶的温度介于50~60℃之间

20. [单选题]隐形义齿的排牙，为加强灌注后弹性树脂对人工牙的包裹和基托的连续，人工牙龈端近远中、盖嵴部与组织面的空隙至少约

- A) 0.5~1.0mm
- B) 0.3~0.5mm
- C) 1.2~1.5mm
- D) 1.0~1.2mm
- E) 0.2~0.3mm

21. [单选题]全口义齿完成蜡型后，进行装盒时，人工牙的切缘或

殆

面与上层型盒顶部之间，至少应保持的间隙为 ()

- A) 4mm
- B) 10mm
- C) 2mm
- D) 8mm
- E) 6mm

22. [单选题]医学伦理学基本理论不包括的是

- A) 生命神圣论
- B) 人权论
- C) 非结果论与义务论
- D) 结果论与功利论
- E) 医学人道论

23. [单选题]固定桥设计是否合理，其中最为重要的一点是

- A) 基牙牙周组织健康
- B) 固位体固位形式与种类选择得当
- C) 基牙牙冠具有足够的长度和体积
- D) 借助于机械力学原理
- E) 基牙负重力不超过其牙周组织的最大承受力

24. [单选题]对于伴有糖尿病的牙周炎，下列哪项是错误的 ()

- A) 患者的龈下菌斑与慢性牙周炎和青少年牙周炎的龈下菌群有区别
- B) 牙周有急性感染而需要切开引流者，应先给抗生素，并只做应急治疗
- C) 应立即进行复杂的牙周治疗
- D) 治疗中应尽量减少组织损伤
- E) 糖尿病本身并不引起牙周炎

25. [单选题]对放射线不敏感的肿瘤是 ()

- A) 鳞状细胞癌
- B) 恶性淋巴瘤
- C) 腮腺腺癌
- D) 牙龈癌
- E) 上颌窦癌

26. [单选题]多形性红班的典型皮肤损害是

- A) 水疱
- B) 结节
- C) 丘疹
- D) 糜烂
- E) 虹膜状红斑

27. [单选题]口内法进行下牙槽神经阻滞麻醉时，进针位置在 ()

- A) 上颌后牙咬合平面CT
- B) 下颌磨牙咬合平面上1cm
- C) 下颌磨牙咬合平面
- D) 腮腺导管口平面
- E) 上颌后牙咬合平面上1cm

28. [单选题]促进骨形成的调节因子是

- A) TGF- β
- 1
- B) IL-1
- C) TNF
- D) PG
- E) IL-6

29. [单选题]患者女，26岁。因左下颌角区渐进性膨隆5个月余就诊。检查见面部不对称，触诊有乒乓球样感觉，临床初步诊断为左下颌骨角化囊肿不出现的临床症状是

- A) 穿刺检查为黄白色油脂样物
- B) 同侧下唇麻木
- C) 左下颌第一磨牙缺失
- D) 舌侧膨隆明显
- E) 囊肿内牙松动、移位

30. [单选题]单侧腮腺无痛进行性肿大，有风湿性关节炎史， γ 球蛋白增高，活检有大量淋巴细胞应诊断为

- A) 腮腺淋巴结核
- B) 慢性化脓性腮腺炎
- C) 腮腺混合瘤
- D) 腮腺放线菌病
- E) 淋巴上皮病

31. [单选题]患者，男性，30岁，近几日突感口腔内多处“牙床”胀痛不适，晨起口中有血腥味。检查：有腐败性口臭，牙龈广泛充血水肿，上、下前牙龈缘如虫蚀状，覆灰白色坏死假膜。下列与本病发生无关的是（）

- A) 存在已久的慢性龈炎或牙周炎
- B) 心身因素
- C) 遗传因素
- D) 营养不良或消耗性疾病
- E) 吸烟

32. [单选题]中年男性，主诉全口牙酸痛，面磨平，咀嚼无力，有耳部疼痛，来院就诊。检查：面下1/3短，牙列完整，全口牙广泛过度磨耗并超过生理范围，

殆

面探硬，无变色、多处过敏点，咀嚼肌及关节有压痛，偶有关节弹响。除上述已有的检查外，重点补充检查

- A) 牙齿活髓测定
- B) 牙周组织检查
- C) 颞下颌关节薛氏位X线
- D) 颌间距测定
- E) 咀嚼效能测定

33. [单选题]患者，女，21岁，恒牙

殆

，磨牙完全II类颌关系，前牙深覆

殆

III°，深覆盖II°，上牙列拥挤I°，

7|6

缺失，上前牙唇倾上颌轻度前突，下颌位置基本正常，牙周情况良好。使用上颌平面导板的目的是

- A) 打开咬合，缩短治疗时间
- B) 关闭拔牙间隙
- C) 增强上颌后牙支抗
- D) 修复缺失牙
- E) 矫正远中错

殆

关系

34. [单选题]牙菌斑内的细菌可以产生以下酶破坏牙周组织，除外（）

- A) 透明质酸酶
- B) 胶原酶
- C) 弹性蛋白酶
- D) 蛋白酶
- E) 水解酶

35. [单选题]面神经的运动纤维包括

- A) 颞支、颧支、颊支、上唇支及下唇支
- B) 额支、颧支、颊支、上唇支及下唇支
- C) 颞支、颧支、颊支、下颌缘支及颈支
- D) 眶支、额支、鼻支、颊支及下唇支
- E) 额支、颊支、上睑支及下颌缘支

36. [单选题]关于龈沟液作用的描述，正确的是

- A) 增强牙龈免疫能力
- B) 可清除异物，增进上皮与牙齿的贴附
- C) 为微生物培养基
- D) 抗菌作用
- E) 以上均正确

37. [单选题] 当在

殆

架上，模拟下颌做前伸运动时，要求排列的全口义齿（ ）

- A) 全口义齿不要求达到前伸时的咬合平衡
- B) 前牙接触，后牙不接触
- C) 前、后牙均不接触
- D) 前、后牙均保持接触
- E) 前牙不接触，后牙接触

38. [单选题] 面部的主要感觉神经是

- A) 三叉神经
- B) 舌神经
- C) 耳颞神经
- D) 面神经
- E) 舌下神经

39. [单选题] 剥脱性龈炎与下列哪项因素无关

- A) 天疱疮
- B) 白斑
- C) 扁平苔藓
- D) 红斑狼疮
- E) 类天疱疮

40. [单选题] 哥特弓描记是为了（ ）

- A) 了解下颌运动情况
- B) 帮助患者下颌后退
- C) 重复测定的客观依据
- D) 确定垂直距离
- E) 确定正中关系位

41. [单选题] 患者，男60岁，主诉：左侧牙齿阵发性剧痛1天。半年多来，左侧下牙遇冷热均痛，食物嵌入洞内后痛，近1周末有自发疼痛。昨夜阵发性剧痛，但分不清哪颗牙痛。口腔检查时，最可能发现（ ）

- A) X线片见根尖有X线透射区
- B) 牙齿松动，牙龈红肿
- C) 深龋、温度测引起剧烈疼痛
- D) 中度磨耗，探划有敏感点
- E) 叩痛(+++)

42. [单选题] 患者，女，40岁，口腔黏膜出现松弛透明的水疱，临床检查，揭壁试验阳性，尼氏征阳性，探诊阳性，诊断首先考虑

- A) 天疱疮
- B) 瘢痕性类天疱疮
- C) 多形红斑
- D) 扁平苔藓

E) 大疱性天疱疮

43. [单选题] 确定有牙槽骨吸收的标准是 ()

- A) X线示根端有圆形或椭圆形阴影
- B) X线示牙周膜间隙透射区变宽
- C) 牙槽嵴顶到釉牙本质界的距离，超过2mm可确定有骨吸收
- D) 牙周袋深度，大于4mm的牙周袋为有骨吸收
- E) 牙齿松动程度，Ⅱ度以上松动为有骨吸收

44. [单选题] 患儿男，9岁，舌背出现红斑1年，红斑有时消失，有时变换位置。检查见舌背有钱币大小的红色区域，边缘为弧形白线，有的呈椭圆形。本病诊断为

- A) 舌乳头炎
- B) 萎缩性舌炎
- C) 舌扁平苔藓
- D) 地图舌
- E) 裂纹舌

45. [单选题] 下颌骨易发生骨折的薄弱部位，不正确的是

- A) 髁突颈部
- B) 颏结节
- C) 下颌角
- D) 正中联合
- E) 颏孔区

46. [单选题] 一位诊断为慢性牙周炎的牙周病患者，已于2个月前完成牙周基础治疗，现需选择最佳手术方法。袋深5mm，附着龈较窄，牙槽骨水平吸收，骨形态尚可，应选择

- A) 引导性组织再生术
- B) 牙周翻瓣术+骨成形术
- C) 冠向复位瓣术
- D) 植骨术
- E) 改良Windman术

47. [单选题] 一位诊断为慢性牙周炎的牙周病患者，已于2个月前完成牙周基础治疗，现需选择最佳手术方法。袋深5~6mm，X线片：牙槽骨吸收不规则应选择

- A) 引导性组织再生术
- B) 牙周翻瓣术+骨成形术
- C) 根向复位瓣术
- D) 牙龈切除术
- E) 改良Windman术+骨成形术

48. [单选题] 设计可摘局部义齿时，若缺失牙间隙的近远中径或

殆

龈距较短，最好选用 ()

- A) 无尖瓷牙
- B) 解剖式瓷牙
- C) 解剖式塑料牙
- D) 金属
- E) 无尖塑料牙

殆

面牙

- E) 无尖塑料牙

49. [单选题]良性肿瘤的治疗原则不包括 ()

- A) 如为临界瘤，应切除肿瘤周围部分正常组织
- B) 以手术为主
- C) 常规辅助化疗
- D) 如有恶变，应扩大切除范围
- E) 不常规作淋巴清扫

50. [单选题]关于颞下颌关节纤维性强直临床特点哪一项不对 ()

- A) 患侧髁突活动明显减弱
- B) 进行性张口受限，可轻微地张口
- C) 开口型偏向患侧
- D) 常见于病变的晚期
- E) 关节区无疼痛

51. [单选题]金属烤瓷瓷冠可用于

- A) 锥形牙
- B) 固定桥固位体
- C) 四环素牙
- D) 前牙错位牙
- E) 以上都是

52. [单选题]酸蚀症的发生中，哪种酸的危害最大

- A) 磷酸
- B) 硫酸
- C) 盐酸
- D) 硝酸
- E) 胃酸

53. [单选题]Begg技术把整个矫治过程分为三期，第一期的矫治目标是

- A) 获得所穿牙齿理想的倾斜度和轴倾角
- B) 牙位及

殆

接触关系的进一步调整

- C) 拉尖牙向远中
- D) 关闭后牙间隙，矫正扭转的前磨牙，调整磨牙关系至 I 类

殆

关系

- E) 打开前牙咬合，解除前牙拥挤，排齐前牙，矫正磨牙反

殆

和锁

殆

54. [单选题]关于神经纤维瘤的说法，哪种是错误的 ()

- A) 头面部多发性神经纤维瘤病可伴有枕骨缺损
- B) 神经纤维瘤病有遗传倾向
- C) 多发性神经纤维瘤又称为神经纤维瘤病
- D) 肿瘤质地柔软，因瘤内血运丰富可压缩
- E) 神经纤维瘤是良性肿瘤

55. [单选题]全口义齿人工牙排列时，为什么要有平衡

殆

- A) 增强义齿的稳定性
- B) 发音清楚
- C) 增强美感
- D) 提高接触面积
- E) 纠正不良习惯

56. [单选题]颌面部复合伤伴有鼻腔、外耳道出血时应考虑有 ()

- A) 鼻部、耳道骨折
- B) 鼻粘膜撕裂伤
- C) 口腔内出血反流至鼻腔
- D) 鼻腔及外耳道软组织损伤
- E) 颅底骨折脑脊液漏

57. [单选题]某女患者头痛数月，遇到感冒和月经来潮时疼痛加重。出于彻底检查的目的到医院坚决要求做CT检查，被医师拒绝。医师开出脑电图检查单和请耳鼻喉科会诊单，患者很不满意。为构建和谐医患关系，该医师应该 ()

- A) 维持信托关系，对不信赖者拒绝接诊
- B) 维持契约信托关系，说服患者先行体格检查，然后酌情处理
- C) 维持契约关系，坚决按医生意见办，待脑电图检查后再定
- D) 维持信托关系，先做CT和脑电图并进行会诊，然后体检
- E) 维持契约关系，完全按患者要求办，开单做CT检查

58. [单选题]前牙切端张开范围

- A) 20~25 mm
- B) 10~15 mm
- C) 15~20 mm
- D) 25~30 mm
- E) 18~25 mm

59. [单选题]与下颌管关系密切的牙是

- A) 下颌第二前磨牙
- B) 下颌第一前磨牙
- C) 下颌第三磨牙
- D) 下颌第一磨牙
- E) 下颌第二磨牙

60. [单选题]错

殆

畸形的发生及其严重程度与下列哪项因素无关

- A) 不良习惯的作用频率
- B) 不良习惯的发生原因
- C) 不良习惯的持续时间
- D) 不良习惯的作用强度
- E) 不良习惯的作用方式

61. [单选题]下列哪一项是直接盖髓的适应证 ()

- A) 慢性溃疡性牙髓炎
- B) 意外穿髓，穿髓孔小于0.5mm者

- C) 逆行性牙髓炎
- D) 可复性牙髓炎
- E) 深龋

62. [单选题] 患者男，56岁，多数后牙缺失，口底到龈缘的距离为6mm，大连接体应该选用

- A) 舌杆加前牙连续卡环
- B) 舌板
- C) 舌杆
- D) 与黏膜平行的接触的舌杆
- E) 以上都不是

63. [单选题] 患者，女，15岁，颏部发育差，唇前突闭合不全，面下1/3高度偏大，覆盖9mm，磨牙完全远中关系，上前牙前突，前牙开

𪙇

，ANB6°，4个第三磨牙牙胚存在，位置正常对此患者诊断为

- A) 安氏II类1分类，前牙开

𪙇

- B) 安氏III类错

𪙇

- C) 单纯的牙列重度拥挤

- D) 安氏I类错

𪙇

- E) 单纯的前牙开

𪙇

64. [单选题] 上颌第二、三磨牙的牙体长轴

- A) 与

𪙇

平面在颊侧所构成的角大于90°

- B) 与

𪙇

平面在颊侧所构成的角大于80°

- C) 与

𪙇

平面在颊侧所构成的角等于90°

- D) 与

𪙇

平面在颊侧所构成的角等于80°

- E) 与

𪙇

平面在颊侧所构成的角小于90°

65. [单选题] 关于上颌中切牙，正确的是 ()

- A) 单根、断面为扁形
- B) 拔牙时不用旋转力

- C) 拔除时最好沿前下方向牵引脱位
- D) 腭侧较唇侧牙槽骨壁薄
- E) 牙根弯向近中

66. [单选题]有关复合固定桥说法错误的是 ()

- A) 尖形牙弓前牙复合固定桥的杠杆力较大
- B) 易使中间基牙受伤
- C) 容易沿远端基牙连接线产生转动
- D) 中间基牙的位置与固定桥杠杆力的大小无关
- E) 中间基牙的支持力应较强

67. [单选题]某研究者，为了验证氯霉素对伤寒的疗效，在408例伤寒病人中进行对照试验，其中251例用氯霉素治疗，其余157例不用。结果使用组251人中死亡20人，死亡率7.07%，未用组157人中死亡36人，病死率22.8%，已有结论被亲自证实。在人体实验中使用对照组、安慰剂和"双盲法"

- A) 是对病人的一种欺骗
- B) 以征服疾病为目标，为发展医学的需要，严格控制在不损害病人利益的范围之内使用这一方法，是合乎医学道德的
- C) 是违背知情同意原则的
- D) 是违背人道主义原则的
- E) 是医学科研中经过考验的正确方法，可以在人体试验中无条件使用

68. [单选题]患者男，25岁，

4

腭侧牙尖咬裂，诉4年前曾经做过干髓治疗，X线片示该牙根完好，根尖无暗影，最佳的治疗方案是

- A) 根管治疗后，烤瓷冠修复该患牙
- B) 根管治疗后树脂修复腭侧牙尖
- C) 根管治疗后，烤瓷桩冠修复该患牙
- D) 根管治疗后，金属全冠修复该患牙
- E) 直接树脂修复腭侧牙尖

69. [单选题]一般临床上早期矫治时期不包括

- A) 12岁
- B) 4岁
- C) 2岁
- D) 6岁
- E) 8岁

70. [单选题]关于上颌骨发育长度的增长，以下说法错误的是

- A) 有4条骨缝，即额颌缝、颧颌缝、颧颞缝、翼腭缝
- B) 唇侧吸收陈骨，舌侧增生新骨
- C) 在上颌结节后壁区增生新骨，大量增加上颌骨长度
- D) 腭骨后缘有新骨增生，以维持后鼻棘的位置，使长度增加
- E) 由新生儿到成人，上颌骨的长度增长约为2.5倍

71. [单选题]有关固有牙槽骨的说法，不正确的是

- A) 近骨髓侧骨板由哈佛系统构成
- B) 骨板为束状骨
- C) 在牙周膜炎症和外伤时最先消失
- D) 位于牙槽骨窝内壁包绕牙根
- E) 是一层多孔的骨板称筛状板，为松质骨

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138037020071006072>