

《外科学》考试试题及参考答案（一）

20xx级口腔本科《外科学》试卷

姓名： 学号： 分数：

一、选择题（每题1分，共20分）

1、颅脑损伤患者出现一侧瞳孔散大,对侧肢体瘫痪,提示为（）

- A.小脑幕切迹疝
- B.枕骨大孔疝
- C.脑干损伤
- D.动眼神经损伤
- E.延髓损伤

2、患者男性,28岁.头部受伤后意识不清约20分钟,头痛,恶心,呕吐,追问受伤经过不能记忆,查体无异常倾向.可能诊断为（）

- A.脑震荡
- B.脑挫裂伤
- C.颅骨骨折
- D.硬脑膜外血肿
- E.颅内血肿

3、张力性气胸的特点是（）

- A、呼吸时空气经伤口自由出入
- B、呼吸时气体从胸膜腔只出不入
- C、患侧胸膜腔压力进行性增加
- D、一般不挤压对侧胸膜腔和肺
- E、纵隔不会移位

4、评估肱骨髁上骨折损伤肱动脉的主要依据是（）

- A、手部麻木
- B、肢端发绀
- C、桡动脉无搏动
- D、肢端温度下降
- E、手功能障碍

5、患者男性，45岁。十二指肠溃疡患者，饱餐后突然出现上腹剧烈疼痛，伴腹肌紧张、压痛、反跳痛，肝浊音界消失。首先应考虑可能并发（）

- A、大出血
- B、急性穿孔
- C、幽门梗阻
- D、急性胰腺炎
- E、急性阑尾炎

6、一5岁男孩，被开水烫伤，头面颈部水疱，其烧伤面积应为（）

- A、9%
- B、16%
- C、12%
- D、18%
- E、10%

7、腹部空腔脏器破裂最突出的表现为（）

- A、内出血
- B、以弥漫性腹膜炎为突出表现
- C、休克
- D、昏迷
- E、腹部绞痛

8、有较明显的“中间清醒期”见于下列那种脑损伤（）

- A、硬脑膜外血肿
- B、硬脑膜下血肿
- C、颅内血肿
- D、脑震荡
- E、脑挫裂伤

9、对于GCS 记分法下列哪项说法不妥（）

- A、最高分 17分
- B、从睁眼,言语,运动反应三方面评分
- C、最低分 3分
- D、低于8分为昏迷
- E、能自动睁眼记4分

10、检查病人肘后三骨标关系（三角关系）失常见于（）

- A、肩关节脱位
- B、肘关节脱位
- C、髌关节脱位
- D、肱骨髁上骨折
- E、桡骨下端骨折

11、急性胆囊炎的主要体征是（）

- A、右上腹压痛
- B、腹膜刺激征
- C、黄疸
- D、墨菲征（Murphy）阳性

E、脑膜刺激征阳性

12、患者排尿突然中断,并感疼痛,改变姿态后能缓解和继续排尿见于下列那种病人 ()

A、输尿管结石

B、膀胱结石

C、前列腺增生

D、尿道结石

E、胆囊结石

13、骨折与关节脱位的诊断主要靠 ()

A、X线照片

B、询问病史与检查

C、CT

D、磁共振

E、B超

14、肾结核患者就诊的早期主诉是 ()

A、腰痛,腰酸

B、乏力,盗汗

C、尿频

D、排尿困难

E、尿痛

15、下列哪项是颅前窝骨折的特征 ()

A、熊猫眼症

B、脑脊液耳漏

C、听力减退

D、乳头后淤血斑

E、脑震荡

16、下列哪项不属于甲亢术后并发症 ()

A、呼吸困难、窒息

B、甲状腺危象

C、甲状旁腺损伤所致手足抽搐

D、甲状腺弥漫性肿大

E、喉返神经损伤

17、关于食管癌的描述下列哪项不妥 ()

A、食管癌患者的典型临床表现为进行性吞咽困难

B、好发部位为胸下端

C、食管拉网检查脱落细胞为我国首创

- D、首选的治疗方法是手术
E、对诊断意义最大的是食管纤维镜检查配合活体组织检查

18、疝块回纳后指压腹股沟深环不再突出的疝是（）

- A、腹股沟斜疝 B、腹股沟直疝 C、股疝
D、脐疝 E、切口疝

19、高血钾引起心律失常时，首先应注射（）

- A、10%葡萄糖+胰岛素
B、10%葡萄糖酸钙
C、5%碳酸氢钠
D、11.2%乳酸钠
E、10%氯化钾溶液

20、患儿突然阵发性哭闹,排果酱样大便,应考虑（）

- A、急性菌痢
B、急性肠套叠
C、急性胃肠炎
D、蛔虫性肠梗阻
E、小肠扭转

二、填空题（每空1分，共20分）

- 1、施行人工呼吸的首要条件是_____。
2、颅内压增高三主征包括_____，_____，_____。
3、骨折专有体征包括，，，
其治疗原则是，，，
4、典型的Charcot三联症包括_____，_____，_____。
5、外科最常见的休克是_____和_____。
6、对癌性疼痛患者世界卫生组织推荐的“三阶梯”用药原则包括_____，
_____，_____，_____。

三、名词解释（每个4分，共20分）

- 1、条件性感染
2、脑疝
3、Reynolds
4、肾前性肾功能衰竭
5、肛裂三联征

四、问答题（共分40分）

- 1、叙述心跳骤停的判断标准（10分）
2、哪些征象提示有胸膜腔内有进行性血胸的可能？（10分）
3、叙述乙状结肠扭转的临床表现（10分）

4、简述我国对烧伤严重程度的分度？（10分）

2009年专科《外科》考试试卷参考答案

一、选择题（每题1分，共20分）

- 1、 A
- 2、 A
- 3、 C
- 4、 C
- 5、 B
- 6、 B
- 7、 B
- 8、 A
- 9、 A 10、 B 11、 D 12、 B 13、 A 14、 C
- 15、 A 16、 D 17、 B 18、 A 19、 B 20、 B

二、填空题（每空1分，共20分）

- 1、保持呼吸道通畅。
- 2、头痛；呕吐；视乳头水肿
- 3、畸形；异常活动；骨擦音或骨擦感。P456 复位；固定；功能锻炼。
- 4、腹痛、寒战高热、黄疸。
- 5、低血容量休克；感染性休克。
- 6、阶梯给药；口服给药；按时给药；用药个体化；辅助用药。

三、名词解释（每个4分，共20分）

- 1、条件性感染：指平常为非致病菌或致病力低的致病菌，由于数量增多使毒力增大，或人体免疫力下降，乘机侵入而引起的感染。
- 2、脑疝：指颅内某分腔有占位性病变，该分腔的压力比邻近分腔压力高，压力差使脑组织由高压区向低压区移位，导致脑组织、血管、颅神经等受压和移位，从而形成一系列严重临床综合征。
- 3、Reynolds：指急性梗阻性化脓性胆管炎患者出现腹痛、寒战高热、黄疸的同时，还伴有休克和中枢神经系统抑制症状。
- 4、肾前性肾功能衰竭：指各种原因引起的血容量减少或肾动脉阻力增高，使肾脏血流灌注量减少而导致的急性肾衰竭。常见于脱水、大出血、严重外伤、休克、心力衰竭等。
- 5、肛裂三联征：指肛裂、前哨痔、乳头肥大同时存在，称为肛裂三联征，为慢性肛裂的典型表现。

四、问答题（共分40分）

1题：（答对1点记2分，共10分）

答：

- (1) 意识突然丧失，深昏迷，呼之不应；
- (2) 大动脉搏动消失（颈总动脉或股动脉）；
- (3) 自主呼吸停止或呈抽搐样呼吸；
- (4) 瞳孔散大并固定；
- (5) 心电图表现为心室颤动、心电—机械分离或心室停搏。

2题：（每答对1点记2.5分，共10分）

答：胸部损伤患者出现下列情况提示有进行性血胸的可能：

- (1) 症状进行性加重，血压持续性下降，经输血补液血压仍不回升，或短暂升高又迅速下降。
- (2) 红细胞计数、血红蛋白量和红细胞比容等重复测定，持续降低。
- (3) 胸膜腔穿刺或引流因血液迅速凝固而抽不出血液，但胸部X线检查胸膜腔积液阴影不断增大，表明出血量多而急。
- (4) 胸膜腔闭式引流量连续3小时，每小时超过200ml。

3题：（每答对1点记2分，共10分）

答：乙状结肠扭转的临床表现：

- (1) 发病较缓慢，多见于有慢性便秘、腹痛腹胀发作史的男性老年人。
- (2) 主要表现为腹部持续性胀痛，逐渐隆起，呕吐不多，无排便、排气。(3) 左侧腹部呈不对称高度膨隆。
- (4) X线平片可见极度扩张的马蹄状双腔充气乙状结肠袢，立位时有两个液平面。
- (5) 钡灌肠检查在梗阻部、钡影尖端呈“鸟嘴”形。

4题：（答对1点2.5分，共10分）

答：我国对烧伤严重程度可分为下列几种：

- (1)轻度烧伤：Ⅱ°烧伤面积9%以下
- (2)中度烧伤：Ⅱ°烧伤面积10—29%或Ⅲ°<10%
- (3)重度烧伤：烧伤总面积30—49%或Ⅲ°10—19%或Ⅱ°、Ⅲ°面积不够，但患者已发生休克等并发症、有呼吸道烧伤、或有较严重的复合伤。
- (4)特重度：面积>50%。或或Ⅲ°烧伤20%以上；或已有较严重的吸入性损伤，复合伤。

20xx学年第一学期《外科学》总考考试试卷(A卷)

年级专业班级_____学号_____姓名_____

注：1、考试时间共120分钟，成绩总分100分。

2、此试卷适用专业：2010级口腔医学（大专）专业。

题号	一	二	三	四	五	总分
总分	50	15	10	8	17	
得分						
签名						

一、选择题：（每题1分，共50分）

A型题

1、关于无菌术的概念，下列哪项不正确：

A.无菌术是临床医学的一个基本操作

规范；

B.无菌术就是针对微生物及感染途径

所采取的一系列预防措施；

C.无菌术的内容包括灭菌、消毒法、

操作规则及管理制度；

D.消毒是指杀灭一切活的微生物；

E.灭菌和消毒都必须能杀死所有病原

微生物和其他有害微生物；

2、手臂消毒法能清除：

A.皮肤毛囊内的细菌；

B.皮肤皮脂腺内的细菌；

C.皮肤汗腺内的细菌；

D.皮肤表面的细菌；

E.皮肤表面及深层的细菌；

3、长期应用呋塞米(速尿)可导致：

A. 低氯性碱中毒

B. 低氯性酸中毒

c. 呼吸性酸中毒

D. 代谢性酸中毒

E. 呼吸性碱中毒

4、低钾血症及低钙血症纠正后，神经、肌肉及中枢神经系统功能亢进症状仍无好转，应考虑是：

A. 低钾血症

B. 低钙血症

C. 低镁血症

D. 低钠血症

E. 低磷血症

5、女性，60岁。因反复呕吐5天入院，血清钠118 mmol/L，脉搏120次/分，血压

9.33/6.67 kPa(70/50 mmHg)。应诊断为：

A. 轻度缺钠

B. 中度缺钠

C. 重度缺钠

D. 中度缺水

E. 重度缺水

6、女性，40岁。患小肠瘘，测得血清钾2.0mmol/L，钠140 mmol/L，氯80 mmol/L，血浆渗透压300 mmol/L，尿量25ml/h，血压8.00/6.00 kPa(60/45 mmHg)。首选治疗措施是：

A. 立即静推氯化钾溶液

B. 静滴晶体或胶体溶液，补足血容量

C. 口服钾盐

D. 立即静滴5%碳酸氢钠

E. 应用阳离子交换树脂

7、低钾血症对酸碱平衡的影响是：

- A. 细胞内碱中毒，细胞外酸中毒
- B. 细胞内碱中毒，细胞外正常
- C. 细胞内、外均碱中毒
- D. 细胞内、外均酸中毒
- E. 细胞内酸中毒，细胞外碱中毒

8、输血反应发生率最高的是？

- A. 过敏反应
- B. 溶血反应
- C. 发热反应
- D. 传播疾病
- E. 循环超负荷

9、急性肾功能衰竭少尿期电解质紊乱的临床表现是：

- A. 高钾、高镁、高磷、低钠、低氯、低钙
- B. 高钾、低镁、高磷、低钠、低氯、低钙
- C. 高钾、高镁、低磷、低钠、低氯、高钙
- D. 高钾、低镁、高磷、低钠、低氯、高钙
- E. 高钾、高镁、高磷、低钠、低氯、高钙

10、感染性休克治疗原则下列错误的是：

- A. 补充血容量以血浆为主
- B. 控制感染
- C. 纠正酸碱失衡
- D. 血管扩张药物
- E. 营养支持

11、下列呼吸道方面的手术前准备中哪项是错误的：

- A. 吸烟病人必须停止吸烟1~2周
- B. 鼓励病人练习深呼吸和咳嗽
- C. 痰液稠厚者可用雾化吸入
- D. 哮喘经常发作者可给予地塞米松
- E. 咳嗽明显者可给与镇咳剂

12、化脓性阑尾炎行阑尾切除术，术后3 d切口红肿，有脓性分泌物，10 d后清创缝合而愈合，切口愈合类型应记录为：

- A. II/乙
- B. II/丙
- C. III/甲
- D. III/乙

E. III/丙

13、外科感染的特点，下列哪项是错误的：

- A.多有多种细菌引起的混合感染
- B.常有明显的局部症状
- C.病变往往集中在某个局部，而后化脓、坏死
- D.不会引起严重的全身感染
- E.一般是指需要手术治疗的感染性疾病

14、破伤风最可靠的预防方法是注射：

- A. 破伤风类毒素
- B. 破伤风抗毒素
- C. 破伤风免疫球蛋白
- D. 抗生素
- E. 地塞米松

15、急性蜂窝织炎与丹毒的主要不同临床表现为：

- A. 病变不易局限，扩散迅速；
- B. 附近淋巴结肿大；
- C. 多伴有全身症状；
- D. 病变与正常组织无明显界限；
- E. 局部疼痛；

16、脓性指头炎的切开引流切口应是：

- A. 波动最明显处
- B. 患指侧面纵性切开
- C. 患指侧面横行切开
- D. 患指背侧
- E. 患指甲沟旁切开

17、有关损伤的急救和转运，下列哪项是错误的：

- A. 开放伤口应用无菌纱布复盖，缠上绷带。
- B. 昏迷病人为防止呕吐物所致窒息，最可靠的方法是放置胃管
- C. 四肢动脉大出血时要上止血带或立即止血
- D. 对怀疑有脊椎骨折的伤员必须平卧板床
- E. 对去管骨骨折就行简易外固定后转运

18、有关伤口的处理，下列哪项是错误的：

- A. 受伤12小时，伤口轻度污染，清创

后可一期缝合

- B. 受伤已12小时，污染较重的伤口，清创后可作延期缝合
- C. 受伤24-28小时后伤口仍无明显感染，清创后可将缝结扎纹创腺对合。
- D. 战地伤口清创后可作一期缝合
- E. 受伤达24小时的关节开放性损伤，清创后可予以缝合。

19、利多卡因用于局部浸润麻醉一次限量

为

- A. 100mg
- B. 200mg
- C. 300mg
- D. 400mg
- E. 500mg

20、下列关于术后尿潴留的描述，哪项是错误的：

- A. 术后6—8小时未排尿，耻骨上扣诊有浊音即可明确诊断
- B. 较多见于肛门手术后
- C. 是引起术后尿路感染的主要原因
- D. 治疗是应先安定病人的情绪
- E. 导尿时尿量>300ml，就应留置导尿1—2天

21、肾功能不全的病人手术前后可选择使用的药物有：

- A. 庆大霉素
- B. 磺胺药
- C. 红霉素
- D. 多粘菌素
- E. 卡那霉素

22、现代外科认为创伤治愈的基础：

- A. 异体组织修复
- B. 自身组织修复
- C. 人造材料修复
- D. 异体骨皮
- E. 以上都不是

23、大面积烧伤休克期病人出现烦躁，多由于

- A. 疼痛
- B. 心理因素
- C. 早期毒血症
- D. 血容量不足

E. 以上都是

24、癌和肉瘤的主要不同点在于：

- A. 病人年龄
- B. 肿块质地
- C. 组织来源
- D. 转移途径
- E. 生长方式

25、在休克监测中，哪项观察结果表示预后极差：

- A. 中心静脉压低于0、49kPa
- B. 肺动脉楔压超过4、0 kPa
- C. 乳酸盐浓度超过8mmol/L
- D. 动脉二氧化碳分压高于5、33 kPa
- E. 血小板计数低于 $8、0 \times 10^9/L$

26、治疗休克时，常根据尿量的变化来估计：

- A. 血容量
- B. 中心静脉压
- C. 微循环灌流情况
- D. 心功能
- E. 大血管的舒缩情况

27、疔病是指：

- A. 多个相邻毛囊及其皮脂腺或汗腺急性化脓性感染
- B. 毛囊及其附属腺急性化脓性感染并有全身症状者
- C. 多个疔同时或在一段时间内反复发生在全身各部位
- D. 一个毛囊及其附属腺的急性化脓性感染
- E. 以上都不是

28、下列哪项不是皮肤基底细胞癌的临床特点？

- A. 恶性程度很低，极少转移
- B. 肿块呈淡黑色，溃疡呈鼠咬状
- C. 有渗出物，味臭，易出血
- D. 很少浸入基底组织
- E. 生长快

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/138117023107006033>