

神经外科三基试题

LT

10 月份试题

一、单选题

- 1、 诊断颅底骨折最确切的依据是：（ ）
 - A、 头面部外伤史
 - B、 脑脊液鼻漏
 - C、 头颅 X 线摄片示额骨线形骨折
 - D、 鼻出血

- 2、 诊断颅盖骨折通常依据：（ ）
 - A、 头皮伤痕
 - B、 头痛，呕吐
 - C、 局部触诊闻及骨擦音
 - D、 头颅 X 线摄片

- 3、 颅高压病人，腰穿释放脑脊液后突然呼吸停止，其原因是：（ ）
 - A、 小脑扁桃体疝
 - B、 小脑幕裂孔疝
 - C、 脑室出血
 - D、 颅内压过低

- 4、 小脑幕裂孔疝与枕骨大孔疝的根本区别是：（ ）
 - A、 剧烈头痛，频繁呕吐
 - B、 生命体征改变
 - C、 意识障碍发生较早
 - D、 呼吸骤停发生较早

- 5、 最易形成小脑幕裂孔疝的是：（ ）

A、额叶肿瘤

B、颞叶肿瘤

C、顶叶肿瘤

6、形成脑疝的根本条件是：（ ）

A、过量过快补液

B、腰穿释放脑脊液

C、高压灌肠

D、颅内各分腔存在压力差

7、治疗脑水肿，下列药物哪一种效果较好、较常用：（ ）

A、50%葡萄糖

B、30%尿素

C、20%甘露醇

D、浓缩血清白蛋白

8、颅高压的容积代偿（即空间代偿）主要依靠：（ ）

A、脑组织的压缩

B、颅腔的扩大

C、脑脊液被排出颅腔

D、脑血流量的减少

9、颅高压所致颅神经麻痹常见于：（ ）

A、动眼神经

B、滑车神经

C、外展神经

D、面神经

10、最多见的脑脓肿是：（ ）

A、血源性

B、耳源性

C、外伤性

D、隐源性

11、 高血压脑出血最常见的部位是：（ ）

A、大脑半球

B、小脑半球

C、基底节区

D、脑干

12、 颅内巨大动脉瘤的瘤径为：（ ）

A、直径<5 mm

B、直径<15 mm

C、直径>15 mm

D、直径>25 mm

13、 诊断颅内转移瘤最有价值的检查手段是：（ ）

A、X线

B、CT

C、MRI

D、DSA

14、 恶性肿瘤颅内转移最多见的途径为：（ ）

A、经脑脊液

B、经血流

C、经淋巴系统

D、直接侵入

15、 椎管内肿瘤出现病变脊髓节段以下同侧肢体痛、温觉丧失，伴触觉减退及对侧肢体运动功能障碍，其最可能的分期为：（ ）

A、 瘫痪期

B、 神经根刺激期

C、 脊髓部分受压期

D、 脊髓完全受压期

16、 最常见的颅内肿瘤为：（ ）

A、 脑膜瘤

B、 听神经瘤

C、 垂体腺瘤

D、 神经胶质瘤

17、 下列哪项手术方案不适用于急性脑损伤的治疗：（ ）

A、 开颅血肿清除术

B、 脑室外引流术

C、 去骨瓣减压术

D、 分流术

18、 治疗慢性硬膜下血肿最常用的手术方法是：（ ）

A、 开颅血肿清除术

B、 脑室外引流术

C、 去骨瓣减压术

D、 钻孔引流术

二、名词解释

1、 先天性脑积水

2、 中间清醒期

3、原发性脑干损伤

参考答案

1、 B 2、 D 3、 A 4、 C 5、 B 6、 D 7、 C 8、 C 9、
C 10、 B 11、 C 12、 D 13、 C 14、 B 15、 C 16、 D 17、
D 18、 D

1、先天性脑积水：是指各种原因引起脑脊液循环受阻，分泌过多或吸收障碍→脑脊液潴留于脑室系统、蛛网膜下隙→头颅扩大、颅内压增高和脑功能障碍。

2、中间清醒期：伤后短暂昏迷后清醒，随后出现颅高压症状并再次发生昏迷，或有脑疝表现。常见于急性硬膜外血肿。

3、原发性脑干损伤：指受伤当时即出现的由外力所致的脑干损伤。常见临床症状为：严重的意识障碍；瞳孔及眼球运动的变化；交叉性瘫痪和去大脑强直；生命体征紊乱。

神经外科三基试题(2)

一、单选题

1、下列哪项不属于下丘脑损伤的常见临床表现：（ ）

- A、受伤早期的昏迷、高热
- B、瞳孔改变及出现锥体束征
- C、电解质代谢紊乱
- D、消化道出血

2、下列哪项不属于原发性脑损伤：（ ）

- A、脑震荡
- B、脑挫裂伤
- C、脑内血肿
- D、弥散性轴索损伤

3、下列哪项不是凹陷性骨折的手术指征：

()

- A、有颅高压症状
- B、开放性骨折
- C、引起偏瘫
- D、静脉窦处凹陷性骨折，无明显颅高压

症状

4、急性硬膜外血肿最常见的出血来源为：

()

- A、颅骨板障
- B、静脉窦
- C、脑膜中动脉
- D、大脑中动脉

5、根据颅内血肿引起颅高压或早期脑疝症状所需的时间，急性期血肿是指：()

- A、<3 h
- B、<3日
- C、3日至3周

D、>3周

6、最常见的颅内血肿是：（ ）

A、急性硬膜外血肿

B、急性硬膜下血肿

C、慢性硬膜下血肿

D、脑内血肿

7、发生小脑幕切迹疝时，下列哪项通过小脑幕切迹被推移至幕下：（ ）

A、额叶直回

B、颞叶钩回

C、中央前回

D、扣带回

8、颅内压增高时最客观的体征是：（ ）

A、头痛

B、呕吐

C、视神经乳头水肿

D、昏迷

9、正常成人颅内压为：（ ）

A、7~20 mmHg

B、5~20 mmH₂O

C、0.5~1.0 kPa

D、0.7~2.0 kPa

10、 诊断颅内动脉瘤，主要依靠：（ ）

A、 自发性 SAH 病史

B、 头颅 CT

C、 全脑血管 DSA 检查

D、 腰穿血性脑脊液

11、 自发性 SAH 病人的处理，错误的是：

（ ）

A、 绝对卧床

B、 镇静药物

C、 止血药物

D、 便秘者予肥皂水灌肠

12、 自发性 SAH 病人，其最常见的病因是：（ ）

A、 颅内动脉瘤

B、 脑血管畸形

C、 脑动脉硬化

D、 烟雾病

13、 60岁女性患者，头部棍击伤，无昏迷及意识障碍，无颅骨骨折。1个月后出现颅高压症状。最可能的诊断是：（ ）

A、 慢性硬膜外血肿

B、 多发颅内血肿

- C、慢性硬膜下血肿
- D、脑外伤后遗症

14、 40岁男性患者，汽车上跌下，左枕着地。出现进行性意识障碍，继以右瞳散大。最可能的诊断是：（ ）

- A、左枕部硬膜外血肿伴脑疝
- B、左额颞硬膜下血肿伴脑疝
- C、右额颞硬膜下血肿伴脑疝
- D、右额颞硬膜外血肿伴脑疝

15、 50岁男性患者医学.全在.,线提,供
， 2 h 前被木棒击伤左颞部，
伤后头痛、呕吐， 1 h 前意识不清。PE：中度昏迷，左瞳散大，右侧肢体病理征（+）。诊断考虑为：（ ）

- A、颅骨凹陷性骨折伴脑疝
- B、急性硬膜外血肿伴脑疝
- C、急性硬膜下血肿伴脑疝
- D、脑挫裂伤伴脑疝

16、 急性硬膜外血肿最具特征性的表现是：（ ）

- A、中间清醒期

B、 两侧瞳孔不对称

C、 颅骨骨折线跨过脑膜中动脉沟

D、 进行性意识障碍

17、 下列颅脑损伤最急需处理的是：（ ）

A、 头皮裂伤

B、 顶部凹陷性骨折，深度达**1.5 cm**

C、 开放性颅脑损伤，脑组织外溢

D、 颅内血肿伴脑疝形成

二、名词解释

1、脑震荡

2、脑疝

3、库欣（**Cushing**)反应

参考答案

**1、 B 2、 C 3、 D 4、 C 5、 B 6、 B 7、 B 8、 C 9、
D 10、 C 11、 D 12、 A 13、 C 14、 C 15、 B
16、 A 17、 D**

1、脑震荡：是原发性脑损伤中最轻的一种。伤后有短暂的意识障碍，逆行性遗忘。神经系统检查和脑脊液化验阴性。头颅**CT**检查正常。

2、脑疝：当颅内某分腔有占位性病变时，该分腔的压力大于邻近分腔的压力，脑组织从高

压力区向低压力区移位，导致脑组织、血管、颅神经等重要结构受压和移位进入硬脑膜的间隙或孔道中，从而出现一系列严重临床症状和体征。

3、库欣（Cushing）反应：常见于颅内高压时，表现为血压升高，呼吸、脉搏减慢。

1、预防手术切口感染最重要的措施是（A）

- A. 严格遵守无菌技术
- B. 缝合切口前冲洗伤口
- C. 使用预防性抗菌素
- D. 纠正贫血和低旦白血症
- E. 安放引流

2手术人员的无菌准备，下列哪项错误（D）

- A. 紧急手术来不及洗手时，可用**3%碘酊**涂擦双手及前臂，再经**70%**酒精脱碘，然后戴手套、穿手术衣
- B. 戴干手套，应先穿好手术衣，后戴手套

- C. 戴湿手套，应先戴好手套，后穿手术衣
- D. 连台手术应先脱手套，后脱手术衣
- E. 在酒精中浸泡需**5**分钟

3、皮肤消毒范围要超出手术切口周围 (C)

- A. 5 厘米以上
- B. **10**厘米以上
- C. **15**厘米以上
- D. **20**厘米以上
- E. **25**厘米以上

4、给破伤风患者换药后的换药碗和镊子选用煮沸灭菌法灭菌，应煮沸 (E)

- A. **10**分钟
- B. **15**分钟
- C. **20**分钟医,学,全,在,线,提,供
- D. **25**分钟
- E. **60**分钟以上

5、丝线打结剪线后，留下线头长度一般为 (A)

- A. 1 - 2 毫米
- B. 3 - 4 毫米
- C. 4 - 5 毫米
- D. 5 - 6 毫米

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146043202202010043>