

# 腹部损伤的急诊处理 与护理

腹部损伤是急诊常见的创伤之一,需要迅速而有效的初步处理和持续护理。及时的评估、创伤性休克的预防与处理、创面清创与止血、必要的影像学检查以及手术治疗等步骤至关重要。同时还需要注重术后并发症的预防、疼痛管理、营养支持和心理护理等多方面的综合护理。

sa

by s s

# 腹部损伤的类型

## 钝性损伤

由于车祸、跌落等原因导致的钝性腹部创伤,可能引起内脏器官破裂、出血、肠道穿孔等。需要密切监测并及时治疗。

## 穿透性损伤

刀伤、枪伤等导致的穿透性腹部创伤,需要评估创伤深度、受累器官及出血情况,并进行创面清创和止血处理。

## 爆炸性损伤

由于爆炸、倒塌等原因造成的爆炸性腹部创伤,可能导致广泛的内脏破裂、出血及创面组织损伤。需要系统评估伤情。

## 烧伤

高温烧伤导致的腹部皮肤和内脏损害,常见于厨房意外、火灾等。需要清创并防治感染。

# 腹部损伤的症状

## 疼痛

由于腹腔内脏器破损或是腹壁受损, 导致剧烈的腹部疼痛, 特别是压迫或触摸时。

## 出血

腹腔内大血管破裂会引起大量腹部出血, 可能出现皮下瘀斑或胃肠道出血。

## 胃肠道症状

肠道穿孔会引起恶心呕吐、腹胀、便秘或腹泻等症状。肝、脾损伤则可造成腹痛伴肠鸣音消失。

## 休克表现

严重出血或内脏破裂会致创伤性休克, 表现为心率加快、血压下降、肢端凉冷等。

# 初步评估与处理



腹部损伤急诊处理的关键在于迅速评估伤情, 对创面实施清创止血等初步处理, 并给予药物支持。同时需要密切监测患者的生命体征变化, 防范创伤性休克等并发症的发生。

# 创伤性休克的识别与处理

1

## 评估生命体征

立即评估患者的心率、血压、呼吸频率等生命体征,判断是否出现创伤性休克。

2


## 迅速启动复苏

如果发现创伤性休克,立即给予氧疗、静脉输液等积极措施进行复苏。

3

## 查找出血源

仔细检查全身,找出导致出血的部位,尽快采取有效止血措施。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/146152111053010202>