

肝胆外科专科测试题+答案

一、单选题（共 60 题，每题 1 分，共 60 分）

1、急性出血坏死性胰腺炎的治疗中重要的是

- A、抑制胰酶
- B、抗感染
- C、胃肠减压
- D、防止休克
- E、禁食

正确答案：D

2、肝硬化最常见的死亡原因

- A、肝肾综合症
- B、自发性腹膜炎
- C、肝性昏迷
- D、原发性肝癌
- E、肝性昏迷

正确答案：C

3、下列哪项阳性最有助于原发性肝癌的诊断

- A、FP
- B、 γ -GT
- C、MRI
- D、C.T
- E、B.超

正确答案：A

4、急性胰腺炎时,血淀粉酶

- A、增高稍晚
- B、增高最早
- C、不增高
- D、持续增高
- E、增高最晚

正确答案：B

5、夏柯综合症的典型表现次序为

- A、腹痛,寒战高热,黄疸
- B、寒战高热,腹痛,黄疸
- C、黄疸,寒战高热,腹痛

D、寒战高热, 黄疸, 腹痛

E、腹痛, 黄疸, 寒战高热

正确答案: A

6、蛋白尿是指 24 小时尿液蛋白含量超过()

A、150mg

B、180mg

C、60mg

D、85mg

E、100mg

正确答案: A

7、男性, 55 岁, 因肝硬化门静脉高压行脾切除加断流术, 术后第 10 天突然出现剧烈腹痛、腹胀, 应首先考虑为

A、胃肠道穿孔

B、肠系膜血栓形成

C、粘连性肠梗阻

D、腹腔感染

E、肠扭转

正确答案: B

8、脑血栓溶栓治疗的黄金时间为发病后()

A、2 小时内

B、4 小时内

C、12 小时内

D、6 小时内

E、1 小时内

正确答案: D

9、下列哪项不能提示胰腺炎病情的严重程度

A、黄疸

B、淀粉酶不升高

C、皮肤淤斑

D、低血钙

E、腹胀

正确答案: A

10、腹部手术数日后反复呕吐, 最可能的原因是()

A、颅内压升高

- B、酮症酸中毒
- C、急性胃扩张
- D、尿毒症
- E、低钾低钠

正确答案：C

11、女性 45 岁,因胆道蛔虫病并发细菌性肝脓肿,细菌性肝脓肿的主要临床症状

- A、恶心呕吐
- B、可见右膈升高,运动受限
- C、出现黄疸
- D、寒战高热
- E、局部皮肤凹陷性水肿

正确答案：D

12、静脉补充钾盐前,首先应考虑病人的()

- A、呼吸
- B、神志
- C、血压
- D、尿量
- E、脉率

正确答案：D

13、急性胰腺炎诱因中,常见的是

- A、饮食不当
- B、饮酒
- C、胆道蛔虫症
- D、,上腹外伤
- E、胆结石

正确答案：E

14、细菌性肝脓肿病人最常见的原因是

- A、胆道感染
- B、细菌性心内膜炎
- C、坏疽性囊尾炎
- D、胃十二指肠溃疡穿孔
- E、溃疡性结肠炎

正确答案：A

15、门静脉高压食管曲张破裂出血最有效的止血方法是：

- A、立即输新鲜全血
- B、垂体后叶加压素, 静脉滴注
- C、三腔管气囊压迫
- D、去甲肾上腺素加入冷盐水口服
- E、应用各种止血药物

正确答案：C

16、胰腺癌切除率低的主要原因是

- A、年老体弱
- B、手术复杂
- C、并发胆道疾病
- D、癌肿的恶性程度高
- E、癌直接浸润和转移

正确答案：E

17、以下关于腹腔双套管拔管指征错误的是

- A、白细胞计数正常
- B、病人自我感觉良好
- C、腹腔引流液少于 5ML/天
- D、引流液的淀粉酶值正常
- E、病人体温正常并稳定 10 天左右

正确答案：B

18、低钾的主要症状表现()

- A、恶心、呕吐
- B、腹胀
- C、肢体无力或麻痹
- D、心律失常
- E、以上均是

正确答案：E

19、栓塞后综合征的表现不包括以下哪一项

- A、恶心呕吐
- B、发热
- C、尿少
- D、白细胞数下降
- E、肝区疼痛

正确答案：C

20、PN 宜现用现配,应在()内输注完毕。

- A、48h
- B、72h
- C、96h
- D、24h
- E、12h

正确答案：D

21、下列哪项指标较能评价急性胰腺炎的危重程度

- A、血清淀粉酶 $>128u$ (温氏法)
- B、尿淀粉酶 $>500u$ (温氏法)
- C、 $PaO_2 < 8kPa, R > 30/min$
- D、血清脂肪酶 $>1.5u$ (康氏法)
- E、 $WBC > 12 \times 10^9/L$

正确答案：C

22、下列哪项不是急性胰腺炎的特有体征

- A、肠鸣音减弱或消失
- B、腹肌紧张
- C、持续性腹痛
- D、压痛和反跳痛
- E、腹胀

正确答案：B

23、下列急性重症胰腺炎的辅助检查,较为确实的是

- A、白细胞总数和分类
- B、E. RCP
- C、CT 检查
- D、DSA
- E、B 超检查

正确答案：C

24、胆总管结石合并胆管炎病人非手术治疗期间,出现下列哪项表现,应立即做好急诊手术前准备()

- A、黄疸进行性加深
- B、低血压、意识不清
- C、体温升高,脉速

D、胆囊肿大,有压痛

E、白细胞计数增高

正确答案: B

25、肿瘤根治性手术指()

A、受累脏器整个切除及区域淋巴结的清除

B、肿瘤及远处转移灶的广泛切除术及区域淋巴结的清除术

C、肿瘤广泛切除术

D、肿瘤整块切除术及区域淋巴结清除术

E、肿瘤局部切除术及区域淋巴结的清除术

正确答案: D

26、若出现胆汁稀薄,考虑

A、管道阻塞

B、感染

C、管道扭曲

D、肝功能不全

E、正常

正确答案: D

27、男性,42岁。体检发现肝大,有触痛,B.超检查肝内有一5cm x 9cm肿块。A.FP 400ng/ml。其预后最危险的是

A、肝癌破裂出血

B、肝癌继发感染

C、骨转移

D、肝性脑病

E、腹水

正确答案: A

28、胆囊切除术后饮食不正确的是

A、暴饮暴食

B、低胆固醇、高维生素、高热量、高蛋白的饮食

C、多吃动物内脏、豆腐等

D、清淡、易消化、低脂饮食

正确答案: C

29、以下哪一项不是伴癌综合征的表现

A、高胆固醇

B、高血钙

- C、腹水
- D、低血糖
- E、红细胞增多症

正确答案：C

30、门静脉高压症时受影响最早的侧支为：

- A、腹膜后静脉
- B、脐静脉
- C、直胸上静脉
- D、胃冠状静脉
- E、腹壁上静脉

正确答案：D

31、尿淀粉酶诊断急性胰腺炎，一般在多久后上升

- A、24~48 小时
- B、4~6 小时
- C、6~12 小时
- D、12~24 小时
- E、24~36 小时

正确答案：D

32、脑组织耗氧量大，血流中断造成不可逆的脑损伤的时限是（ ）

- A、6min
- B、8min
- C、2min
- D、12min
- E、4min

正确答案：A

33、胆绞痛发作时，最有效的止痛法是肌肉注射（ ）

- A、苯巴比妥钠
- B、地西洋
- C、吗啡及阿托品
- D、阿托品及哌替啶
- E、安痛定

正确答案：D

34、胆总管结石合并化脓性胆管炎时的并发症中，下列哪一项是错误的

- A、急性胰腺炎

- B、门静脉高压症
- C、肝脓肿
- D、感染性休克
- E、胆道出血

正确答案：B

35、下列哪个叙述不是酒精引起急性胰腺炎的原因()。

- A、使胰管引流不畅,胰管内压增高,破坏腺泡
- B、通过刺激胃液分泌间接引起胰液增多
- C、可引起 Oddi 括约肌痉挛、水肿
- D、直接刺激胰腺引起过量分泌
- E、对胰腺有直接毒性作用

正确答案：D

36、口服胆囊造影 (OCG) 用于检查

- A、肝脏分泌胆汁功能
- B、胆囊收缩功能
- C、胆管排泄功能
- D、胰腺的分泌功能
- E、胆囊的储存功能

正确答案：B

37、胆道手术后 T 形管引流病人护理,下列哪一项不正确

- A、置管 7 天可以拔管
- B、妥善固定 T 形管
- C、拔管前须试行夹管 1~2 天
- D、观察 24 小时胆汁引流量
- E、必要时可用无菌盐水冲洗导管

正确答案：A

38、典型的胆绞痛是

- A、疼痛发作时呕吐,呕吐物含有胆汁
- B、右上腹持续性疼痛,阵发性加剧,并向右肩放射
- C、持续性右上腹痛
- D、饭后疼痛加剧,并可因呕吐减轻
- E、右上腹阵发性疼痛,并向右肩放射

正确答案：B

39、门静脉高压症合并食管静脉曲张破裂出血行手术治疗的最主要目的

是

- A、减少腹水
- B、防止肝癌的发生
- C、预防上消化道出血
- D、防止肝功能衰竭
- E、提高抵抗力

正确答案：C

40、胰腺癌常好发于

- A、胰头部
- B、全胰腺
- C、胰体、尾部
- D、胰颈、体部
- E、胰尾

正确答案：A

41、不符合急性胰腺炎腹痛的特征是

- A、间隙发作性上腹剧痛
- B、疼痛可向左腰部放射
- C、伴频繁呕吐
- D、疼痛位于上腹
- E、饱餐或饮酒后发生

正确答案：A

42、以下不属于多重耐药菌的是()

- A、耐万古霉素肠球菌
- B、绿脓杆菌
- C、泛耐药的鲍曼不动杆菌
- D、耐药铜绿假单胞菌
- E、耐甲氧西林金黄色葡萄球菌

正确答案：B

43、男性, 55 岁, 因肝硬化行脾切除加断流术, 术后 5 天, 腹腔引流管每日引流出约 300ml 淡红色清晰液体, 应考虑为

- A、腹水形成
- B、贫血
- C、腹腔感染
- D、胃痿

E、营养不良

正确答案：A

44、B超对下列哪一项疾病诊断最准确

A、肝外胆管结石

B、胆囊结石

C、肝内胆管结石

D、急性胆囊炎

E、急性胆管炎

正确答案：B

45、与门静脉高压症的发生无关的是()

A、血吸虫性肝硬化

B、肝炎后肝硬化

C、肝良性肿瘤以下共性题：

D、酒精性肝硬化

E、肝内胆管多发结石

正确答案：C

46、形成胆固醇结石的最主要原因是

A、胆汁中的钙离子增多

B、大肠杆菌产生的 β -葡萄糖醛酸酶过多

C、胆汁酸分泌增多

D、胆固醇绝对量增多

E、胆盐与磷脂的微胶粒不足

正确答案：E

47、胆固醇结石形成的最主要原因是

A、胆道内蛔虫残体存留

B、胆汁成分改变

C、胆道感染

D、葡萄糖醛酸酶增加

E、胆道梗阻

正确答案：B

48、胆道结石并胰腺炎的治疗

A、抗感染,对症处理

B、做好术前准备后再手术

C、中西医结石治疗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155012220233011343>