

普通外科学卫生高级职称考试历年真题及答案（案例分析题）

天宇考王普通外科学主任副主任医师考试题库包括：章节练习、综合温习题、模拟试卷、考前冲刺、历年真题等。试题量：9388 道。

案例分析题：每一个案例至少有 3 个提问，每一个提问有 6~12 个备选答案，其中正确答案有 1 个或几个，每选择一个正确答案得 1 个得分点，每选择一个错误答案扣 1 个得分点，扣至本提问得分点为 0。

某患儿，女，5 岁，因右下肢跛行三年而入院。患儿 2 岁方学会走路，那时被发觉右下肢行走不稳，起落步态，无外伤史。体检：体温℃右下肢无红肿、无压痛，下肢肌力正常，皮肤感觉正常，右髋关节屈伸正常，外展稍受限，其余关节活动正常。详细阅读病历摘要，可归纳以下特点：①5 岁女童；②2 岁学会走路，迟于正常儿童；③学会走路时即有被拐，且无外伤史，宜多考虑为先天因素；④体温正常，局部无红肿，无压痛，可排除炎症性病变；⑤下肢肌力正常，皮肤感觉正常，可排除神经性病变；⑥仅右髋关节外展稍受限，可优先考虑右髋关节病变。综上所述，可初步将思路引入右髋关节病变，为先本性可能性大，且可初步排除神经性、肌原性和感染性病变。

一、按照以上资料，下述哪些疾病暂不能排除

- A、右下肢神经性麻痹
- B、右髋关节化脓性关节炎
- C、右膝关节结核
- D、小儿麻痹症后遗症
- E、一过性右髋关节炎
- F、先天性髋脱位

G、先天性髋内翻

H、先天性多关节挛缩症

I、右股骨头无菌性坏死

J、下肢肢体不等长

正确答案：FGIJ

答案解析：按照病历摘要分析，神经性、炎症性、一过性的第一、二、三、四、五项都可排除。

4个先天性疾病中的先天性多关节挛缩症应该有多个关节受累，有些患儿虽有髋关节病变，但关节应有明显的挛缩畸形。此点与该患者不符。因此第8项可排除，仅剩下第六、七、九、十项不能排除。

二、对此患儿还须作哪些有针对性的检查及专科体检

A、照双髋关节正位 X 线片

B、照患侧髋关节正、侧、斜位 X 线片

C、常规 CT 扫描以确定股骨颈前倾角

D、可行髋关节造影摄片，以了解阻碍复位的因素

E、麦氏征

F、骨盆分离及挤压试验

G、Trendelenburg 试验

H、Allis 征

I、叠试验

J、膝关节造影以排除膝关节病变

正确答案：ADGHI

3、按照以上检查，拟诊断什么疾病

A、下肢不等长

B、先天性髋内翻（右）

C、右股骨头无菌性坏死

D、先天性多关节挛缩症

E、先天性髋关节脱位（右）

正确答案：E

某患者男性，28岁，施工时不慎从4米高处跌下，半小时后被送入急诊室。体检：血压4 / 2kPa（30 / 15mmHg），神清，气促，面色惨白，四肢发凉，脉细弱，左侧胸压痛明显、胸廓塌陷、有骨擦感及反常呼吸征，左胸有一2×创口，可听到气体出入创口响声，左侧呼吸音消失，右边呼吸音减低。

4、按照病历摘要能够明确下列哪些诊断

A、多发性肋骨骨折

B、开放性气胸

C、血胸

D、张力性气胸

E、外伤性膈疝

F、心包填塞

G、创伤性休克

H、颅脑损伤

正确答案：ABG

答案解析：第一、二、7项诊断是明确的。选择第1项是按照左胸塌陷、骨擦感及反常呼吸征而确立，因为只有多根多处肋骨骨折，才会引发胸壁塌陷，出现反常呼吸运动，这是特征。第2项是按照左胸创口有气体出入而确立的。第7项是按照伤员面色惨白、四肢凉、脉细弱、血压低、既有休克的动因，又有休克的表现，因此可确诊。若是通过逻辑推断，血胸也应该成立，因为只要有胸壁穿透伤，几乎无一例外地有血胸发生，只是积血量有多有少而已，而多根肋骨骨折，更使血胸几乎是绝对存在的，但要确诊血胸，只有从胸腔内抽出或引流出血液，胸片、超声等证实有胸腔积液的证据，才能下结论，而摘要中并无提供，因此血胸诊断作为无效答案，而其余几项均只是可能而未能确立。

五、 最紧急的处置应该是

- A、快速输血输液
- B、给氧
- C、气管切开
- D、开胸探查
- E、左胸闭式引流
- F、“浮动胸壁”加压包扎
- G、半坐卧位
- H、左胸封闭开放性伤口

正确答案：ABFH

六、 询问伤情时还应重点了解哪些情形

- A、昏迷
- B、呕吐
- C、咳血
- D、小便
- E、受伤体位
- F、搬动方式

G、伤前健康状况

H、家族遗传病史

正确答案：ABCD

7、 体魄检查时，还应重点检查哪些项目

A、瞳孔

B、气管

C、胸壁

D、心、肺

E、肝、脾

F、脊柱

G、四肢

H、膝腱反射

I、病理反射

J、颈静脉

正确答案：BCDEFJ

八、 你以为急诊应优先申请哪些辅助检查

A、站立位胸片

B、肝、肾功能

C、肺功能

D、血气分析

E、心电图

F、尿常规

G、血常规及血型

H、全身 CT

I、超声心动图

正确答案：G

九、“反常呼吸征”的胸廓改变是

A、吸气时受伤胸廓塌陷

B、呼气时受伤胸廓塌陷

C、吸气时受伤胸廓隆起

D、呼气时受伤胸廓隆起

E、吸气时受伤胸廓无改变

F、呼气时受伤胸廓无改变

正确答案：AD

10、开放性气胸时纵隔的位置转变是

A、吸气时偏向患侧

B、呼气时偏向患侧

C、吸气时回至原位

D、呼气时回至原位

E、吸气与呼气时均偏向患侧

F、吸气与呼气时均偏向健侧

G、吸气时偏向健侧

H、呼气时偏向健侧

正确答案：DG

1 一、 伤后无昏迷、呕吐，曾咳血两口，瞳孔正常，颈静脉无怒张，气管右移，左胸壁少量皮下气肿，心浊音界右移，心率 120 次 / 分，律齐，心音弱，无杂音腹不胀，无压痛，肝浊音界存在，肠鸣音存在 Hb70g / L，仰卧位胸部 X 线照片报告为左侧中等量血胸，双肺可疑肺挫伤，左侧多根多处肋骨骨折。按照胸片报告及提示，你以为胸片的表现是。

- A、纵隔向右移位
- B、左下胸外高内低弧形致密阴影
- C、多根多处肋骨骨折
- D、双侧膈影清晰
- E、右肺散在密度不均阴影
- F、双肺大片毛玻璃样阴影
- G、左胸可见气液平面
- H、心影增大各弧度清晰可见

正确答案：ACE

1 二、 现在呼吸困难的最可能原因是

- A、“连枷胸”处置不睬想
- B、肺挫伤
- C、呼酸+代酸
- D、血气胸未消除
- E、心包填塞
- F、感染
- G、休克未纠正

正确答案：AB

13、 现在合理的处置是

- A、肋骨断端牵引固定
- B、使用呼吸兴奋剂
- C、联合大量抗生素
- D、加快输血输液速度
- E、纠正呼吸性酸中毒
- F、心包引流
- G、使用呼吸机

正确答案：AG

14、 该伤员确诊为肺挫伤，下列什么办法是合理的

- A、尽快补充胶体液（以白蛋白为主）
- B、应用大量激素
- C、加强抗生素
- D、应用呼吸机，但不宜用 PEEP，以免造成气胸
- E、定期使用两种以上呼吸兴奋剂
- F、定期肺灌洗，清除血块及分泌物

正确答案：C

15、 实施气管切开，应用呼吸机医治(容量控制方式)，VT550ml，R16次/分，PEEP8cmH₂O，FiO₂60%，两天后复查动脉血气分析，PO₂12kPa，PCO₂8kPa，BE+6mmol/L，SO₂96%。按照血气分析报告，现在最大的可能是

- A、代谢性酸中毒
- B、代谢性碱中毒

- C、呼吸性酸中毒
- D、呼吸性碱中毒
- E、代酸+呼碱，以代酸为主
- F、呼酸+代碱，以呼酸为主
- G、呼酸+代酸

正确答案：C

1 六、 如何调整呼吸机

- A、加速呼吸次数
- B、加大潮气量
- C、加大 PEEP
- D、加大 FiO_2
- E、延长吸气时刻
- F、延长呼气时间
- G、延长停顿时间
- H、改换呼吸方式（如压力控制）

正确答案：ABF

17、 最大可能是发生了什么情形

- A、肺出血
- B、伤口感染
- C、心力衰竭
- D、左肺不张

E、左侧自发性气胸

F、呼吸机依赖（戒断现象）

正确答案：D

1 八、 踊跃的处置应是

A、压迫气管刺激咳嗽排痰

B、鼻导管吸痰

C、经气管切口导管吸痰或纤支镜吸痰

D、肺灌洗

E、加强抗生素

F、停止进食

G、静脉高营养

正确答案：CE

某患者男性，44岁，呕血三日，急诊入院。病人半年来常常腹胀，食欲不振，厌油、恶心、反酸，日渐消瘦。三天前，因饮酒较多、吃冷硬食物后，出现呕血，共三次，前两次较新鲜，量约400毫升，后一次为咖啡样，量约150毫升。体检：血压14/12kPa。消瘦，贫血貌，脸颊及前胸部有五枚蜘蛛痣，心肺无异样，肝不大，脾可触及，边缘较韧。

1 九、 为进一步明确上消化道大出血的病因和部位，尚需进行哪些检查

A、三腔管气囊充气压迫胃底和食管下段，如再也不出血，则为食管胃底静脉曲张破裂出血

B、二囊压迫后若抽出血液，胃、十二指肠溃疡与食管胃底静脉曲张破裂出血可能同时存在

C、纤维胃、十二指肠镜检查

D、选择性动脉造影

E、CT扫描

F、放射性核素扫描

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155032312111011130>