

皮肤与性病学(医学高级): 皮肤与性病学考试题 (题库版)

1、单选 慢性荨麻疹治疗应 ()。

- A. 给药时间固定
- B. 风团控制后即可停药
- C. 不宜同时使用几种抗组胺药
- D. 以抗组胺药物为主
- E. 使用皮质类固醇激素

正确答案: D

2 (江南博哥)、多选 尼氏征阳性可见以下现象 ()。

- A. 推压水疱一侧, 可使水疱沿推压方向移动
- B. 轻压疱顶, 疱液向四周移动
- C. 牵扯已破的水疱壁, 疱周围外观正常的表皮被一起剥除
- D. 在外观正常的皮肤上用力推擦, 表皮可剥离
- E. 在外观正常的皮肤上推擦, 表皮可出现水疱

正确答案: A, B, C, D

3、单选 下列部位的皮脂腺, 除哪项外均直接开口于皮肤表面 ()。

- A. 颊黏膜
- B. 足背
- C. 唇红
- D. 乳晕
- E. 包皮

正确答案: B

4、单选 系统性硬皮板病的标志性抗体是 ()。

- A. 抗心磷脂抗体
- B. 抗着丝点抗体
- C. 抗 Scl-70
- D. ANA
- E. 抗 Jo-1 抗体

正确答案: C

5、单选 发疹性黄瘤的临床特点错误的是 ()。

- A. 多见于 25 岁以前发病
- B. 女性多见
- C. 约 1/3 患者黏膜受累
- D. 约 1/3 患者出现尿崩症
- E. 可以自发缓解, 预后好

正确答案: B

6、判断题 变应型皮肤血管炎属于白细胞破碎性大血管炎。

正确答案: 错

7、单选 麻风反应的治疗首选药物为()

- A. 糖皮质激素
- B. 利福平
- C. 抗组胺药物
- D. 氨苯砜

正确答案: A

8、单选 变应性皮肤血管炎的发病机制与哪种变态反应有关()

- A. I型变态反应
- B. II型变态反应
- C. III型变态反应
- D. IV型变态反应

正确答案: C

9、单选 局限性多汗症的好发部位为()

- A. 额部
- B. 掌跖
- C. 胸部
- D. 手掌

正确答案: B

10、多选 原发性刺激性接触性皮炎的特点正确的是()。

- A. 刺激物本身有强烈的刺激性
- B. 皮炎的轻重与刺激物的性质有关
- C. 弱刺激物引起慢性皮炎
- D. 与年龄无关
- E. 累积性原发性刺激性皮炎见于家庭妇女

正确答案: A, B, C, E

参考解析: 影响炎症反应的因素包括患者年龄、性别、身体状况、受损部位、皮肤状况及发病季节等。

11、单选 关于角质形成细胞下列叙述正确的是()。

- A. 基底层亦称生发层
- B. 棘层一般有 10~15 层多角形细胞
- C. 颗粒层的特征是细胞内可见形态规则的透明角质颗粒
- D. 透明层见于全身各部位
- E. 角质层细胞内均有细胞核

正确答案: A

参考解析: 正常情况下, 基底细胞不断地增殖产生新的角质形成细胞, 故称生发层。棘层一般有 4~10 层多角形细胞。颗粒层的特征是细胞内可见形态不规则的透明角质颗粒。透明层仅见于掌跖部位。角质层由 5~20 层扁平、无核细胞组成, 胞内细胞器结构消失。

12、单选 以下疾病中不会导致秃发的是（）。

- A. 红皮病
- B. 扁平苔藓
- C. 黄癣
- D. 疖肿
- E. 玫瑰糠疹

正确答案： E

13、单选 有助于黄瘤诊断的辅助检查不包括（）。

- A. 冷冻切片猩红或苏丹红染色
- B. 血脂检查
- C. 脂蛋白电泳
- D. 免疫球蛋白测定
- E. 血液涂片查泡沫细胞

正确答案： E

参考解析： 黄瘤病的皮损组织病理可检见泡沫细胞，而非血液涂片

14、多选 可能诱发慢性荨麻疹的内脏和全身性疾病有（）

- A. 风湿热
- B. 系统性红斑狼疮
- C. 恶性肿瘤
- D. 内分泌紊乱

正确答案： A, B, C, D

15、单选 颗粒层厚度增加，胞质内透明角质颗粒粗大色深（）。

- A. 乳头瘤样增生
- B. 角化过度
- C. 颗粒层增厚
- D. 棘层肥厚
- E. 角质栓

正确答案： C

16、单选 增殖型天疱疮的好发部位为（）

- A. 头面部
- B. 躯干
- C. 四肢远端
- D. 皱褶部位

正确答案： D

17、单选 淋病治疗主要以什么治疗为主：

- A. 中药为主
- B. 西药为主
- C. 外治为主

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/155121014144011222>