

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION



急性心梗

术后
护理



急性心梗病人经桡动脉行PCI的术后护理

POSTOPERATIVE NURSING CARE OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION CORONARY INTERVENTION VIA

汇报人：XXX




CONTENTS 目录



- 急性心梗一般护理
- 急性心梗健康指导
- 并发症的观察护理
- 急性心梗用药护理
- 急性心梗心理护理





第一部分




急性心梗一般护理



急性心梗一般护理

PCI是？

PCI是经皮冠状动脉介入治疗的简称，是采用经皮穿刺技术送入球囊导管或其他相关器械，解除冠状动脉狭窄或梗阻，重建冠状动脉血流的技术。





急性心梗一般护理

一般护理

经桡动脉行急诊PCI的术后护理，及时接诊患者，保持输液通畅。



术后常规观察指标有体温、穿刺伤口处术肢末梢血液循环情况以及液体入量与尿量。




急性心梗一般护理



一般护理

术肢的观察和护理：穿刺部位敷料包扎是否完好
局部有无渗血，有无血肿形成。

避免在术侧手臂进行血压监测、避免在术侧手指进行血氧饱和度的监测。



第二部分




急性心梗健康指导



急性心梗健康指导

健康指导

嘱患者伤口保持清洁干燥，将术侧前臂用软枕抬高45度或放于胸前抬高患肢，保持腕关节伸直活动手指关节，利于静脉回流，可有效缓解手部肿胀。



2周内术侧肢体避免用力拧毛巾，提4公斤以上的重物。




急性心梗健康指导

健康指导

嘱患者多饮水无心衰者一般量为6~8 h内饮水1000~2000ml以促进造影剂的排泄。术后嘱患者必须遵医嘱口服抗凝药物，如拜阿司匹林和氯吡格雷等。





第三部分



并发症的观察护理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/156105011030010214>