

第十三章 药物疗法和过敏试验法试题及答案

A1 型题

1.发药时，若病人提出疑问应采取的措施（） [单选题] *

A 报告医生

B 报告护士长

C 考虑不用

D 先发给病人再说

E 重新核对，确认无误后再解释并给药(正确答案)

2.饭前的外文缩写是（） [单选题] *

Aac(正确答案)

Bpo

Cam

Dpm

Ehs

3.必须做碘过敏试验的检查是（） [单选题] *

AX 线腹部平片

B 逆行肾盂造影

CX 线膀胱造影

D 静脉肾盂造影(正确答案)

E 肾同位素检查

4.服用退热药需（） [单选题] *

A 饭前服

- B 饭后服
- C 睡前服
- D 服药后多喝水(正确答案)
- E 服药后不饮水

5.剧毒药品必须是 () [单选题] *

- A 放在柜子里
- B 专柜加锁专人保管(正确答案)
- C 与普通药一起放置
- D 用时到病区药房领取
- E 放在治疗室醒目的地方

6.皮下注射方法错误的是 () [单选题] *

- A 少于 1ml 药液量时须用 1ml 注射器抽吸
- B 注射部位要常规消毒
- C 持针时右手食指固定针栓
- D 针头和皮肤呈 50°角刺入(正确答案)
- E 进针长度为针梗的 2/3 长

7.应远离明火处保存的药物是 () [单选题] *

- A 抗毒血清
- B 胎盘球蛋白
- C 乙醚、乙醇(正确答案)
- D 肾上腺素
- E 棕色合剂

8.皮内注射选前臂掌侧下段的原因是 () [单选题] *

A 皮肤薄，颜色浅(正确答案)

B 没有大血管

C 离大神经较远

D 皮下脂肪薄

E 操作较方便

9.超声波雾化的特点是 () [单选题] *

A 雾滴小而均匀，可吸入支气管末端(正确答案)

B 病人不需漱口，便可操作

C 温度高于体温，使病人舒适

D 雾量大小固定

E 用氧量小，节约资源

10.禁忌静脉推注的药物是() [单选题]

A 10%葡萄糖酸钙

B 50%葡萄糖

C 氨茶碱

D 维生素 C

E 10%氯化钾(正确答案)

11.关于取药、配药的方法，下列哪项不正确 () [单选题] *

A 取固体药用药匙

B 更换药液品种，应洗净量杯

C 药液不足 1ml 用量杯量取(正确答案)

D 两种药液不可同置一药杯内

E 油剂药液应倒入少量温开水于杯中

12.下列外文缩写不正确的是 () [单选题] *

Aqod, 隔日 1 次

Bhs, 每晚 1 次(正确答案)

Cqd, 每日 1 次

Dqid, 每日 4 次

Ebiw, 每周 2 次

13.“三查”“八对”的内容不包括 () [单选题] *

A 床号、姓名

B 药名、浓度、剂量

C 查用药后反应(正确答案)

D 操作前、操作中查

E 给药方法、药品有效期

14.按照药物保管要求, 应放置在 2~10℃ 冰箱内的是 () [单选题] *

A 糖衣片

B 氨茶碱

C 乙醇

D 白蛋白(正确答案)

E 盐酸肾上腺素

15.按照药物保管要求, 容易挥发、潮解的药物应放在 () [单选题] *

A 密封瓶内(正确答案)

B 阴凉干燥处

C 有色瓶内

D 避光纸盒内

E 冰箱内

16.下列关于药物保管原则的描述, 不正确的是 () [单选题] *

- A 药品按有效期先后顺序排放
- B 药柜应放在干燥、阳光直射的地方(正确答案)
- C 剧毒药、麻醉药应加锁保管
- D 药瓶应有明显的标签
- E 药品应定期检查

17. 药物保管中，剧毒药瓶上的的标签颜色是（） [单选题] *

- A 绿色
- B 蓝色
- C 黄色
- D 黑色(正确答案)
- E 红色

18. 下列各种注射方法，正确的定位是（） [单选题] *

- A 臀小肌注射：髂前上棘与臀裂顶点的外上 1/3 处
- B 臀大肌注射：髂棘和尾骨连线的外上 1/3
- C 臀中肌注射：髂前上棘外侧三横指处(正确答案)
- D 皮内注射：前臂掌侧
- E 皮下注射：肩峰下 2~3 横指

19. 关于自安瓿内吸取药液的方法，下列说法不正确的是（） [单选题] *

- A 仔细查对
- B 将安瓿尖端药液弹至体部
- C 排尽空气时将针头垂直向上
- D 将针头垂直向下放入安瓿内的液面下吸药(正确答案)
- E 吸药时手不能握住活塞

20. 同时注射多种药液时，下列说法不正确的是（） [单选题] *

- A 注射应慢
- B 解除思想顾虑
- C 先注射刺激性强的药物(正确答案)
- D 减轻疼痛
- E 分散注意力

21.注射时防止感染的主要措施是 () [单选题] *

- A 选择无钩、无弯曲的锐利针头
- B 注意药物配伍禁忌
- C 注射前洗手、戴口罩，注射时皮肤消毒直径在5cm以上(正确答案)
- D 不可在硬结、疤痕处进针
- E 不可使用变色、混浊的药

22.指导病人做超声雾化吸入时，下列不正确的是 () [单选题] *

- A 协助病人取舒适体位
- B 先开电源开关，再开雾量调节开关
- C 嘱病人闭口深呼吸
- D 吸入时间为20~30min(正确答案)
- E 治疗完毕，先关雾化开关，再关电源开关

23.对链霉素过敏反应患者进行抢救时，可选用的药物为 () [单选题] *

- A 盐酸肾上腺素
- B 阿托品
- C 氯化钙(正确答案)
- D 葡萄糖
- E 异丙肾上腺素

24.青霉素皮试结果：局部皮肤红肿，直径 1.2cm，无自觉症状，下列处理哪项是正确的（） [单选题] *

- A 可以注射青霉素
- B 可以注射青霉素，但需减少剂量
- C 暂停该药，下次使用重新试验
- D 禁用青霉素(正确答案)
- E 在对侧肢体做对照试验

25.下列药物过敏实验的皮试液浓度正确的是（） [单选题] *

- A 青霉素：500U/0.1ml
- B 链霉素：2500U/0.1ml
- C 普鲁卡因：0.25mg/0.1ml(正确答案)
- D 细胞色素 C：0.75mg/0.1ml
- E 破伤风抗毒素：150IU/0.1ml

26.接种卡介苗时，护士常选用的注射部位是（） [单选题] *

- A 三角肌下缘(正确答案)
- B 大腿外侧
- C 大腿前侧
- D 腹部
- E 背部

27.破伤风抗毒素皮试液的标准是每 1mL 皮试液含破伤风抗毒素() [单选题]

- A50IU
- B100IU
- C150IU(正确答案)
- D1500IU

E15000IU

28.服用磺胺类药后多饮水的目的是（） [单选题] *

- A 增强药物疗效
- B 减轻患者的消化道反应
- C 促进药物吸收
- D 促进胃液分泌
- E 避免肾小管堵塞(正确答案)

29.下列外文缩写正确的是（） [单选题] *

- A 每日一次 qod
- B 隔日一次 qd
- C 每晚一次 biw
- D 每晨一次 qm(正确答案)
- E 每周一次 qn

30.超声雾化吸入的疗效保证来自于药液气雾可深入到（） [单选题] *

- A 大支气管
- B 支气管
- C 咽喉
- D 叶支气管
- E 肺泡(正确答案)

31.易氧化和遇光变质的药物是（） [单选题] *

- A 硫酸亚铁、葡萄糖酸钙
- B 维生素 C、硝普钠(正确答案)
- C 过氧乙酸、奥美拉唑

D 阿托品、地塞米松

E 乙醚、环氧乙烷

32. 臀大肌注射部位为 () [单选题] *

A 髂前上棘与尾骨连线外上 1/2 处

B 髂前上棘与尾骨连线内上 1/2 处

C 髂前上棘与尾骨连线外上 1/3 处(正确答案)

D 髂前上棘与尾骨连线内上 1/3 处

E 髂前上棘与尾骨连线内下 1/3 处

33. “地西洋 5mg po sos”属于 () [单选题] *

A 长期医嘱

B 长期备用医嘱

C 临时医嘱

D 临时备用医嘱(正确答案)

E 短期医嘱

34. 口服液体铁剂的正确方法是 () [单选题] *

A 饭前服

B 服前测心率

C 吸管吸入(正确答案)

D 茶水送服

E 服后不宜立即饮水

35. 图示肌内注射定位法最适合的人群是 (E) (图片题) [单选题] *

A 孕妇

B 老年人

C 成年男性

D 成年女性

E 2 岁以内婴幼儿(正确答案)

36.注射青霉素引起血清病型反应，常发生在注射后（） [单选题] *

A 1 ~ 4 天

B 4 ~ 7 天

C 7 ~ 12 天(正确答案)

D 12 ~ 17 天

E 14 ~ 21 天

37.股静脉穿刺后按压不当，最容易发生（） [单选题] *

A 血栓

B 局部血肿(正确答案)

C 空气栓塞

D 静脉炎

E 蜂窝组织炎

38.适用于超声雾化吸入的药物不包括（） [单选题] *

A 庆大霉素

B 青霉素(正确答案)

C 舒喘灵

D 卡那霉素

E α -糜蛋白酶

39.医疗病历中表示每晚一次的英文缩写是（） [单选题] *

A qd

Bqh

Cqn(正确答案)

Dq6h

Eqid

40.助消化药服用的时间是 () [单选题] *

AAc

BPc(正确答案)

CPm

DAm

EDc

41.下列哪种药物需用蓝边瓶签、有色密盖瓶盛放 () [单选题] *

A 乙醇

B 酵母片

C 氨茶碱片(正确答案)

D 糖衣片

E 高锰酸钾

42.超声雾化吸入操作正确的是 () [单选题] *

A 水槽内加冷蒸馏水 50ml

B 用冷蒸馏水稀释药液至 10ml

C 添加药液应先关机

D 治疗毕，先关电源开关

E 雾化罐螺纹管治疗毕需浸泡消毒(正确答案)

43.0.1ml 破伤风抗毒素过敏试验液含破伤风抗毒素() [单选题]

A5 国际单位

B15 国际单位(正确答案)

C100 国际单位

D150 国际单位

E1500 国际单位

44.肌内注射可选择 () [单选题] *

A 肩峰下 1 指处

B 髂前上棘与尾骨连线中 1/3 处

C 髂前上棘内侧三横指处

D 大腿中段内侧

E 大腿中段外侧(正确答案)

45.属于长期医嘱的是 () [单选题] *

A 地塞米松 5mg iv qd(正确答案)

B 奎尼丁 0.2g po q2h×5

C B 超

D 安定 5mg po sos

E 速尿 5mg im st

A2 型题 46.孙某, 苯丙酸诺龙 25mg im biw, biw 的中文译意是 () [单选题] *

A 一天三次

B 一天两次

C 每周一次

D 每周两次(正确答案)

E 四小时一次

47.急性心力衰竭患儿应用强心苷药物期间，为了防止强心苷药物中毒，饮食中应注意补充（） [单选题] *

A 钾盐(正确答案)

B 钠盐

C 钙盐

D 镁盐

E 碘盐

48.患儿8个月，因肺炎并发急性心力衰竭，现用强心苷药物治疗，当出现下列哪种情况时，应及时停止用强心苷药物（） [单选题] *

A 尿量增多

B 心动过缓(正确答案)

C 肝脏回缩

D 水肿消退

E 呼吸困难

49.王先生在注射破伤风抗毒素15分钟后出现局部皮丘红肿，硬结直径1.6cm，有搔痒感。其处理是（） [单选题] *

A 禁用破伤风抗毒素

B 将全量分3次肌内注射

C 将全量平均分成4次注射

D 将全量分4次注射，剂量递增(正确答案)

E 将全量分4次注射，剂量递减

50.吴某，男，24岁。因上感选用抗生素治疗，青霉素皮试阴性后肌内注射青霉素，5分钟后病人出现憋气、面色苍白、脉搏细弱、血压下降。首先应采取的急救措施是（） [单选题] *

- A 报告医生
- B 氧气吸入
- C 皮下注射肾上腺素(正确答案)
- D 注射抗组织胺药物
- E 建立静脉通道

51.女性，21岁，因再生障碍性贫血入院。根据医嘱此病人须长时间静脉输入抗胸腺细胞球蛋白治疗。依据合理使用静脉的原则，护士在选择血管时应注意（）[单选题]*

- A 由近心端到远心端
- B 由远心端到近心端(正确答案)
- C 先粗大后细小
- D 先细直后弯曲
- E 先上后下

52.程某，5岁，因支气管炎住院治疗，护士在帮助患儿服止咳药时应注意（）[单选题]*

- A 先喂止咳糖浆，后喂维生素
- B 喂止咳糖浆后多喂水
- C 最后喂止咳糖浆后不能立即喂水(正确答案)
- D 在患儿咳嗽时喂药
- E 吃奶后喂药并多喂水

53.陈某，男，1岁。因上感入院，T39.7℃，P120次/min，呼吸27次/min。青霉素皮试阴性后遵医嘱给予青霉素40万u im qid，为该病人肌肉注射应选择的部位是（）[单选题]*

- A 臀大肌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/157020111166006036>