

## 三基护理考试题+答案

1、肾小球肾病的主要临床特点是（ ）

- A、肾功能减退
- B、出血性膀胱炎
- C、大量蛋白尿
- D、高血压
- E、尿中纤维蛋白降解产物增加

答案：C

2、急性白血病病人主要治疗手段一般不包括下列哪一项（ ）

- A、一般治疗
- B、化学治疗
- C、造血干细胞移植
- D、放疗

答案：D

3、患者自身无变换卧位的能力，卧于他人安置的卧位被称为（ ）

- A、被动卧位
- B、被迫卧位
- C、主动卧位
- D、端坐位
- E、稳定性卧位

答案：A

4、下列哪项不是十二指肠营养管的常见并发症（ ）

- A、腹泻
- B、误吸
- C、恶心呕吐
- D、堵管
- E、感染

答案：E

5、患者，女性，75岁。体检X线胸片提示肺占位性病变入院，经病理诊断断为小细胞肺癌。该患者首选的治疗方法为（ ）（ ）

- A、手术切除
- B、化疗
- C、对症治疗
- D、单纯营养支持
- E、免疫治疗

答案：B

6、目前，冠心病介入治疗最常建立的导管通路为（ ）（ ）

- A、桡动脉
- B、颈动脉
- C、股动脉
- D、肱动脉
- E、以上均错误

答案：A

7、急性白血病引起的贫血最主要的原因是（ ）

- A、红细胞寿命缩短
- B、造血原料不足
- C、骨髓造血功能衰竭
- D、正常红细胞生成受抑制

答案：D

8、II型呼衰是指（ ）

- A、 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 < 40\text{mmHg}$
- B、 $PaO_2 < 55\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 30\text{mmHg}$
- C、 $PaO_2 < 50\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 20\text{mmHg}$
- D、 $PaO_2 < 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 > 50\text{mmHg}$
- E、 $PaO_2 > 60\text{mmHg}$ ， $PaCO_2 < 15\text{mmHg}$

答案：D

9、对患者跌伤后出现呼之不应、抽搐、呼吸、心跳停止的重度跌伤处理，下列哪项措施不对（ ）（ ）

- A、立即呼叫 88651120 安排急救队
- B、同时进行心肺复苏抢救
- C、及时建立静脉通道配合医生实施抢救
- D、观察患者病情变化及做好护理记录
- E、抬回患者至病床再施救

答案：E

10、肺循环起始于（ ）

- A、左心房
- B、门静脉
- C、冠状动脉窦
- D、下腔静脉
- E、右心室

答案：E

11、发生青霉素过敏反应，病人最早出现的症状是（ ）（ ）

- A、意识丧失
- B、血压下降
- C、面色苍白
- D、喉头水肿、气促
- E、幻觉、谵妄

答案：D

12、晚期结核性脑膜炎的表现是（ ）

- A、凯尔尼格征阳性
- B、面神经瘫
- C、脑神经受损
- D、昏迷
- E、剧烈头痛、喷射性呕吐

答案：D

13、地塞米松的药理作用不包括（ ）

- A、抗炎
- B、抗毒
- C、抗风湿
- D、抗胆碱
- E、抗休克

答案：D

14、甲状腺核素显像检查最有诊断意义的疾病是（ ）

- A、异位甲状腺的定位诊断
- B、鉴别甲状腺炎
- C、判断甲状腺癌转移病灶
- D、判别甲状腺瘤的良恶性
- E、诊断甲亢

答案：A

15、存在心室颤动或无脉性室速，立即给予电除颤，能量为（ ）（ ）

- A、360J
- B、380J
- C、390J
- D、400J

答案：A

16、心肺复苏基本生命支持技术救治程序，正确的是（ ）

- A、开放气道→人工呼吸→胸外按压
- B、开放气道→胸外按压→人工呼吸
- C、胸外按压→开放气道→人工呼吸
- D、胸外按压→人工呼吸→开放气道

答案：C

17、空气栓塞致死的原因是气体阻塞（ ）（ ）

- A、肺静脉入口
- B、下腔静脉入口
- C、肺动脉入口
- D、主动脉入口
- E、上腔静脉入口

答案：C

18、人类结核病的主要病原菌是（ ）

- A、牛型结核菌
- B、鼠型结核菌
- C、人型和鼠型结核菌
- D、牛型和鼠型结核菌
- E、人型和牛型结核菌

答案：E

19、临床最常见的心律失常（ ）

- A、阵发性心动过速
- B、阵发性心动过缓
- C、室颤
- D、房颤
- E、过早搏动

答案：E

20、下列哪项不是休克抑制期的临床表现（ ）

- A、精神兴奋
- B、血压下降
- C、脉搏细速
- D、尿量减少

答案：A

21、患者，男，50岁。发热2周伴咳嗽，咳痰少量带血丝，乏力，食欲减退，体重下降。查体：右上肺部闻及少许湿啰音，胸片示右肺上野及中野密度

较淡浸润影，似有透光区，血白细胞  $9.2 \times 10^9/L$ 。对该患者的诊断最有意义的检查是（ ）

- A、血沉
- B、痰抗酸杆菌检查
- C、痰脱落细胞检查
- D、肺活检
- E、纤维支气管镜检查

答案：B

22、利用各种健康主题日活动开展健康教育，每年至少开展（）公众健康咨询活动（ ）

- A、9次
- B、11次
- C、12次
- D、13次
- E、14次

答案：A

23、对心搏骤停的成人病人施行首次电除颤时一般除颤电能为（ ）（ ）

- A、 $<200 J$
- B、 $200 J$
- C、 $300 J$
- D、 $360 J$
- E、 $>360 J$

答案：B

24、对一位需住院的心力衰竭病人，住院处的护理人员首先应（ ）

- A、卫生处置
- B、介绍医院的规章制度
- C、立即护送病人入病区
- D、通知医生做术前准备
- E、了解病人有何护理问题

答案：C

25、留置导尿管患者的护理哪项错误（ ）（ ）

- A、引流袋应每日更换一次
- B、尿道口应每日消毒一次
- C、引流管不可受压、弯曲
- D、及时观察记录尿量和形状

E、离床活动时应拔除导尿管

答案：E

26、患者教育程序应注重（ ）

- A、解决患者对健康问题的反应
- B、调动并激励患者参与促进康复的护理过程
- C、按护理程序的五个步骤进行
- D、科学的思维方法和工作方法
- E、指导患者完全服从护士

答案：B

27、关于破伤风患者的护理，不正确的一项是（ ）

- A、为减少刺激，不需要专人护理
- B、严密观察生命体征的变化
- C、加强呼吸道管理
- D、观察局部伤口情况
- E、加强营养，维持体液平衡

答案：A

28、急性阑尾炎穿孔患者术后采取半坐卧位的主要目的是（ ）

- A、缓解呼吸困难
- B、减少静脉回心血，减轻心脏负担
- C、有利于腹腔引流，使感染局限化
- D、减轻腹壁伤口的疼痛
- E、减少局部出血

答案：C

29、传染源向四周散播病原体所能波及的范围称作（ ）（ ）

- A、传染过程
- B、流行过程
- C、疫源地
- D、自然疫源地
- E、发病过程

答案：C

30、董某，男，20岁。因车祸入院。身体评估：呼之不应，问之不答，压眶时可见痛苦表情和肢体躲避反应。该病人的意识障碍属于（ ）

- A、嗜睡
- B、昏睡
- C、浅昏迷

D、深昏迷

E、脑死亡

答案：C

31、再生障碍性贫血引起贫血最主要的原因是什么（ ）

A、造血原料缺乏

B、无效性红细胞生成

C、红细胞破坏过多

D、骨髓造血功能低下

E、失血

答案：D

32、胃溃疡穿孔时主要临床表现是（ ）（ ）

A、创伤性休克

B、大量内出血

C、急性腹膜炎

D、急性肠梗阻

E、膈下游离气体

答案：E

33、查血型、合血的病人必须执行的[]原则（ ）

A、一人一采

B、多人一采

C、一人一采一管

D、多人多采

E、一人多管

答案：C

34、女，38岁，患风湿性心脏病二尖瓣狭窄，经常出现呼吸困难、咳嗽，偶咯血痰等症状。在当地反复治疗2年后，上述症状逐渐减轻，但出现食欲不振、肝区胀痛、水肿，这提示（ ）（ ）

A、内科治疗有效

B、二尖瓣狭窄程度加重

C、合并二尖瓣关闭不全

D、出现风湿活跃

E、右心室受累

答案：E

35、关于静脉注射，以下哪项描述是错误的（ ）（ ）

A、长期给药，应由近心端到远心端选择血管

- B、根据病情，掌握注药的速度
- C、防止刺激性强的药液溢出血管外
- D、不可在静脉瓣处进针
- E、不要在一个部位反复穿刺

答案：A

36、代谢性酸中毒典型的临床表现是（）（）

- A、呼吸深快，呼气时有酮味
- B、唇干舌燥，眼窝凹陷
- C、心率加快，血压升高
- D、感觉迟钝，神志不清
- E、心率减慢，血压下降

答案：A

37、Somogyi 效应的原因是（）（）

- A、晚餐碳水化合物摄入过多
- B、夜间曾发生过低血糖
- C、夜间肝脏葡萄糖产生过多
- D、清晨胰岛素作用不足
- E、清晨胰岛素拮抗激素增多

答案：B

38、肌内注射的角度（）

- A、15°
- B、30°
- C、45°
- D、65°
- E、90°

答案：E

39、心肺复苏操作要点（）

- A、患者仰卧在坚硬平面（地面或垫板）
- B、需暴露患者胸腹部，松开腰带
- C、按压和通气比 30：2
- D、以上都是

答案：D

40、患者，男，68岁，因一侧肢体活动障碍1小时急诊入院，体查时发现左下肢肌力减退，平放在床上可左右移动，但不能抬离床面，患者左下肢的肌力评估结果是几级？（）（）



- A、0 级
- B、1 级
- C、2 级
- D、3 级
- E、5 级

答案：C

41、 恶性度最高的肺癌（ ）（ ）

- A、小细胞未分化癌
- B、鳞癌
- C、大细胞未分化癌
- D、腺癌
- E、腺鳞癌

答案：A

42、病人输入大量库存血后容易导致()（ ）

- A、低血钠
- B、低血钙
- C、高血钾
- D、高血钠
- E、高血铁

答案：C

43、电除颤时，以下能量选择正确的是（ ）

- A、成人单向波为 360J
- B、成人双向波为 150-250J
- C、成人单向波为 120-200J
- D、儿童为 4-6J/kg
- E、儿童为 5-10J/kg

答案：A

44、胃大部切除术后使用胃肠减压时若胃管堵塞应（ ）

- A、重新置管
- B、加压吸引
- C、停止减压
- D、可用 10~20ml 生理盐水冲洗胃管
- E、夹住胃管暂停减压

答案：D

45、腹部 CT 应于检查前多少分钟口服泛影葡胺（ ）

- A、90 分钟
- B、10 分钟
- C、30 分钟
- D、5 分钟
- E、60 分钟

答案：C

46、机械通气时潮气量的选择常用（ ）（ ）

- A、5 mL/kg
- B、10 mL/kg
- C、15 mL/kg
- D、20 mL/kg
- E、25 mL/kg

答案：B

47、急诊分诊护理体检不包括下列哪项内容（ ）

- A、观察病人的意识、精神状态
- B、查看双侧瞳孔
- C、测量生命体征
- D、实验室检查

答案：D

48、心脏正常的起搏点为（ ）

- A、结间束
- B、房室束
- C、房室结
- D、窦房结
- E、普肯耶纤维

答案：D

49、患儿，男性，5岁，烧伤总面积为30%二度，其烧伤严重程度为（ ）

- A、轻度
- B、中度
- C、重度
- D、深度
- E、特重度

答案：E

50、评定步态时应测量的参数包括（ ）（ ）

- A、跨步长度

- B、步幅长度
- C、步幅宽度
- D、足角
- E、跨步频率

答案：C

51、病人用氧后，缺氧症状无改善、呼吸困难加重，你首先应采取（）（）

- A、马上通知医生处理
- B、调节氧流量，加大吸氧量
- C、注射呼吸兴奋剂
- D、检查吸氧装置及病人鼻腔
- E、气管插管给氧

答案：D

52、按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，每年应为老年人提供（）次中医药健康管理服务。（）

- A、1次
- B、2次
- C、3次
- D、4次
- E、5次

答案：A

53、动脉血标本的采集拔针后应嘱患者垂直接压穿刺部位()。（）

- A、1—2分钟
- B、2—4分钟
- C、3—6分钟
- D、4—8分钟
- E、5—10分钟

答案：E

54、发生尿潴留的原因，错误的是（）（）

- A、尿道阻塞
- B、前列腺肥大
- C、排尿神经反射性障碍
- D、膀胱收缩无力
- E、膀胱括约肌失去控制能力

答案：E

55、讲座属于（）（）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158057060016006032>