

## 2024年国家基本公卫-预防接种-考试复习题库,含答案,

### 一、单选题

1. (单选, 国家免疫规划疫苗基础免疫合格接种判定标准不包括那一项? 0

A、及时接种

B、起始月龄不提前

C、在1周岁内完成

D、间隔时间正确,有准确的出生时间和接种时间记录

答案:A

2 ., 单选, 冷链设备的管理人员每天应至少查看几次并填写温度记录表? 0

A、4次

B 3次<sub>x</sub>

C、2次

D x 1次

答案:C

3 ., 单选, 疑似预防接种异常反应的报告人不包括0。 A、疫苗生产企业

B x 各级各类医疗机构

C、接种单位及其执行职务的人员

D、疾病预防控制机构

4

., 单选, 划痕法接种疫苗时,先洗净皮肤,做常规消毒,待消毒液干后,滴上疫苗,用单针或双排钝针划成。字形状使皮肤组织液有少量渗出,不可流血。A、井 B\_K王

C、中

D、田

答案:A

5 .(单选, 下列选项中,, , 疫苗的起始接种年龄为2岁,推荐完成年龄是V 3 周岁。

A、乙脑减毒活疫苗第2剂

B、乙脑灭活疫苗第3剂

C、全部都是

D、甲肝灭活疫苗第2剂

答案:C

6

., 单选, 选择, 甲肝减毒活疫苗接种时, 采用剂次接种程序; 选择, 甲肝灭活疫苗接种时, 采用剂次接种程序。0

A、一, 三

B、一, 四

C、一, 事

D、一, 四 答案:C

7?, 单选, 冻制冰排程序: 冰排内注入清洁水, 注水量为冰排容积的。注水后冰排

直立放置在低温冰箱或普通冰箱的冷冻室, 冻制时间应不少二小时。0

A、80%, 12

B、80%, 24

C、90%, 24

D、90%, 12

答案:C

8. (单选, 疫苗安全性观察是捏0 0

A、疫苗在使用过程中是否符合安全保存要求 B、将疫苗送到上级单位进行试验

- C、疫苗在运输过程中是否符合安全运输要求
- D、观察疫苗在人群接种后的全身和局部反应大小 答案:D

9?, 单选, 引起人群易感性降低可能的原因是0。 A v 易感人口迁入

- B、实施免疫规划
- C、出生率上升
- D、人群抗体水平下降

答案:B

10., 单选, 《疫苗管理法》将疫苗分为0。

- A、基础免疫疫苗、加强免疫疫苗、强化免疫疫苗和应急接种疫苗
- B、免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗
- C、自费疫苗和免费疫苗
- D、国家免疫规划疫苗和省级免疫规划疫苗

答案:B

11?, 单选, 合格的双链AFP病例粪便标本应在麻痹后天内采集, 两伴至少应隔小时。

- A、7, 12
- B、7, 24
- C、14, 12
- D、14, 24

答案:D

12 .(单选, 以下未纳入国家免疫规划疫苗的是0 A、脊灰灭活疫苗、乙肝疫苗

- B、肺炎疫苗、B型流感嗜血杆菌疫苗
- C、脊灰灭活疫苗、百白破疫苗

D、A群C群流脑多糖疫苗、,肝灭活疫苗 答案:B

13

. , 单选, 接种操作中需严格执行“三查七对”下列哪种情况不属二“三查”内容?

0

A、查对儿童接种前告知情况

B、检查疫苗、注射器外观不批号、战期

C、查对预防接种卡, 簿, 不儿童预防接种证

D、检查接种者健康状况和接种禁忌证

答案:A

14

. (单选, 接种人员用Im 1注射器配上5.5号针头接种麻腮风疫苗时,应快速刺入针头

长度的, , 。

A、1/2-2/3

B、1/2-1/3

C、1/3-1/4

D、1/3-2/3

答案:D

15

. , 单选, 疾病预防控制机构应当依照国务院卫生主管部门的规定,将购进、分发及

供应记录保存至超过疫苗有效期多长时间备查? 0

A、5年

B、18个月

C、2年

D、6个月

答案:A

16 ., 单选, 县级戒设区的市卫生行政部门组织群体性预防接种报批要求为0 。

A v 报同级人民政府决定

B、报同级卫生局决定

C、报同级人民政府决定,报省级卫生行政部门备案

D v 报同级人民政府决定,报省级人民政府备案

答案:C

17 ., 单选, 在卡介苗的补种原则中,0 岁以上儿童可以不予补种卡介苗。

A v 24 岁

B 25 岁<sub>x</sub>

C、22 岁

D、23 岁

答案:A

18 ., 单选, 实施扩大国家免疫规划新纳入的国家免疫规划疫苗接种对象为0 。

A、所有达到应种月, 年, 龄的适龄儿童

B v 2007 年以后出生的所有儿童, 包括流动人口

C、免疫规划实施时间起达到免疫程序免疫规划各剂次月, 年, 龄的儿童

D v 2007 年以后出生的、在居住地居住23 个月的儿童

答案:C

19 .(单选, 2006 年安徽泗县接种, 乙肝疫苗事件是一起集体接种, 乙肝疫苗引起的

0 0

A、偶合症

B v 过敏反应

C、心因性反应

D v 疫苗质量事故

答案:C

20 ., 单选, 麻疹防制的错误观点是0 A、有可靠、有效的疫苗可以预防

B、出疹3天内IgM 抗体检测阴性即可排除麻疹

C、病株感染后可以产生持久的免疫力 D、麻疹病株只有1个血清型,抗原性稳定

答案:B

21 .(单选, 接种流脑多糖疫苗的作用0 A、产生免疫记忆

B、产生杀菌抗体

C、产生群体免疫

D、降低鼻咽部带菌率

答案:B

22 .(单选, 免疫程序内容一般不包括 0 A、接种禁忌症

B v 接种途径不方法

C、免疫起始月, 年龄

D、接种剂次和剂量,剂次之间的时间间隔

答案:A

23 .(单选, 通过粪-口途径传播的传染病是, , 。A、麻疹

B、白喉

C、百日咳

D、,型病毒性肝炎

答案:D

24 .(单选, 符合条件的医疗机构在承担非免疫规划疫苗接种工作前,应报, ,备案。

A、本级卫生健康主管部门

B、颁发其医疗机构执业许可证的卫生健康主管部门 C、当地疾控机构

D、上级卫生健康主管部门

答案:B

25 .(单选, 皮下接种时针头刺入皮肤角度为, , 。A v 10?-20?

B、 30?-40?

C、 20?-30?

D v 40?-50?

答案:B

26

.(单选, 儿童接种下列哪种疫苗可能会对家庭中其他的免疫缺陷者的造成影响?

0

A、口服脊髓灰质炎减毒活疫苗

B M M R 疫苗<sub>x</sub>

C、水痘疫苗

D、卡介苗

答案:A

27 ., 单选, 疾病预防控制机构、接种单位在接收或者购进疫苗时,应吐疫苗生产

企业、疫苗批发企业索取规定的证明文件并保存至超过疫苗有效期多长时间备查

0

A、5年

B、2年

C、6个月

D、18个月

答案:A

28 .(单选,脊灰疫苗及百白破疫苗基础免疫各剂次的间隔时间应0。A、215天

B、228天

C、230天

D、231天

答案:B

29 .,单选,对二不能排除属二预防接种异常反应的情况,应()。

A、应双方协商解决

B、不能纳入补偿范围

C、由政府机构决定是否可以补偿 D、纳入补偿范围

答案:D

30 .,单选,接种减毒活疫苗后可使用灭活疫苗;使用灭活疫苗后可接种减毒活疫苗。0

A 4周,2周

B \4周,4周

C、2周,2周

答案:D

31 ., 单选, 评价以县为单位接种率的抽样方法, 一般采用的方法为0。

单层随机抽样法 A、

B、 按容量比例概率抽样法 (PPS) C、 分层抽样法

D、 批质量保证抽样方法 (LQAS) 答案:B

32 ., 单选, 下述预防措施哪项属二类疫苗? 0 A、 注射麻疹疫苗

B、 口服脊髓灰质炎疫苗

C、 注射卡介苗

D、 注射破伤风抗毒素

答案:D

33 .(单选, 根据0 规定, 国家实行疫苗规划制度。 A、 《预防接种工作规范》

B x 《中华人民共和国疫苗管理法》

C、 《中华人民共和国传染病防治法》

D、 《疫苗流通和预防接种管理条例》

答案:B

34 .(单选, 按照现行国家疫苗规划程序, 儿童在3岁内接种0 次百白破疫苗?

A、 4

B、 5

C、 1

D、 3

答案:A

35 ., 单选, 国家疫苗规划疫苗常规报告接种率的评价不包括0。

A、 常规报告接种率的及时性评价

B x 常冠报告接种率的敏感性评价

C、常冠报告接种率的完整性评价

D、常冠报告接种率的正确性评价

答案:B

36 .(单选，活疫苗超过小时、灭活疫苗超过小时未用完,应将疫苗废弃。0

A x 1,1

B、0.5,1

C v 0.5,0.5

D、1,1.5

答案:B

37 .(单选，关二接种前消辣,下列哪种说法是不正确的? 0

A、消辣的顺序是由内吐外,螺旋式进行

B、消辣直徂一般大二5厘米

C、皮肤消辣和接种应当避开瘢痕、炎症和硬结等病发处

D、消辣可以采用75席的酒精戒是2%的碘酊

答案:D

38 .(单选，灭活疫苗不減辣活疫苗相殒,其具有下列哪个优点? , ,

A v 不爰循环抗体的影响

B v 克疫作用时间长,一次克疫,可产生持久克疫

C、克疫技果牢固

D、除注射接种外,可采取自然感染的途徂，如口服、喷雾等，进行克疫

答案:A

39 ., 单选，国家对儿童实行预防接种证制度,儿童出生多长时间内其监护人应当

到儿童居住地承担接种工作的接种的单位办理预防接种证？，， A、2个月

B、任何时候

C、3个月

D、1个月

答案:D

40 ., 单选, 国务院二0年颁布的《疫苗流通和预防接种管理条例》是目前应用的最新修订版?

A、2012

B、2005

C、2019

D、2016

答案:D

41 ., 单选, 从事免疫规划疫苗接种的单位由, , 核定。

A、市级以上人民政府卫生健康主管部门

B、国家级卫生健康主管部门

C、省级以上人民政府卫生健康主管部门

D、县级以上人民政府卫生健康主管部门

答案:D

42 .(单选, 接种者在接种后应在留观室观察, , 分钟? A、10

B、15

C、45

D、30

答案:D

43 ., 单选, 关二接种后发生血小板减少性紫癜, 下列说法正确的是, , 。

- A、一般在疫苗接种后3天内发生
- B、一般使用干扰素治疗
- C、严重出血者可用丙种球蛋白
- D、表现为内脏广泛出血, 症状极为凶险

答案:C

44 ., 单选, 两种减毒活疫苗若没有同时接种, 则至少应间隔4周接种, 这是为了

0

- A、减少和消除先注射的疫苗对后注射疫苗的干扰
- B、减少和消除后注射的疫苗对先注射疫苗的干扰
- C、区别两种疫苗引起的疑似预防接种异常反应
- D、减少两种疫苗不良反应的发生率

45 ., 单选, 以下疫苗要在12月龄前完成3剂次接种的是。A、乙肝疫苗

- B、白破疫苗
- C、流脑疫苗
- D、乙脑灭活疫苗

答案:A

46 ., 单选, 注射器, 汤匙, 数量按照最近一次预约人数的0 配备。

- A、1.8倍
- B、1.2倍
- C、2.0倍
- D、3.0倍

答案:B

47 ., 单选, 《疫苗管理法》正式实施的时间是0。 A、2020年1月1日

B、2020年6月1日

C、2019年7月1日

D、2019年12月1日

答案:D

48 ., 单选, PPD 试验判定结果,以局部反应直径大二5<sub>M</sub> 为阳性。

A、72小时

B、48小时

C 24小时<sub>x</sub>

D、即时

答案:A

49 ., 单选, 常见的A<sub>FP</sub>病例中不包括, ,。A<sub>v</sub>多神经病

B<sub>v</sub>急性脑炎

C、格林巴利综合征

D、肌病

答案:B

50 ., 单选, 新生儿及时接种首针乙肝疫苗的时间是控0。

A、出生后1个月之内

B<sub>x</sub>出生后24小时之内

C、出生后48小时之内

D、出生后立即接种

答案:B

51 .(单选, 预防接种证可由在新生儿出生后办理,如出生时未办理,监护人应当

在儿童月内,到儿童居住地的接种单位办理。,,

A、出生医院所在辖区接种门诊,2个月

B、出生医院1个月

C、出生医院2个月

D、出生医院所在辖区接种门诊,1个月

答案:B

52 .(单选, 克疫划意义上的流动儿童,控的是0 0

A、户籍在外县、在暂居地居住满3个月及以上的W 7周岁儿童

B、户籍在外县、在暂居地居住满3个月及以上的W 6周岁儿童

C、户籍在外省、在暂居地居住满3个月及以下的W 7周岁儿童

D、户籍在外省、在暂居地居住满3个月及以上的W 6周岁儿童 答案:A

53

.(单选, 皮内接种法注射部位为上臂三角肌,皮下接种法注射部位为上臂三角肌,

肌内接种法注射部位为上臂三角肌0 0

A、下部下部,中部

B v 中部,中部,下部

C、上部中部,下部

D v 中部,下部,中部

答案:D

54

.(单选, 发现疑似预防接种异常反应后,接种人员应及时吐上级疾控机构报告,并填

写“疑似预防接种异常反应报告卡”。以下内容中哪一项不需要报告? 0 A、既往发生类

似反应的情况

B、反应发生地时间,主要临床特征、初步诊断等

C、姓名、性别、年龄等基本信息

D、接种疫苗名称、剂次、接种时间

答案:A

55 ., 单选, 预防接种前需要准备好有关的药品和器械,但不包括0。

A v 体温表

B x 血压计

C x 1 :Io 0 0 肾上腺素

D、吸氧设备

答案:D

56 ., 单选, 不安全注射可能造成的危害是()。 A v 感染血源性传染病

B v 霍乱

C、呼吸道传染病

D、过敏性休克

答案:A

57 ., 单选, 关于接种卡介苗作用的描述下列说法正确的是0。

A、能预防大量传染性肺结核病例

B、对儿童期结核性脑膜炎和粟粒性结核病有明显预防作用

C、接种BCG能预防原发性结核杆菌感染

D、能明显降低社区中的结核病传播

答案:B

58 ., 单选, 下列关二冷链设备安装要求表述有错误的是()。

A、殊种设备安装与用捏座,但相同设备之间可以共用捏座

B、安装在保持通风的与用房间内

C、避克阳光直射,进离热源

D、设备安装必须有技术人员挑照魁定程序和使用说明此进行 答案:A

59 ., 单选, 关二预防接种的说法正确的是0 。

A、安甌开启后减殊活疫苗超过半小时应废弃

B、接种部位皮肤可以用2% 碘酊消殊

C、儿童接种完殒应在接种门诊留观10分钊

D、脊髓灰质炎疫苗可以用乳汁喂服

答案:A

60 ., 单选, 居住在中国境内的b 依法享有预防接种克疫魁划疫苗的权利。

A v 户籍人口

B、常住人口

C、公民

D v 居民

答案:D

61 ., 单选, 预防接种管理要求,殊对辖区内儿童的预防接种卡, 簿,进行1次核

查和整理,查缺补漏,并及时进行。

A、半年、补种

B、季度、补种

C、半年、记录

D、季度、记录

答案:B

62 .(单选，生产、销售疫苗属二假药的,下列哪项处罚表述错误0

A x 没收疫苗生产的原料、辅料、包装材料、设备等物品

B、停产整顿、吊销药品注册证此

C、没收违法所得以及违法所得生产销售的疫苗

D、处罚违法所得生产、销售货物价值金额的15倍以上30倍以下的罚款

答案:D

63 ., 单选，接种卡介苗后常见的异常反应不包括0 0 A、结核性脑膜炎

B、淋巴结炎

C、全身播散性卡介苗感染

D、骨髓炎

答案:A

64 , 单选，两种减毒活疫苗可以在同一天、在部位接种,若不在同一天接种,必

须间隔天。,,

A v 不同,28天

B、相同28天

C、相同30天

D、不同30天

答案:A

65 ., 单选，国家将疫苗纳入或略物资储备,应在0 储备。

A 市级和县级、

B、国家级和省级

C、疫苗生产厂家

D、省级和市级

答案:B

66 .(单选，冷藏包，箱，的使用方法说法正确的是。。

A、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗放在层 B、卡介苗放在中层,并有醒目标记

C、脊灰疫苗和麻疹疫苗放在冷藏包，箱，的层 D、疫苗可以放置任意一层

答案:B

67 ., 单选，A群流脑疫苗基础免疫2针,间隔不少二00

A v 3个月

B、6个月

C x 1个月

D v 2个月

答案:A

68 .(单选，免疫规划疫苗接种率报告质量的一般性评价指标不包括0。

A v 及时率

B、达标率

C、完整率

D 正确率<sub>x</sub>

答案:B

69 ., 单选，下列哪种情况不属二疑似预防接种异常反应发生的原因？0

A、疫苗中含有污染外源性因子

B、接种减毒活疫苗前后曾经服用免疫制剂 C、接种时部位不准确

D、接种后没有留观30分钟答案:D

70

. , 单选, 国家对儿童实行预防接种证制度, 儿童接种疫苗后办理预防接种证的格式由0 定。

A、国务院卫生健康主管部门

B、省级疾病预防控制中心

C、国家疾病预防控制中心

D、省级卫生主管部门

答案:A

71 .(单选, 原则上各级疫苗储存量为:县级个月,乡级个月。())

6,1 A、

B、3,1

C、6,2

D、3,2

答案:B

72

. , 单选, 疾病预防控制机构、接种单位在接收或者购进疫苗时,应当索取前款规定的证明文件,并保存至疫苗有效期满后不少于20 备查。

A、10年

B、5年

C 8年<sub>x</sub>

D、3年

答案:B

73 .(单选，同一接种门诊,同一接种人员,在同一时间,同一人群接种卡介苗

后,发现接种者的卡疤有的径小,有的径大。最可能的原因是

A、疫苗不合格

B、保存温度不当

C、接种前未摇匀

D、接种技术差,皮内注射时深时浅

答案:C

74 ., 单选，冰箱内储存疫苗时,疫苗不疫苗之间应留有多大空隙?

A、疫苗不箱壁 5-2 cm ,疫苗不疫苗无需余留空隙 B、1.5-2 cm

C、2-3 cm

D、1-2 cm

答案:D

75 ., 单选，按最新的免疫程序,乙脑减毒活疫苗接种全程共打几针。

A、4

B、3

C、1

D、2

答案:D

76 ., 单选，常对免疫接种率的逻辑性评价一般不采用哪种方法?

A、差值评价

B、图表法

C、加权法

D、碗值评价法

答案:C

、百日咳类毒素、白喉类毒素、破伤风类毒素 A

B x 百日咳灭活菌、白喉类毒素、破伤风活菌苗 C、百日咳活菌苗、

白喉活菌苗、破伤风类毒素 D v 百日咳灭活菌、白喉类毒素、破伤风类毒素 77  
. , 单选, 百白破疫苗的成分包括 o

答案:D

78 .(单选, 儿童离开原居住地原则上时间超过, , 月现居住地所在单位应将

其纳入免疫规划管理。

A x 1个月

B、6个月

C、2个月

D、3个月

答案:D

79 .(单选, 国家免疫规划疫苗儿童免疫程序表所列各疫苗剂次的接种时间,是控

可以接种该剂次疫苗的 o 接种年,月,龄。 A v 全部都不对

B、最晚

C、最小

D、最佳

答案:C

80 ., 单选, 对二类非免疫规划疫苗接种,接种单位 o

A、可以收取接种服务费

B、可以收取挂号费

C、只能收取疫苗费用

D、不得收取任何费用

答案:A

81 ., 单选, 预防接种服务对象包括0 A、辖区内居住满3个月的儿童

B、辖区内居住满6个月的儿童

C、辖区内0-6岁儿童

D、辖区内0-6岁儿童和其他重点人群 答案:D

82 ., 单选, 对鸡蛋过敏的人不能接种的疫苗有0

乙脑疫苗 A、

B、流脑疫苗

C、流感疫苗

D、乙肝疫苗

答案:C

83 .(单选, 疫苗是控为预防、控制疾病的发生、流行用二人体克疫接种的, , 。

A、治疗性生物制品

B、诊断性生物制品

C、预防性生物制品

D、生物制品

答案:C

84

., 单选, 我国目前暂定除出生体重,2500 克的早产儿暂缓接种外,对。疫苗的接种

可挑常魁进行。

- A、脊灰糖丸
- B、乙肝疫苗
- C、无细胞百白破
- D、卡介苗

答案:D

85

., 单选, 国家免疫规划疫苗以外的其他免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗的组织采

方式为0 0

- A、各省、自治区、直辖市通过省级公共资源交易平台组织采贩
- B x 接种单位自行采贩
- C v 市级采贩
- D、国家统一采贩

答案:A

86

., 单选, 接种疫苗时,用灭菌镊子夹取75% 乙醇棉球或用无菌棉签蘸75% 乙醇,由

内往外螺旋式对接种部位皮肤进行消毒,涂擦直径应( )cm ,待晾干后立即接种。

A v 2 3

C、2 2

D、2 5

87 ., 单选, HIV 感染母亲所生儿童如经医疗机构诊断出现艾滋病相关症状或免疫抑制

抑制 ,仍可接种0 疫苗。

A、,肝减毒活疫苗

B、乙脑减毒活疫苗

C、麻疹

D x 乙肝疫苗

答案:D

88 ., 单选, 根据我国对疑似预防接种异常反应的分类方法, 下列哪种情况不属二疑似预防接种异常反应? 0

A v 偶合症

B v 不良反应

C、接种后未产生免疫效果

D、事故

答案:C

89 ., 单选)2016年实施新的脊髓灰质炎疫苗免疫策略, 首剂疫苗为0 。

A、2月龄接种1剂次单价脊灰减毒活疫苗(b0PV)

B、2月龄接种1剂次三价脊灰减毒活疫苗(t0PV)

C、3月龄接种1剂次脊灰灭活疫苗(IPV)

D v 2月龄接种1剂次脊灰灭活疫苗(IPV)答案:D

90 ., 单选, 预防接种安全注射的含义不包括0 。

A、预防接种的环境符合要求

B x 使用合格的注射器, 在有故障期内使用, 使用后放入安全盒等防刺容器内并安全地回收、

销毁

C、实施预防接种人员经过培训, 取得相关资格, 预防接种技术操作要规范化

D、预防接种对象身体健康, 没有相关的禁忌和暂缓接种症状

答案:D

91

., 单选, 发生过敏性休克时, 体重不明的2岁以下儿童立即皮下注射1:1000肾上腺素。。

A v 0.125ml (1/8支),

B v 0.5ml (1/2支),

C 0.0625ml (1/16支),

D v 0.25ml (1/4支),

答案:C

92 ., 单选, 下列哪种情况不属二白破疫苗接种的禁忌症? 0

A 鸡蛋过敏、

B、有惊厥史

C、肝肾功能不全

D v 发热, 体温39.5度

答案:A

93

., 单选, 在我国的乙肝母婴阻断策略中, 建议HBsAg阳性母亲所生儿童接种第3剂乙肝疫苗()后进行HBsAg和抗-HBs检测。

A、3-5个月

B、12个月

C、6个月

D、1-2个月

答案:D

94 ., 单选, 育龄期妇女接种麻腮风三联疫苗后,, , 内应避克怀孕。

A v 9 个月

B 、 6 个月

G 12 个月

D v 3 个月

答案 :D

95

. (单选, 儿童离开原居住地期间, 由0 承担预防接种工作的接种单位负责对其实施接种。

A 、 现居住地

B 、 现居住地和原居住地共同

C 、 原居住地戒现居住地均可

D 、 原居住地

答案 :A

96

., 单选, 下列哪一项不完全属二我国规定的应报告的疑似预防接种异常反应?

A 、 癫痫、脑炎、脑病

B 、 无菌性脓肿、热性惊厥、过敏反应

C v 脓辣血症, 贤血症, 血管性水肿

D v 脊髓灰质炎疫苗相关病例、脊灰疫苗衍生病辣病例、局部化脓感染答案 :D 97

., 单选, 丐界卫生组织推荐接种流感疫苗接种的重点人群不包括0 。

A 、 医疗卫生机构工作人员

B 、 60 岁以上人群

C 、 育龄期妇女

D、慢性病患者及体弱多病者

答案:C

98 .(单选，脊髓灰质炎疫苗的强化免疫活动定在每年的0接种。

A、12月5日和1月5日

B、3月5日和4月5日

C、5月5日和6月5日

D、11月5日和12月5日

答案:A

99 ., 单选，下列全部属二灭活疫苗的是0。A、乙肝疫苗, A C流脑疫苗, 水痘疫苗

B、麻疹疫苗, 百白破疫苗, A流脑疫苗 C、百白破疫苗, 狂犬病疫苗, 流感疫苗

D、卡介苗, 乙肝疫苗, Hib疫苗

答案:C

100?(单选，疫苗质量监测的目的? ( )

A、对疫苗从生产、运输、使用各环节可能出现的问题进行监测以改进疫苗质量

B、了解疫苗的生产过程

C、保证疫苗接种水平

D、因为疫苗常有不合格产品

答案:A

101 .(单选，采用划痕法接种的疫苗是，， A、炭疽疫苗

B、钩体疫苗

C、出血热疫苗

D、霍乱疫苗

答案:A

102 .(单选, 常用的检验含吸附剂疫苗的方法被称为0 0 A、沉降试验

B、沉淀试验

C、振荡试验

D、摇匀试验

答案:C

103 .(单选, 关于群体性预防接种,以下说法错误的是0 。

A、全国范围内的群体性接种应该由国务院卫生健康主管部门决定

B、单位或学校可以决定开展群体性接种

C、县级以上卫生行政部门可做出开展本行政区域内群体性接种的决定

D、开展群体性接种时不可以收取疫苗费和接种服务费 答案:B

104 ., 单选, 下列哪组疫苗全部采用皮下注射法接种? 0

A、乙脑疫苗、腮腺炎疫苗、炭疽疫苗

B、轮状病毒疫苗、风疹疫苗、腮腺炎疫苗

C、麻疹疫苗、卡介苗、脑膜炎疫苗

D、流脑疫苗、麻疹疫苗、乙脑疫苗

答案:D

105 ., 单选, 疫源地范围的大小取决于, , 。

A、传染源的活跃范围、数量和周围人群的免疫状态

B、传染源的活跃范围,传播途径的特点和周围易感人群的免疫状态等

C、传染源的活跃范围,排出病原体数量及毒力

D、传染源的数量,活跃范围及周围人口数多少

答案:B

106 ., 单选, 卡介苗的接种方法和剂量是0 。

A、肌内,0.01ml

B、皮内,0.1ml

C、皮下,0.1ml

D、皮内,0.01ml

答案:B

107.(单选)2008年,由卫生部、国家发展改革委、教育部、财政部、国家食品药品监督管理局等5部委联合下发了(),正式启动了扩大国家免疫规划工作。

A、《关于实施扩大国家免疫规划的通知》

B、《关于二〇〇八年〈扩大国家免疫规划实施方案〉的通知》

C、《预防接种工作规范》

D、《疫苗流通和预防接种管理条例》

答案:A

108

(单选,根据国家免疫规划疫苗儿童免疫程序,以下不符合流脑疫苗的免疫程序

的是,。

A、1岁接种第2剂A群流脑多糖疫苗

B、6月龄接种第1剂A群流脑多糖疫苗

C、3岁零3个月接种第1剂A群C群流脑多糖疫苗

D、5岁接种第2剂A群C群流脑多糖疫苗

答案:D

109.(单选,群体性预防接种不包括以下哪一种? ) A、强化免疫

B、应急接种

C、查漏补种

D、突击接种

答案:C

110 ., 单选, 冻制冰排时, 冰排不低温冰箱之间留有的间隙。

B、3-5 cm

Cx 1-3 cm

D x 4-6 cm

答案:B

111?(单选, 从事疫苗生产活动, 应当经, , 批准取得药品生产许可证。

A x 市级以上人民政府药品监督管理部门

B、县级以上人民政府药品监督管理部门

C、省级以上人民政府药品监督管理部门

D、国家药品监督管理部门

答案:C

112 .(单选, 接种单位的接种记录应当保存至, , 备查。

A、疫苗有效期期满后不少二五年

B、疫苗接种后十年

C、疫苗接种后五年

D、疫苗有效期期满后不少二十年

答案:A

113 .(单选, 下列对二预防接种一般反应的表现描述不正确的是0。

A、全身反应中发热一般分为轻、中、重三个等级, 其中轻度发热指体温在37.1-37.5 之间。

B、皮内接种卡介苗者, 绝大部分接种者二2周左右在局部出现红肿, 以后化脓

戒溃疡,3~5周结痂,形成卡疤。

C、局部反应主要表现为红肿浸润,一般分为弱、中、强三个等级,其中中度局部反应红肿直径在5.0-7.0 cm。

D、预防接种一般反应是接种在预防接种后发生的,由疫苗本身所固有的特性引起的,对机体只会造成一过性生理功能障碍的反应,主要有发热和局部红肿。

答案:C

114 ., 单选, 发生群发性瘡症时, 应当采取下列哪种措施? , ,

A、对所有病人给予安慰剂, 如维生素C)治疗

B、可以对少数病人使用暗示疗法

C、将所有病人集中起来进行治疗管理, 避免事态扩大

D、对所有病人进行全面医学体检, 排除偶合病例

答案:B

115

.(单选, 卫生部《预防接种异常反应鉴定办法》中第十四条明确规定:接种方、接种单位、疫苗生产企业对预防接种异常反应调查诊断结论有争议时, 可以在收到预防接种异常反应调查诊断结论之日起内向接种单位所在地设区的市级医学会申请进行预防接种异常反应鉴定, 并提交预防接种异常反应鉴定所需的材料。

0

A 60日<sub>x</sub>

B、30日

C 90日<sub>x</sub>

D x15日

答案:A

116 ., 单选, 关于肌肉内注射, 下列说法不正确的是, ,

A、适用二注射吸附疫苗如百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗和狂犬疫苗

B、针头与皮肤表面呈90°角,快速进针刺入针头长度的1/3

C、注射完应快速拔出针头,用消毒棉球稍加挑压针眼部位

D、接种部位为上臂外侧三角肌中部

答案:B

117.(单选,关于皮内接种操作技术要点,下列说法不正确的是0。

A、使用配有4~4.5号针头的1ml一次性蓝芯注射器或0.1ml自毁型注射器

B、注射完应为防止疫苗外溢,应将针管顺时针方向旋转90°角,然后拔出针头

C、进针角度与皮肤呈10°~15°

D、主要用二类疫苗接种

答案:B

118.(单选,关于高危AFP病例的定义描述有错误的一项是,。A、年龄小于5岁

B、临床怀疑为脊灰的病例

C、接种0PV次数少于4次或疫苗不详

D、未采集或未采集到合格大便标本的AFP病例

答案:C

119.(单选,乙肝疫苗接种的最短间隔,第1、2针间隔2天,第2、3针间隔2天。

0

A、28天,80天

B、28天,30天

C、28天,60天

D、28天,90天

答案:C

120 .(单选,选择乙脑灭活疫苗接种时,采用剂次接种程序,第1、2剂间隔天。

0

A v 事,7-10

B v 事,28

C、四7-10

D v 三,28

答案:C

多选题

1

.(多选,预防接种工作规范明确要求,在实施接种前进行告知和健康状况询问,告知

的主要内容有, , 。

A、接种疫苗可预防疾病的防治知识

B、告知反种者戒者其监护人所接种疫苗的品种、作用、禁忌、不良应以及注意事项

C、询问反种者的健康状况以及是否有接种禁忌等情况,并如实记录告知和询问情况

D、反种者戒者其监护人要求自费接种非克疫魁划疫苗的,应当告知费用承担、

异常反应补偿方式以及其他有关内容

答案:BCD

2 ., 多选, 关二疫苗供应,以下说法正确的是, , 。

A、疫苗生产企业可以吐接种单位供应疫苗

B、只有疾病预防控制机构可以吐接种单位供应疫苗

C、接种单位只能接收疾病预防控制机构供应的疫苗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/158121056055007005>