

# 公共卫生与预防医学考试题库

## 第一部分 单选题(300题)

1、使用无菌持物钳的方法哪项是错误的【单选题】——

- A. 使用时钳端朝下,不得反转向下
- B. 到远处夹取物品后立即放回原处
- C. 每一容器只能放一把钳子
- D. 取、放钳时钳端须闭合 不可夹取油纱布

【答案】： B

2、煮沸消毒灭菌时,错误的操作是【单选题】——

- A. 大小相同的盆应重叠
- B. 玻璃类用纱布包好
- C. 物品完全浸没在水中
- D. 煮沸过程中再加物品,应在第二次水沸后重新计时 有轴节的器械宜打开

【答案】： A

3、不属于高度危险物品的是【单选题】——

- A. 腹腔镜
- B. 导尿管
- C. 体温表
- D. 穿刺针 手术器材

【答案】： C

4、以下概念正确的是【单选题】——

- A. 地面应湿式清扫,保持清洁,局部有血迹等污染时局部用消毒剂处理
- B. 地面应经常用含氯消毒剂拖洗,既能消毒,又能增白
- C. 检验科的地面每天均需用消毒剂拖洗
- D. 拖洗工具使用后先洗净,再消毒,然后晾干

因为 2%戊二醛是高水平消毒剂,有条件时最好用戊二醛拖地,消毒效果好

【答案】：A

5、在我国医院内感染中,病人最常发生感染的部位是【单选题】——

- A. 泌尿道
- B. 外科切口
- C. 血液
- D. 呼吸道 胃肠道

【答案】：D

6、对医院发生的医院感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施【单选题】——

- A. 卫生部医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：D

7、有关隔离的概念,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 咽白喉应严格隔离,皮肤白喉需接触隔离
- B. 流行性腮腺炎进行呼吸道隔离,脊髓灰质炎进行肠道隔离
- C. 大面积烧伤进行接触隔离
- D. 多重耐药株感染应列入接触隔离 活动性肺结核的隔离期是有效治疗后 6 周

【答案】：E

8、有关抗生素管理下列哪项错误【单选题】——

- A. 把抗菌药物分成一线、二线药物,二线药物应控制使用
- B. 二线药物毒副作用大、价贵、疗效低
- C. 在同类抗生素中应留有替代性药,在必要时再启用
- D. 无药敏结果参考时,可按经验选药原则用药 定期全院菌株

的药敏统计结果公布,为临床用药与药剂科进药提供信息

**【答案】**： B

9、潜伏病毒的激活感染是【单选题】——

- A. 麻疹恢复期
- B. 隐性乙型脑炎病毒感染
- C. 乙型肝炎病毒携带者
- D. 单纯疱疹反复发作 慢性活动性肝炎

【答案】：D

10、无菌盘铺好后有效时间不超过【单选题】——

- A. 4h
- B. 6h
- C. 8h
- D. 5h 7h

【答案】：A

11、为节省时间,护士给传染病患者发药时所使用的下述哪一项方法是错误的【单选题】——

- A. 用过的药杯放在消毒液内浸泡
- B. 车下层放盆,内盛消毒液
- C. 按床号依次给患者服药
- D. 全病区发药完毕,按常规消毒药杯 将备好的药及水壶放在治疗车上

【答案】：C

12、关于使用中的消毒剂、灭菌剂的监测,下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 应进行生物和化学监测
- B. 生物监测:消毒剂每季度1次,其细菌含量必须 $<100\text{cfu/mL}$ ,不得检出致病性微生物
- C. 灭菌剂每月生物监测1次,不得检出任何微生物
- D. 含氯消毒剂、过氧乙酸等的浓度应每天监测 对戊二醛浓度的监测应每月不少于1次

【答案】：E

13、医院感染最常发生的疾病是【单选题】——

- A. 肠道传染病
- B. 泌尿道感染
- C. 外伤感染
- D. 表皮传染病          呼吸道传染病

【答案】：E

14、根据我国卫生标准回答以下问题：对本地区的医院内感染管理进行技术指导的应是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科          临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

15、根据我国卫生标准回答以下问题：接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ，致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出          细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ，致病性微生物不得检出

【答案】：B

16、经血液、体液传播的病原体不包括【单选题】——

- A. 乙型肝炎病毒
- B. 丙型肝炎病毒
- C. 人类免疫缺陷病毒
- D. 麻疹病毒          疟原虫

【答案】：D

17、关于血液净化室的医院内感染管理,下列哪项不正确【单选题】——

- A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查
- B. 工作人员定期体格检查,加强个人防护
- C. 透析器、管路应一次性使用
- D. 传染病病人在隔离净化室进行血液净化,专机透析 急诊病人不需固定透析机

【答案】：E

18、医院发现一次性使用无菌医疗用品不合格产品或质量可疑产品时,应【单选题】——

- A. 立即停止使用,与供应商联系进行退、换货处理
- B. 立即停止使用,并报告医院管理部门进行退、换货处理
- C. 可继续使用,但应注意密切观察有无不良反应发生
- D. 立即停止使用,并及时报告当地药品监督管理部门,不得自行作退、换货处理 立即停止使用,并及时报告医院管理部门,就地销毁不合格产品

【答案】：D

19、手术中切开空腔脏器前用纱垫保护的目的是【单选题】——

- A. 防止内脏器官暴露过久
- B. 防止细菌污染
- C. 防止出血
- D. 防止损伤 防止术后腹胀

【答案】：B

20、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是【单选题】——

- A. 部分医院感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施
- C. 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致
- D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因

滥用抗感染药物可致二重感染

【答案】：C

21、WHO 认为医院监测的最终目标是【单选题】——

- A. 为了减少医院感染和由此所造成的损失
- B. 降低医院感染率,减少获得医院感染的危险因素
- C. 建立医院的医院感染发病率基线
- D. 利用调查资料说服医务人员遵守感染控制规范与指南 评价效果,调整和修改感染控制规范

【答案】：A

22、根据我国下列卫生标准回答:进行医院内感染管理的策略研究,为国家提供咨询意见的是【单选题】——

- A. 国家医院感染管理咨询专家委员会
- B. 省医院感染管理专家咨询委员会
- C. 各级医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：A

23、根据我国卫生标准回答:接触黏膜的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出 细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】：B

24、患者女性,45岁。III度烧伤后行植皮术,大腿内侧供皮区消毒不可使用【单选题】——

- A. 3%碘酊
- B.

1:1000 苯扎溴铵酞

C. 0.5%PVP 碘

D. 1:1000 氯己定酞 70%乙醇

【答案】：A

25、关于使用中的灭菌剂的监测正确的是【单选题】——

A. 生物监测每周一次

B. 生物监测每天一次

C. 生物监测不得检出致病微生物

D. 化学监测每月一次 灭菌后的物品不得检出任何微生物

【答案】：E

26、供应室无菌区【单选题】——

A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$

C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$

D. -, 物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$  空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】：B

27、一次性使用无菌医疗用品用后的处理正确的是【单选题】——

A. 进行消毒、毁形、进行无害化处理

B. 经消毒灭菌后重复使用

C. 集中管理, 统一交废品公司回收利用

D. 经管理部门统一进行消毒处理后可重复使用 先浸泡, 再清洗, 然后再进行灭菌处理

【答案】：A

28、根据我国卫生标准回答以下问题: 接触皮肤的医疗用品【单选题】——



A. 必须无菌

B.

细菌菌落总数应 $\leq 20\text{cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

C. 细菌菌落总数应 $\leq 200\text{cfu/g}$  或 $\leq 200\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出

D. 细菌菌落总数应 $\leq 100\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出  
细菌菌落总数应 $\leq 300\text{cfu/mL}$ ,致病性微生物不得检出

【答案】： C

29、血液净化室的医院感染管理下列哪项不正确【单选题】——

A. 应对病人常规进行血液净化前肝功能、肝炎病原体等检查

B. 工作人员定期体检,加强个人防护

C. 透析器、管道应专人专用

D. 传染病病人在隔离血液净化间内进行,专机透析  
急诊病人不需固定透析机

【答案】： E

30、医院感染监测;管理监督;评价效果;发现问题提出对策【单选题】——

A. 卫生部医政司医院感染管理委员会

B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会

C. 医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科  
临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】： C

31、根据我国下列卫生标准回答:对医院发生的医院内感染流行、暴发流行进行调查分析,提出控制措施,并组织实施的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科  
临床科室医院感染管理小组

【答案】： D

32、美国一护士在护理埃博拉感染患者时,也被诊断为埃博拉出血热,其属【单选题】——

- A. 外来病毒感染
- B. 非接触性感染
- C. 自患传染性疾病
- D. 医院感染 因空气造成的感染

【答案】： D

33、关于压力蒸汽灭菌效果监测要求正确的是【单选题】——

- A. 工艺监测每天进行
- B. 化学监测每包进行
- C. 生物监测每周进行
- D. B-D 试验每天灭菌后进行 B-D 试验每锅进行

【答案】： B

34、护士上午铺好无菌盘后,因临时有事离开 2 个小时后需使用该无菌盘,其应采取【单选题】——

- A. 将原来铺好的重新消毒
- B. 另取一个未经消毒的
- C. 使用昨天使用过的
- D. 使用原来铺好的 使用未使用但经消毒的

【答案】： D

35、II 类区域空气消毒合格的标准是【单选题】——

- A. 细菌总数 $\leq 300\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- B. 细菌总数 $\leq 400\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- C. 细菌总数 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌
- D. 细菌总数 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌 细菌总数 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,未检出致病菌

【答案】： C

36、医院感染的病原特点不对的是【单选题】——

- A.

90%为条件致病微生物,少数为致病微生物

- B. 一种病原引起多部位感染或一个部位有多种细菌感染
- C. 近年来 G-杆菌中非发酵菌和 G+球中的表皮葡萄球菌以及真菌下降趋势
- D. 多为耐药菌或多重耐药菌 免疫功能低下患者的病原谱广,病原随抗生素应用或免疫功能缺损程度而有变迁

【答案】：C

37、避污纸的正确使用方法为【单选题】——

- A. 污染的手取避污纸可掀页撕取
- B. 从页面抓取
- C. 随便撕取
- D. 掀开页面抓取第一页 清洁手取避污纸需他人传递

【答案】：B

38、肾移植患者应采取哪种隔离措施【单选题】——

- A. 严密隔离
- B. 接触隔离
- C. 呼吸道隔离
- D. 消化道隔离 保护性隔离

【答案】：E

39、穿过皮肤或黏膜进入无菌的组织或器官内部的器材【单选题】——

- A. 灭菌剂或物理.化学灭菌方法
- B. 应用灭菌剂或高效消毒剂
- C. 杀灭结核杆菌的消毒剂或中.低效消毒剂
- D. 应用物理灭菌方法 杀灭细菌繁殖体的消毒剂

【答案】：A

40、下列细菌是目前医院内感染常见的细菌,但除外【单选题】——

- A. 葡萄球菌特别是金黄色葡萄球菌和凝固酶阴性葡萄球菌

B. 大肠埃希菌

C.

沙门菌属

D. 铜绿假单胞菌 肺炎杆菌

【答案】：C

41、下列哪种情况属于医院感染：【单选题】——

A. 皮肤、粘膜的开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

B. 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症

C. 婴儿经胎盘获得的感染,如CMV、弓形虫病发生在出生后48小时以内者

D. 住院中由于治疗措施而激活的感染 由于输注苏打外渗引起的局部炎症

【答案】：D

42、下列不属于内源性感染情况的是【单选题】——

A. 寄居部位的改变

B. 宿主的局部或全身免疫功能下降

C. 菌群失调和二重感染

D. 通过空气或水源的感染 潜在感染活化:如疱疹病毒、结核等

【答案】：D

43、目前引起下呼吸道医院感染最主要的病原体是【单选题】——

A. 铜绿假单胞菌

B. 链球菌

C. 表皮葡萄球菌

D. 卡他球菌 金黄色葡萄球菌

【答案】：A

44、三级综合医院的医院感染管理机构每月发布发生率最高的医院感染性疾病是【单选题】——

A. 泌尿道感染

B. 表皮传染病

C.

呼吸道传染病

D. 外伤感染 肠道传染病

【答案】：C

45、下列哪项是正确的【单选题】——

- A. 无菌器械保存液应该是无菌的,最多允许检出少量微球菌
- B. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 200$ cfu/mL,不得检出致病性微生物
- C. 无菌器械保存液细菌总数应 $\leq 5$ cfu/mL,不得检出致病性微生物
- D. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 10$ cfu/mL,允许检出金黄色葡萄球菌
- E. 使用中消毒剂细菌总数应 $\leq 100$ cfu/mL,不得检出致病性微生物

【答案】：E

46、医院感染控制措施中手术部位感染已证实有效的措施不对的是【单选题】——

- A. 清洁的手术环境
- B. 工作人员装束和手术室的无菌操作
- C. 术前沐浴和患者局部皮肤准备
- D. 合理的预防性抗生素的应用和外科伤口监测 熏蒸消毒,术前剃毛
- E. 术前剃毛

【答案】：E

47、烧伤病房【单选题】——

- A.  $\leq 10 \leq 5 \leq 5$
- B.  $\leq 200 \leq 5 \leq 5$
- C.  $\leq 500 \leq 10 \leq 10$
- D.  $\leq 15 \leq 15$

【答案】：B

48、普通手术室医护人员手表面细菌菌落总数卫生标准应【单选题】

——

- A.  $\leq 5$ cfu/cm<sup>2</sup>
- B.  $\leq 10$ cfu/cm<sup>2</sup>
- C.

$\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

D.  $\leq 200\text{cfu}/\text{cm}^2$   $\leq 500\text{cfu}/\text{cm}^2$

【答案】：A

49、根据我国下列卫生标准回答:对本地区的医院内感染管理进行技术指导的是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科 临床科室医院感染管理小组

【答案】：B

50、伤寒病人应采取【单选题】——

A. 严密隔离

B. 接触隔离

C. 保护性隔离

D. 消化道隔离 呼吸道隔离

【答案】：D

51、下列情况属于医院感染【单选题】——

A. 住院中由于治疗措施而激活的感染

B. 在皮肤、粘膜开放性伤口只有细菌定植而无临床症状或体征者

C. 婴儿经胎盘获得的感染,如CMV,弓形虫发生在出生后48小时以内者

D. 由于输注苏打外渗引起的局部炎症 由损伤而产生的炎症或由非生物因子刺激产生的炎症

【答案】：A

52、发现医院感染流行趋势时,医院感染科应在多长时间内报告医院主管领导和主管部门【单选题】——

A. 48h

B. 36h

C.



24h

D. 12h 6h

【答案】：C

53、对门诊胃镜室使用过的纤维胃镜进行消毒,应该选择的消毒溶液是

【单选题】——

A. 1%氯胺溶液

B. 5%碘伏

C. 0.1%苯扎溴铵溶液

D. 2%碱性戊二醛溶液 0.2%过氧乙酸溶液

【答案】：D

54、无菌区的定义是【单选题】——

A. 经过灭菌处理的区域

B. 不使已灭菌的物品再污染并保持灭菌

C. 未经灭菌处理的区域

D. 经过灭菌未被污染的区域 灭菌处理后被污染的区域

【答案】：D

55、支气管镜采用 2%碱性戊二醛消毒时间应不少于【单选题】——

A. 120min

B. 60min

C. 30min

D. 20min 10min

【答案】：D

56、减少免疫功能低下者发生医院感染的措施不正确的是【单选题】

——

A. 尽量减少侵入性操作

B. 大量应用广谱抗菌作用预防感染

C. 积极发现和治疗局部病灶和潜在性感染

D. 采取保护性隔离措施,切断感染途径 采用选择性脱污染措

施,减少内源性感染

**【答案】**：B

57、下列哪项不是医院感染病原学的特点【单选题】——

- A. 细菌是最常见的病原体,细菌的种类和分布因感染类型、医院类别、患者具体情况和采取措施不同
- B. 目前以革兰阴性杆菌为主,如肠杆菌和非发酵菌,这些细菌常有耐药性
- C. 近年来随着抗生素的大量使用,革兰阳性球菌感染,特别是耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染、凝固酶阴性葡萄球菌感染正在增加
- D. 厌氧菌和深部真菌是机体正常菌群常引起内源性感染 真菌感染正在减少

【答案】：E

58、对芽孢无效的化学消毒剂是【单选题】——

- A. 0.5%过氧乙酸溶液
- B. 环氧乙烷
- C. 40%甲醛溶液
- D. 2%戊二醛溶液 70%乙醇溶液

【答案】：E

59、用平车护送伤寒患者摄片,正确的方法是【单选题】——

- A. 协助患者直接卧于平车上
- B. 铺清洁大单于平车上,协助其卧上
- C. 协助患者卧于平车上后,再盖上一条清洁大单
- D. 患者更换清洁衣裤后,卧于平车上 将患者床单铺在平车上,协助其卧上

【答案】：B

60、怀疑医院感染病例取标本进行病原体检查时不正确的是【单选题】——

- A. 采集标本后及时送检
- B. 收到标本后及时检查
- C. 尽可能做到涂片检查与病原体培养相结合
- D. 为节约经费,在抗感染治疗效果不佳时取标本做病原体检查

在使用抗菌药物前送标本

【答案】：D

61、下列内镜需灭菌但除外【单选题】——

- A. 脑室镜
- B. 胸腔镜
- C. 腹腔镜
- D. 关节镜 支气管纤维镜

【答案】：E

62、医院污物的处理原则,下述哪项是错误的【单选题】——

- A. 防止污染扩散
- B. 分类收集
- C. 分别处理
- D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

63、一般病室. 办公室. 治疗室. 换药室. 走廊等使用的拖把【单选题】

——

- A. 先用 1000mg/L 有效氯消毒剂适量倒在污染地面 30min 后,用拖把拖干净
- B. 拖把用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min 后,再洗干净,晾干备用
- C. 拖把应有明显的标记,严格分区使用
- D. 每次使用后清水冲洗,悬挂晾干备用 应先消毒,用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,再用水洗干净,然后用 500mg/L 有效氯消毒液浸泡 30min,悬挂晾干备用

【答案】：D

64、目前医院内感染的研究对象主要是【单选题】——

- A. 住院患者
- B. 工作人员
- C.

陪护人员

D. 探视人员 门诊患者

【答案】：A

65、对到传染病室探视的亲友应注意的事项哪些不对【单选题】——

A. 对于有感染指征的来访者,一律谢绝探视

B. 探视者在进入隔离室前要先报告值班护士

C. 对于有感染指征的患者,应尽量控制和减少探视

D. 医务人员应指导和监督探视者按规定进行隔离 积极向探视者进行卫生知识宣传教育,保护探视者不受感染

【答案】：C

66、可用于浸泡金属器械的高效类消毒剂是【单选题】——

A. 环氧乙烷

B. 70%乙醇溶液

C. 0.2%过氧乙酸溶液

D. 2%戊二醛溶液 0.5%碘伏

【答案】：D

67、使用无菌容器正确操作的是【单选题】——

A. 容器内无菌物取出后,未污染物品可放回

B. 开盖30分钟内盖好,以防污染

C. 手指不可触及容器内面及边缘,盖的内面朝上

D. 手抓边缘,以便持物牢靠 盖的内面朝下,以便放置稳妥

【答案】：C

68、压力蒸汽灭菌时器械包的重量【单选题】——

A. 8kg

B. 7kg

C. 5kg

D. 6kg 10kg

【答案】：B

69、为预防医院感染的发生新生儿病房每张床位占地面积不应少于【单选题】——

- A. 5m<sup>2</sup>
- B. 4m<sup>2</sup>
- C. 3m<sup>2</sup>
- D. 2m<sup>2</sup> 1m<sup>2</sup>

【答案】：C

70、对一次性卫生用品、消毒药械的购置查检许可证,对其抽检进行细菌学检查【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：D

71、下列消毒剂中哪一种不能达到灭菌水平【单选题】——

- A. 甲醛
- B. 戊二醛
- C. 含氯消毒剂
- D. 环氧乙烷 过氧化氢

【答案】：C

72、ICU【单选题】——

- A. 空气 $\leq 10\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- B. 空气 $\leq 200\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 5\text{cfu}/\text{cm}^2$
- C. 空气 $\leq 500\text{cfu}/\text{m}^3$ ,物体表面 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 10\text{cfu}/\text{cm}^2$
- D. -,物体表面 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^3$ ,医护人员手 $\leq 15\text{cfu}/\text{cm}^2$

空气 $\leq 1000\text{cfu}/\text{m}^3$ , 物体表面 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^3$ , 医护人员手 $\leq 8\text{cfu}/\text{cm}^2$ ?下列各医疗区的细菌学指标是

【答案】： B

73、下述各项中错误的是【单选题】——

- A. 小儿呼吸道感染不需要隔离
- B. 医院污物应分类收集、分别处理,以防止污染扩散
- C. 大面积烧伤或多重耐药菌感染应进行接触隔离
- D. 洗手是预防医院感染的重要措施 传染病区应严格划分清洁区、半污染区、污染区

【答案】： A

74、手术间通常保持的温度【单选题】——

- A.  $22\sim 26^\circ\text{C}$
- B.  $18\sim 20^\circ\text{C}$
- C.  $22\sim 25^\circ\text{C}$
- D.  $20\sim 22^\circ\text{C}$      $16\sim 18^\circ\text{C}$

【答案】： C

75、下述哪项不属于微生物【单选题】——

- A. 病毒
- B. 支原体
- C. 细菌
- D. 衣原体    钩虫

【答案】： E

76、铺盖手术巾者应该是【单选题】——

- A. 已戴好手套的手术医生
- B. 洗完手但未泡手的手术医生
- C. 穿好手术衣但未戴手套的手术医生
- D. 泡完手但未穿手术衣的手术医生    未洗手的手术医生

【答案】： D

77、关于医院感染的概念错误的是【单选题】——

- A. 医院感染是指在医院内获得的感染
- B. 与上次住院有关的感染是医院感染
- C. 入院时处于潜伏期的感染一定不是医院感染
- D. 出院之后发生的感染可能不是医院感染  
婴幼儿经胎盘获得的感染是医院感染

【答案】：E

78、医院工作中洗手指征不正确的是【单选题】——

- A. 在进入和离开病房前洗手
- B. 处理干净的物品前,处理污染的物品后洗手
- C. 在 高危病房中接触同一患者的不同部位前、后不必洗手
- D. 与任何患者长时间和密切接触后洗手 护理特殊易感患者前、后及在接触伤口前、后洗手

【答案】：C

79、乙型脑炎主要传播媒介是【单选题】——

- A. 蚊
- B. 虱
- C. 螨
- D. 鼠 蚤

【答案】：A

80、下列哪项违反了隔离原则【单选题】——

- A. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- B. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣
- C. 严密隔离患者禁止走出病室
- D. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房 只要做好床边隔离,不同的呼吸道传染病患者可同住一室

【答案】：E



81、为阳离子表面活性剂,对阴离子表面活性剂有拮抗作用的是【单选题】——

- A. 乙醇
- B. 甲醛
- C. 苯扎溴铵
- D. 过氧乙酸 纯乳酸

【答案】： C

82、下列抗菌药物中哪一种为窄谱抗菌药【单选题】——

- A. 万古霉素
- B. 阿米卡星
- C. 阿奇霉素
- D. 磷霉素 环丙沙星

【答案】： A

83、医院内下呼吸道感染的常见诱因是【单选题】——

- A. 留置导尿管
- B. 气管切开
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： B

84、护理人员为术前清洁洗肠准备所需肛管,采取煮沸消毒法,以下那项不正确【单选题】——

- A. 肛管腔内注水,用纱布包好
- B. 在沸水中持续煮沸 10min 以上
- C. 冷水时即放入计时
- D. 水沸后开始计时 先将肛管洗刷干净

【答案】： C

85、医院污物的处理原则错误的是【单选题】——

- A. 防止污染扩散

B. 分类收集

C.

分别处理

D. 少量医疗垃圾可与生活垃圾一同处理 尽可能采用焚烧处理

【答案】：D

86、下列哪种是最重要的医院感染的传播媒介【单选题】——

A. 手

B. 饮水

C. 食品

D. 医疗器械 衣物

【答案】：A

87、判断某传染病患者是否为医院感染引起的主要依据是【单选题】——

A. 临床症状期

B. 检查结果

C. 病程

D. 潜伏期 传染期

【答案】：D

88、肾移植患者应采取【单选题】——

A. 保护性隔离

B. 呼吸道隔离

C. 严密隔离

D. 消化道隔离 接触隔离

【答案】：A

89、根据我国卫生标准回答:根据《综合医院建筑标准》有关的卫生学标准及预防医院内感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见的应是【单选题】——

A. 国家医院感染管理咨询专家委员会

B. 省医院感染管理专家咨询委员会

C. 各级医院的医院感染管理委员会

D. 医院感染管理科

临床科室医院感染管理小组

【答案】：C

90、发生医院内尿路感染最常见的诱因是【单选题】——

- A. 长期卧床
- B. 留置导尿管
- C. 膀胱冲洗
- D. 膀胱内注药 膀胱镜检查

【答案】：B

91、传染科病房属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：D

92、医院内感染常规监测中下列哪项是错误的【单选题】——

- A. 医院内感染高危科室高危人群监测
- B. 漏报率监测
- C. 医院内感染高危因素监测
- D. 医院内感染暴发流行监测 传染病报告卡监测

【答案】：E

93、带入感染【单选题】——

- A. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- B. 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染
- C. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- D. 病人在家中已发生的感染 病原体来源于病人本身的感染

【答案】：C

94、有关医院感染预防与控制的概念错误的是【单选题】——

- A. 洗手是预防医院感染的重要措施
- B. 滥用抗感染药物可致二重感染
- C.

部分医院感染是可以预防的

D. 内源性医院感染是医院感染的重要原因 医院感染一定是由于消毒隔离缺陷所致

【答案】：E

95、组织实施国家有关政策法规【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科 临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：B

96、无需执行昆虫隔离的疾病是【单选题】——

- A. 疟疾
- B. 气性坏疽
- C. 斑疹伤寒
- D. 流行性出血热 流行性乙型脑炎

【答案】：B

97、严密隔离的标志是【单选题】——

- A. 红色标志
- B. 棕色标志
- C. 黄色标志
- D. 绿色标志 灰色标志

【答案】：C

98、下列关于禽流感的描述不对的是【单选题】——

- A. 是禽流行性感冒的简称
- B. 由A型禽流感病毒引起的一种禽类传染病
- C. 由H5N1血清型引起的禽流感称高致病性禽流感
- D. 属甲类传染病之一 人感染高致病性禽流感可以在人与人之

间传播

【答案】：D

99、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最迟不得超过【单选题】——

- A. 72h
- B. 48h
- C. 24h
- D. 12h 4h

【答案】：D

100、下列带入感染描述正确的是【单选题】——

- A. 病人入院时已处于另一种传染病的潜伏期,入院后发病,并传给其他病人
- B. 病原体来源于病人本身的感染
- C. 病人与医生及其他病人通过直接或间接传播引起的感染
- D. 病人在家中已发生的感染 在诊疗过程中,由于器械消毒不严或制剂不纯引起的感染

【答案】：A

101、需要采取血液-体液隔离的疾病是【单选题】——

- A. 肺结核
- B. 艾滋病
- C. 器官移植者
- D. 肺鼠疫 霍乱

【答案】：B

102、发生医院感染时,停止收容新病人的时间是【单选题】——

- A. 该病最长潜伏期过去
- B. 该病平均潜伏期过去
- C. 该病常见潜伏期过去
- D. 该病最短潜伏期过去 观察一段时间没有新病人发生

【答案】：A

103、下列有关护理工作的描述,不正确的是【单选题】——

- A.



各种治疗、护理、换药操作应按清洁伤口、感染伤口、隔离伤口依次进行

- B. 起封抽吸的各种溶媒超过 36 小时不得使用,最好采用大包装
- C. 无菌物品必须一人一用一灭菌
- D. 灭菌物品提倡使用小包装,无菌棉球或纱布罐一经打开,使用时间不得超过 24 小时 治疗室、处置室布局合理,清洁区、污染区分区明确

【答案】： B

104、若需提高煮沸温度,可在水中加入【单选题】——

- A. 碳酸氢钠
- B. 高锰酸钾
- C. 乙醇
- D. 亚硝酸钠 氯化钠

【答案】： A

105、医务人员发生艾滋病职业暴露后预防性用药最好在几小时内实施【单选题】——

- A. 24h
- B. 12h
- C. 8h
- D. 4h 2h

【答案】： D

106、生活垃圾【单选题】——

- A. 使用过的注射针头
- B. 带血的敷料
- C. 两者均是
- D. 两者均否

【答案】： D

107、高度危险性物品是指【单选题】——

- A. 受到一定量病菌污染才造成危害的物品
- B.

虽有微生物污染,但一般情况下无害的物品

- C. 进入无菌组织或与破损的组织、皮肤粘膜密切接触的物品
- D. 仅和皮肤粘膜相接触,而不进入无菌的组织内的物品 直接地和健康无损的皮肤粘膜密切接触的物品

【答案】： C

108、肠道隔离的要求哪项不对【单选题】——

- A. 患者尽可能住隔离室,相同疾病可居一室
- B. 接触感染物时戴手套,若容易污染衣服时穿隔离衣,不需戴口罩
- C. 接触患者及污染物后,护理另一患者前要洗手
- D. 被粪便污染的物品要先清洗再送消毒处理 探视者进入隔离室前应通知值班护士

【答案】： D

109、关于医院感染知识培训要求,下述中错误的是【单选题】——

- A. 培训内容包括管理知识和专业知识
- B. 培训对象包括管理、医务、工勤人员
- C. 非专职人员每年培训不少于 2 小时
- D. 进修医师必须培训 实习医师必须培训

【答案】： C

110、B-D 试验合格的标准是【单选题】——

- A. 指示图各部位颜色变化由深变浅
- B. 指示图各部位颜色变化为浅灰色
- C. 指示图各部位颜色变化为深黑色
- D. 指示图各部位颜色变化大致均匀 指示图各部位颜色变化深浅一致均匀

【答案】： E

111、有关医院感染预防与控制的概念,错误的是:【单选题】——

- A. 外源性感染是可以预防的
- B. 洗手是预防医院感染的重要措施

- C. 做好消毒隔离就可杜绝医院感染的发生
- D. 内源性医院感染是难以预防的

滥用抗菌药物可致二重感染

【答案】：C

112、肝炎肠道门诊的管理中下列哪项错误【单选题】——

- A. 诊室、人员、器械、用具固定
- B. 挂号、候诊与普通门诊分开
- C. 肝炎按黄疸和无黄疸进行隔离
- D. 取药、注射、采血、化验与普通病人分开 接触病人后洗手

【答案】：C

113、在医院感染暴发流行或流行得到证实后,医院应在多长时间内报告上级卫生行政部门【单选题】——

- A. 48h
- B. 36h
- C. 24h
- D. 12h 6h

【答案】：C

114、传染病区所采取的隔离措施,下列不正确【单选题】——

- A. 同住一室的不同的呼吸道传染病患者只要做好床边隔离
- B. 给同一种病种患者测血压时可不换血压计
- C. 斑疹伤寒患者须更衣后才可入病房
- D. 护理消化道隔离病人时,须按病种分别穿隔离衣 严密隔离患者禁止走出病房

【答案】：A

115、对医院新建设施提出卫生学标准的审定意见【单选题】——

- A. 卫生部医政司医院感染管理委员会
- B. 省市卫生行政部门医院感染管理委员会
- C. 医院的医院感染管理委员会
- D. 医院感染管理科

临床科室以下各项工作是哪个部门的职责

【答案】：C

116、传染病院应设置在【单选题】——

- A. 靠近综合性医院
- B. 城市中心
- C. 远离公共场所
- D. 交通便利的地方 水源充足的地方

【答案】：C

117、刘某,被诊断为霍乱,对其应该采取的隔离方式是【单选题】——

- A. 消化道隔离
- B. 严密隔离
- C. 昆虫隔离
- D. 保护性隔离 呼吸道隔离

【答案】：B

118、医院的医院感染管理委员会的主要职责不包括【单选题】——

- A. 依据有关政策法规,制定全院控制医院感染规划、管理制度,并组织实施
- B. 根据《综合医院建筑标准》有关卫生学标准及预防医院感染的要求,对医院的改建、扩建和新建提出建设性意见
- C. 建立会议制度,定期研究、协调和解决有关医院感染管理方面的重大事项;遇有紧急问题随时召开
- D. 定期总结、分析细菌学检测监测资料,向有关部门反馈,并向全院公布 对医院感染管理科拟定的全院医院感染管理工作计划进行审定,对其工作进行考评

【答案】：D

119、从医疗护理角度讲戴手套的作用不正确的是【单选题】——

- A. 手套可减少患者身上的微生物传播给医务人员的可能性
- B. 手套可以防止医务人员把自身手上的菌群转移给患者的可能性
- C.

手套可以防止医务人员成为传播微生物的媒介

D. 手套可以防止医务人员将从患者或环境中污染的病原在人群中传播 戴手套后可以不必洗手

【答案】：E

120、医院感染管理中,应重点管控的传染来源是【单选题】——

A. 动物

B. 血液制品

C. 各种病人

D. 食品 病原携带者

【答案】：C

121、引起医院感染的病原微生物主要是【单选题】——

A. 条件致病菌

B. 细菌

C. 弓形体

D. 衣原体 真菌

【答案】：A

122、某医院收入一痢疾患者,该患者在入院时又感染了白喉杆菌,入院后发生白喉,这属于【单选题】——

A. 交叉感染

B. 医源性感染

C. 自身感染

D. 带入感染 以上都不是

【答案】：D

123、HICPAC 隔离预防指南第一部分最重要,主要是指对所有患者均实施【单选题】——

A. 基础预防

B. 标准预防

C. 接触隔离

D. 空气隔离 飞沫隔离

【答案】：B



124、目前引起输血后肝炎的主要肝炎病毒为【单选题】——

- A. 甲型肝炎病毒
- B. 乙型肝炎病毒
- C. 丙型肝炎病毒
- D. 戊型肝炎病毒 庚型肝炎病毒

【答案】：C

125、关于中东呼吸综合征流行病学描述正确的是【单选题】——

- A. 完全具备持续的人传人的能力
- B. 狨猴为自然储存宿主
- C. 以接触传播为主,其次是呼吸道传播
- D. 单峰骆驼可能是人类感染来源 非密切接触即可引起人际间传播

【答案】：D

126、传染性非典型肺炎的最主要传播途径是【单选题】——

- A. 经消化道传播
- B. 接触传播
- C. 经呼吸道飞沫传播
- D. 虫媒传播 经粪一口途径传播

【答案】：C

127、注射室属于【单选题】——

- A. I类地区
- B. II类地区
- C. III类地区
- D. IV类地区 非分类地区

【答案】：C

128、预防免疫功能低下病人发生医院内感染不正确的是【单选题】——

- A. 注射相关疫苗
- B.

全身使用广谱抗生素预防感染

- C. 治疗局部感染病灶
- D. 保护性隔离 保护皮肤黏膜的完整性

【答案】：B

129、灭菌速度快、灭菌效果好、经济、环境污染小的灭菌方法是【单选题】——

- A. 环氧乙烷灭菌法
- B. 戊二醛浸泡灭菌法
- C. 辐射灭菌法
- D. 过氧乙酸浸泡灭菌法 压力蒸汽灭菌法

【答案】：E

130、张某,以“急性甲型肝炎”收住院治疗,病人正在治疗期间。对该病人应做何种隔离【单选题】——

- A. 保护性隔离
- B. 消化道隔离
- C. 严密隔离
- D. 昆虫隔离 呼吸道隔离

【答案】：B

131、下列哪项不属于灭菌剂【单选题】——

- A. 过氧乙酸
- B. 戊二醛
- C. 碘伏
- D. 环氧乙烷 甲醛

【答案】：C

132、根据我国卫生标准回答:接触皮肤的医疗用品【单选题】——

- A. 必须无菌
- B. 细菌菌落总数应 $\leq 20\text{Cfu/g}$  或 $\leq 20\text{cfu}/100\text{cm}^2$ ,致病性微生物不得检出
- C.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。  
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/158132106134006066>